eurofins | MEGALAB

CATÁLOGO DE PRUEBAS

Edición: 22/11/21

eurofins | MEGALAB

Esperamos que nuestro catálogo de pruebas le resulte útil, en él encontrará las pruebas solicitadas con mayor frecuencia, no obstante, si no encontrase alguna prueba o tuviese alguna duda póngase en contacto con nosotros:

91 429 62 87

Los plazos de entrega indicados en este catálogo (días laborables) se establecen desde la llegada de la muestra al laboratorio hasta la validación de los resultados (disponibles mediante acceso online^*)

**Los centros que soliciten los análisis impresos deben sumar 24 horas a estos plazos de entrega.*

CATÁLOGO DE PRUEBAS ED 22_11_2021

Descripción:	21-HIDROXILASA ANTICUERPOS
Código:	HIDROXILA
Técnica:	ELISA
Unidades:	U/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml Suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 0.3) Normal (0.3 - 0.5) Indeterminado (Sup. 0.5) Positivo

Descripción:	ADAMTS-13 actividad en plasma
Código:	ADAMTS13
Técnica:	Fluorescence Resonance Energy Transfer
Unidades:	%
Plazo:	17 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	1 mL de plasma de citrato. Congelar
Valores de referencia:	(6 - 100) Valores de referencia indicativos

Descripción:	Bladder Tumour Antigen, Orina
Código:	BTA
Técnica:	EIA
Unidades:	kU/L
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	3 mL orina. Refrigerado.
Valores de referencia:	(Inf. 14)

Descripción:	Perfil T4 Reguladores (CD4+CD25+CD127 low) %
Código:	T4REGULADO
Técnica:	Citometría de flujo
Unidades:	%
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 ml de EDTA a Tª ambiente
Valores de referencia:	(1 - 3)

Descripción:	Yo Ac. LCR
Código:	ACYO.LCR
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1mL LCR
Valores de referencia:	

Descripción: 1,2-DICLOROBENCENO
Código: DICLOROBEN
Técnica: Cromatografía de gases-head space
Unidades: mcg/L
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 140) Personas expuestas. Valor límite biológico (BAT-DFG). Al final de la jornada laboral

---

Descripción: 11-DESOXICORTISOL SUERO
Código: DESOX11
Técnica: Cromatografía-Extracción-RIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL de suero. Alternativa 2mL plasma de EDTA Refrigerado Especificar edad del paciente.
Valores de referencia:
(0.10 - 1.60) Mujer < 1 año
(0.10 - 1.00) Mujer 1 año - 5 años
(0.14 - 0.58) Mujer 5 años - 12 años
(0.14 - 1.20) Mujer 12 años - 18 años
(0.20 - 1.10) Mujer > 18 años
(0.10 - 2.00) Hombre < 1 año
(0.10 - 2.10) Hombre 1 año - 5 años
(0.20 - 1.40) Hombre 5 años - 12 años
(0.11 - 1.20) Hombre 12 años - 18 años
(0.20 - 1.10) Hombre > 18 años

Código: CETO17.F2
Descripción: 17-CETOSTEROIDES FRACCCIONADOS
Técnica: Cromatografía de gases
Comentario adicional: 30 ml orina 24 h.(alícuota).Indicar diuresis

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ANDROST2		Perfil Androsterona , orina	mg/24 h	(3.20 - 5.87) Hombre (1.60 - 3.20) Mujer
Prueba	ETIOCOL2		Perfil Etiocolanolona, orina	mg/24 h	(1.50 - 5.00)
Prueba	H2EPIAND2		Perfil Dehidroepiandrosterona (DHEA), orina	mg/24 h	(0.50 - 3.11)

Descripción: 17-CETOSTEROIDES TOTALES EN ORINA
Código: CETOSTO17
Técnica: Espectrometría de absorción molecular
Unidades: mg/24 h
Plazo: 7 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 mL de Orina de 24 h

Descripción: 17-CETOSTEROIDES TOTALES EN ORINA

Valores de referencia:
(Inf. 2) 1 año - 4 años
(Inf. 3) 5 años - 9 años
(1 - 5) 10 años - 12 años
(1 - 6) 13 años - 14 años
(2 - 13) 15 años - 16 años
(10 - 25) Hombre > 16 años
(6 - 14) Mujer > 16 años

Código: HIDRO17.F

Descripción: 17-HIDROXICORTICOIDES FRACCIONADOS (cromatografía capa fina)

Técnica: Cromatografía capa fina

Comentario adicional: 10 mL Orina 24h. (alícuota) (Refrigerado).Se requiere la diuresis.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CORTISONA		PERFIL 17-HIDROXICORTICOIDES FRACCIONADOS CORTISONA	mcg/24 h	(15.99 - 128.16)
Prueba	CORT		PERFIL 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES FRACC. CORTISOL	mcg/24 h	(9.80 - 90.90)

Descripción: 17-HIDROXICORTICOIDES TOTALES

Código: HIDRO17.T

Técnica: Espectrometría de absorción molecular

Unidades: mg/24 h

Plazo: 7 días

Tubo: Orina 24 Horas

Comentario adicional:
Usar ácido clorhídrico 3N.
Centrifugar.
Se requiere la diuresis

Valores de referencia:
(0.50 - 1.01) < 1 año
(1.01 - 5.62) < 14 años
(3.00 - 10.00) Hombre > 14 años
(2.00 - 8.00) Mujer > 14 años

Descripción: 17-Hidroxipregnenolona en suero

Código: PREGNENO

Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas.(CG-MS/MS)

Unidades: ng/mL

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 2 mL Suero (Refrigerado)

Valores de referencia:
(0.10 - 7.70) Hombre < 1 año
(0.12 - 1.00) Hombre 2 años - 5 años
(0.30 - 1.90) Hombre 6 años - 12 años
(0.10 - 2.40) Hombre > 12 años
(0.60 - 8.30) Mujer < 1 año
(0.10 - 0.50) Mujer 2 años - 5 años
(0.10 - 1.40) Mujer 6 años - 12 años
(0.10 - 2.40) Mujer > 12 años

Descripción:	18-OH CORTICOSTERONA
Código:	OHCORTI
Técnica:	Téc. Cromatografía líquida/Tándem Masas
Unidades:	ng/dL
Plazo:	34 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero. Separar y congelar.
Valores de referencia:	(12 - 55)

Descripción:	3 Mutaciones genes IDH1 (132) e IDH2 (140, 172)
Código:	IDH1_IDH2
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Muestras de tejido tumoral y sangre. Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO. IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:	

Descripción:	3-METILHISTIDINA SUERO
Código:	METILHISTI
Técnica:	Cromatografía líquida-Tándem masas
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	3-METOXITIRAMINA EN ORINA
Código:	METOXITIRA
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico
Unidades:	µg/24h
Plazo:	6 días
Tubo:	ACIDIFICAR ORINA
Comentario adicional:	10 ml orina 24 horas con 60 ul de HCL 5N (60% agua/40% HCl 37º). Indicar diuresis de orina.Identificar tubo con el comentario +ácido
Valores de referencia:	(100.0 - 300.0)

Descripción:	4-CLOROCATECOL EN ORINA
Código:	CLOROCAT
Técnica:	
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada) al final de la semana laboral
Valores de referencia:	

Descripción:	5-ALA DEHIDRATASA ERITROCITARIA
Código:	ALADEHID
Técnica:	Espectrofotometría de absorción molecular

Descripción: 5-ALA DEHIDRATASA ERITROCITARIA
Unidades: UE/L
Plazo: 10 días
Tubo: Sang T. Heparina Congelada
Comentario adicional: 5 ml de sangre total de Heparina Litio.CONGELADA
Tubo de EDTA interfiere en la técnica.
Valores de referencia: (Sup. 20.0)
(Sup. 6.0) V.L.B. (Personas expuestas a Plomo)

Descripción: 5'NUCLEOTIDASA
Código: NUCLEO5
Técnica: Espectrometría de absorción molecular
Unidades: U/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Alternativo, 1mL de Plasma de Heparina.
Valores de referencia: (Inf. 10)

Descripción: 68KD (COCLEARES) SORDERA NEUROSENSITIVA AC. SUERO
Código: COCLEARAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Código: TGNMMP
Descripción: 6-TIOGUANINA NUCLEOTIDO+6-METILMERCAPTOPURINA EN SANGRE
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución.
Comentario adicional: 3 mL Sangre Total (EDTA)

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TIOGUANIN		PERFIL TGNMMP (6-TIOGUANINA NUCLEOTIDO EN SANGRE)		= Pacientes trasplantados (terapia triple de Azatioprina): 120-550 pmol/0.2mL. Enfermedad intestinal inflamatoria crónica(Azatioprina): 300-550 pmol/0.2 mL Quimioterapia (6-Mercaptopurina): 600-1200 pmol/0.2mL. Los pacientes tratados con Tioguanina presentan valores de 6-TGN de 5 a 10 veces más elevados.
Prueba	METILMERP		PERFIL TGNMMP (6-MERCAPTOPURINA EN SANGRE)		= 6-MMP es un metabolito inactivo de la Azatioprina y la 6-Mercaptopurina y se detecta durante más tiempo que 6-Tioguanina nucleótido. Los resultados positivos indican toma de medicación. Valores de 6-MMP superiores a 5700 pmol/0.2mL están considerados de riesgo de sufrir hepatotoxicidad en niños; no habiendo datos para los adultos. El ratio 6-MMP/6-TGN puede ser indicativo de la actividad enzimática de TPMT.

Descripción:	Abetalipoproteinemia. Sec Gen: MTTP
Código:	GEN_000001
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	AC ANTI MOG (MIELINA OLIGODENDROCITO) LCR
Código:	MOGLCR
Técnica:	Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:	
Plazo:	18 días
Tubo:	Líquido Bioquímica
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	= Negativo: Título < 1/2

Descripción:	AC METOXIACETICO (EXP. 2-METOXIETANOL/ACETATO 2-METOXIETILO
Código:	METOXIACE
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	5 mL orina (micción aislada) al final de la semana laboral después de al menos 2 semanas de trabajo. (Para conservación añadir 0.1mL de ac. clorhídrico conc.)
Valores de referencia:	(Inf. 8) Final de la semana laboral (exposición 2-METOXIETANOL y/o ACETATO DE 2-METOXIETILO) VLB-INSHT

Descripción:	AC. ANTI CAPSULAS SUPRARRENALES
Código:	SUPRARREAC
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	=<1:20 Negativo <1/20 =>1:20 Positivo >1/20

Descripción:	AC. ANTI CELULAS PARIETALES (MUCOSA GASTRICA)
Código:	CELPARIEAC
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	= Negativo <1/40 = Positivo >1/40

Descripción: AC. ANTI CENTROMERO
Código: CENTROAC
Técnica: Técnica IFI
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: AC. ANTI GAD/64K EN LCR
Código: GADACLCR
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml de LCR
Valores de referencia: (Inf. 1.0) Negativo

Descripción: AC. ANTI RECEPTOR DE CASPR2 SUERO
Código: CASPR2
Técnica: Inmunocitoquímica (Cell Based Assay)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: AC. IGG ANTI NEUROMIELITIS OPTICA EN LCR
Código: ANTINMOLCR
Técnica: Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR
Valores de referencia: =>1/2 Título Positivo

Descripción: AC. IGG HUMAN ANTI-MOUSE ANTIBODY (ANTI RATÓN)
Código: HAMA
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 1.0) Negativo

Descripción: ACANTHAMOEBA Y AMEBAS LIBRE (ENVIO MICROBIOL ESPECIAL)
Código: ACANTCULT
Técnica: Cultivo
Unidades:
Plazo: 45 días

Descripción: ACANTHAMOEBA Y AMEBAS LIBRE (ENVIO MICROBIOL ESPECIAL)
Tubo: Microbiología
Comentario adicional: Muestra ocular a Temperatura ambiente. En caso de agujas o bisturis dejar un tiempo en suero fisiologico o agua esteril retirandolo antes de que desprenda herrumbre
Valores de referencia:

Descripción: ACANTHAMOEBA, NAEGLERIA ,BALAMUTHIA (ENVIO MICROBIO ESPECIAL
Código: ACANTPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional: Muestra ocular a Temperatura ambiente. En caso de agujas o bisturis dejar un tiempo en suero fisiologico o agua esteril retirandolo antes de que desprenda herrumbre
Valores de referencia:

Descripción: ACETILCOLINESTERASA LIQUIDO AMNIOTICO
Código: COLINESLA
Técnica: Electroforesis
Unidades:
Plazo: 14 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL líquido amniótico.
Valores de referencia:

Descripción: ACETOACETATO SUERO
Código: ACETOASUER
Técnica: Espectrofotometria
Unidades: mmol/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero congelado
Valores de referencia: (0.01 - 0.20)

Descripción: ACETONA en orina (exposicion a ACETONA)
Código: ACETONA
Técnica: Cromatog. gases-Head space
Unidades: mg/L
Plazo: 11 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: Orinal Final de Jornada
Valores de referencia: (Inf. 50) Al final de la jornada laboral (exposición a ACETONA) VLB-INSHT
(Inf. 40) Al final de la semana laboral (exposición a ISOPROPANOL) VLB-INSHT

Descripción: ACETONA EN SANGRE TOTAL
Código: ACETOSAN
Técnica: Cromatografía de gases-head space
Unidades: mg/L
Plazo: 6 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia

Descripción: ACETONA EN SANGRE TOTAL
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 25) VLB final jornada laboral

Descripción: Acidemia glutárica tipo 2. Panel
Código: GEN_000004
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia glutárica. Panel
Código: GEN_000005
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia isovalérica. Sec Gen: IVD.
Código: GEN_000006
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia metilmalónica. Panel
Código: GEN_000007
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia propiónica. Panel
Código: GEN_000008
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia propiónica. Sec Gen: PCCA.
Código: GEN_000009
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia propiónica. Sec Gen: PCCB.
Código: GEN_000010
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia y aciduria metilmalónica. Panel
Código: GEN_000011
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ACIDEZ TITULABLE ORINA
Código: ACIDEZ2
Técnica: Volumetría
Unidades: mmol/24 h
Plazo: 3 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL Orina 24h. (alicuota). Se requiere la diuresis.
Valores de referencia: (20 - 50)

Descripción: ACIDO 1,2 DIHIDROXI BUTILMERCAPTURICO ORINA
Código: BUTILMERCA
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada) final de la jornada laboral. Congelada
Valores de referencia:

Descripción: ACIDO 2-ETOXIACETICO EN ORINA
Código: ETOXIACE
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mg/L
Plazo: 13 días

Descripción:	ACIDO 2-ETOXIACETICO EN ORINA
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	5 ml de orina (micción aislada) al final de la semana laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 50) Final semana laboral (exposición a 2-Etoxietanol y Acetato de 2-Etoxietileno)

Descripción:	ACIDO 5-HIDROXINDOLACETICO LCR
Código:	OHINDOLLCR
Técnica:	HPLC
Unidades:	ng/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(10 - 40)

Descripción:	ACIDO 5-HIDROXINDOLACETICO ORINA
Código:	OHINDOLACE
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL de Orina de 24h con 0.1 ml de ácido acético concentrado. Se requiere diuresis Evitar suminstrar farmacos 72 horas antes de recogida de orina Ver instrucciones de dieta en ficha de preparación del paciente
Valores de referencia:	(1.15 - 7.07)

Descripción:	ACIDO ACETILASPARTICO ORINA (ENF. CANAVAN)
Código:	ACETILASPA
Técnica:	CROMATOGRAFIA DE GASES- ESPECTROMETRÍA MASAS CON MONITORIZACION DE IONES
Unidades:	mmol/molcrea
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10 mL orina. Congelar y enviar congelado. Se recomienda que la muestra corresponda a una fase de crisis. Indicar información clínica.
Valores de referencia:	(4.0 - 25.0)

Descripción:	ACIDO BUTOXIACÉTICO TOTAL EN ORINA
Código:	BUTOXIACET
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	13 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 mL de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 200) Final jornada laboral

Descripción:	ACIDO CITRICO (CITRATO) EN ORINA
Código:	CITRICO24
Técnica:	Espectrofotometria
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	6 días

Descripción:	ACIDO CITRICO (CITRATO) EN ORINA
Tubo:	Orina bioquímica especial
Comentario adicional:	2 ml de orina
Valores de referencia:	(116 - 924) Hombre (250 - 1160) Mujer

Descripción:	ACIDO CITRICO (CITRATO) PLASMA SEMINAL
Código:	CITRICOSEM
Técnica:	Enzimática
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(200 - 600)

Descripción:	ACIDO CITRICO (CITRATO) SUERO
Código:	CITRICO
Técnica:	Cromatografía gases-Espectrometría masas
Unidades:	mg/dL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1mL de suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(1.3 - 3.7)

Descripción:	ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO ORINA (ALA)
Código:	DELTAALA
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL de orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 5) (Inf. 20) Exposición a Plomo y derivados

Descripción:	ACIDO FITANICO SUERO
Código:	FITANICO
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	3 ml suero. Separar y congelar lo antes posible.
Valores de referencia:	(Inf. 5)

Descripción:	ACIDO FOLICO B9
Código:	FOLICO
Técnica:	Téc. ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero.

Descripción:	ACIDO FOLICO B9
Valores de referencia:	(3 - 20)

Descripción:	Acido Folico eritrocitario
Código:	FOLICOERI
Técnica:	Inmunoquimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 ml de sangre total EDTA. Refrigerado Proteger de la Luz
Valores de referencia:	(126 - 651)

Descripción:	Acido Formico (metabolito de metanol), Orina
Código:	FORMICO
Técnica:	Cromatografía de gases - ionización de llama
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 80) Al principio de la última jornada de la semana laboral (exposición a Metanol)

Descripción:	ACIDO FUROICO ORINA
Código:	FUROICO
Técnica:	Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:	mg/L
Plazo:	13 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 200) VLB final de jornada (exposición a Furfural)

Descripción:	ACIDO GAMMA AMINOBUTIRICO ORINA
Código:	GABA2
Técnica:	Técnica Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades:	µmol/mmol crea
Plazo:	19 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	1mL orina (congelar la muestra inmediatamente)
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	ACIDO GLICOLICO EN ORINA
Código:	GLICOLICO2
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	38 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	Orina de 2ª micción antes de la jornada laboral
Valores de referencia:	(Inf. 50)

Descripción:	Acido hialurónico
Código:	HIALURAC
Técnica:	EIA
Unidades:	µg/L
Plazo:	36 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero
Valores de referencia:	(2.50 - 80)

Descripción:	ACIDO HIALURONICO LIQUIDO PLEURAL
Código:	HIALURONIC
Técnica:	EIA
Unidades:	mg/L
Plazo:	32 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 10.0)

Descripción:	ACIDO HIALURONICO LIQUIDO SINOVIAL
Código:	LIQSIHIALU
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	mg/L
Plazo:	32 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL Líquido Sinovial.
Valores de referencia:	= De manera orientativa, superior a 350.0 mg/dL.

Descripción:	ACIDO HIPURICO ORINA
Código:	HIPURICO
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	6 días
Tubo:	OFJ HPLC
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ). Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 1600) al final de la jornada laboral (exposición a TOLUENO) VLB-INSHT

Descripción:	ACIDO HOMOGENTISICO ORINA (ALCAPTONURIA)
Código:	HOMOGEN
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL orina 24 h Añadir 0.5 mL de ácido clorhídrico concentrado
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	ACIDO HOMOVANILICO ORINA (HVA)
Código:	HOMOVANI

Descripción:	ACIDO HOMOVANILICO ORINA (HVA)
Técnica:	HPLC - Electroquímica
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	5 mL de orina Usar ácido clorhidrico 3N
Valores de referencia:	(1.3 - 4.2) 1 año - 3 años (1.4 - 4.4) 3 años - 6 años (2.2 - 4.8) 6 años - 10 años (2.4 - 8.8) 10 años - 16 años (1.5 - 9.4) > 16 años

Descripción:	ACIDO LACTICO (LACTATO) PLASMA
Código:	LACTICO
Técnica:	Téc. enzimática UV
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma EDTA. Separar inmediatamente y enviar congelado.
Valores de referencia:	(5.7 - 22)

Descripción:	ACIDO LACTICO(LACTATO) EN LIQUIDO SINOVIAL
Código:	LACTICOSIN
Técnica:	Téc. enzimática UV
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Tubo fluoruro
Comentario adicional:	1 mL.Fluoruro/EDTA.
Valores de referencia:	(Inf. 25)

Descripción:	ACIDO MANDELICO + FENIL GLIOXILICO EN 2ª ORINA
Código:	MANDELI2M
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	6 días
Tubo:	OFJ HPLC
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ) para personas expuestas a ESTIRENO y 10 ml de orina al final de la semana laboral para personas expuestas a etilbenceno. Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 400) al final de la jornada laboral (exposición a ESTIRENO) VLB-INSHT (Inf. 700) al final de la jornada laboral (exposición a ETILBENCENO) VLB-INSHT

Descripción:	ACIDO MANDELICO+FENIL GLIOXILICO EN ORINA
Código:	MANDELI2
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	6 días
Tubo:	OFJ HPLC

Descripción:	ACIDO MANDELICO+FENIL GLIOXILICO EN ORINA
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ) para personas expuestas a ESTIRENO y 10 ml de orina al final de la semana laboral para personas expuestas a etilbenceno. Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 400) al final de la jornada laboral (exposición a ESTIRENO) VLB-INSHT (Inf. 700) al final de la semana laboral (exposición a ETILBENCENO) VLB-INSHT

Descripción:	Acido metil malónico en suero
Código:	METILMALO
Técnica:	Cromatografía de gases - espectrometría de masas
Unidades:	µmol/L
Plazo:	15 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 mL suero congelado. Congelar la muestra inmediatamente.
Valores de referencia:	(Inf. 0.50)

Descripción:	ACIDO METIL MALONICO ORINA
Código:	METILMALOO
Técnica:	Cromatrografía de gases- Espectrometría de masas
Unidades:	mcmol/g crea.
Plazo:	25 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10 ml Congelar. Preferible orina primera de la mañana
Valores de referencia:	(5 - 32)

Descripción:	ACIDO METILHIPURICO ORINA (metabolito del Xileno)
Código:	METILHIP
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	6 días
Tubo:	OFJ HPLC
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ). Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 1000) al final de la jornada laboral (exposición a XILENO) VLB-INSHT

Descripción:	ACIDO METILIMIDAZOLACÉTICO
Código:	METILIMI
Técnica:	Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina 24 h.
Valores de referencia:	(Inf. 4.5)

Descripción:	ACIDO MICOFENOLICO
Código:	MICOFENOLI
Técnica:	EIA
Unidades:	mcg/ml
Plazo:	5 días

Descripción: ACIDO MICOFENOLICO
Tubo: Plasma EDTA Refrigerado
Comentario adicional: 1 ml.Se recomienda obtener la muestra previamente a la administracion del farmaco. Usualmente se determina la concentración del inmunosupresor en periodos matinal y en ayunas
Valores de referencia: (2.0 - 4.0)

Descripción: ACIDO OROTICO ORINA
Código: OROTICO
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 23 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL de orina (micción aislada)
Congelar
Valores de referencia: (Inf. 8)

Descripción: ACIDO OXALICO (CONCENTRACION EN ORINA)
Código: OXAL2_MG
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Orina bioquímica especial
Comentario adicional: 3 ml de orina

Es recomendable que el paciente no tome alimentos ricos en Vitamina C durante al menos 48 horas, pues el exceso de ácido ascórbico pudiera interferir de manera "negativa", es decir infravalorando los resultados de oxalato.

Valores de referencia:

Descripción: ACIDO OXALICO (OXALATO) SUERO
Código: OXALICO
Técnica: Espectrometría absorción molecular
Unidades: mcmol/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1mL de suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (Inf. 1.6)

Código: OXALICO2
Descripción: ACIDO OXALICO ORINA (OXALATO)
Técnica: Enzimática
Comentario adicional: 3 ml de orina

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	OXAL2_MG		ACIDO OXALICO (CONCENTRACION EN ORINA)	mg/L	
Prueba	OXALICO24		ACIDO OXALICO ORINA (OXALATO)	mg/24 h	(7.0 - 44) Hombre > 14 años (4.0 - 31) Mujer > 14 años (13 - 38) < 14 años

---

Descripción: Ácido Pipecólico en suero
Código: PIPECOLSUE

Descripción:	Ácido Pipecólico en suero
Técnica:	Cromatografía Líquida-Tándem Masas(LC-MS/MS)
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 ml de suero. Congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(0 - 6) 0-6 meses (0 - 5.9) 6 meses-12 meses (0 - 4.3) 1 año-17 años (0 - 7.4) Más de 17 años

Descripción:	ÁCIDO PIRÚVICO (PIRUVATO) EN LCR
Código:	PIRULCR
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.50 - 1.70)

Descripción:	ACIDO PIRUVICO (PIRUVATO) SANGRE
Código:	PIRUVICO
Técnica:	Cinética - Espectrofotometría ultravioleta
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Preparación específica de la muestra. Tubos especiales con instrucciones adjuntas.
Valores de referencia:	(Inf. 0.59)

Descripción:	ACIDO PRISTANICO
Código:	PRISTANICO
Técnica:	Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas
Unidades:	mcg/ml
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero, Congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(Inf. 0.8)

Descripción:	ACIDO SALICILICO (SALICILATO)
Código:	SALICILICO
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(15 - 30) Rango terapéutico (Sup. 30) Nivel tóxico

Descripción:	ÁCIDO TIOTIAZOLIDIN CARBOXILICO (DISULFURO DE CARBONO)
Código:	DISULCARB

Descripción:	ÁCIDO TIOTIAZOLIDIN CARBOXILICO (DISULFURO DE CARBONO)
Técnica:	Espectrometía de absorción molecular
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	27 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina Toma de muestra final de la jornada laboral
Valores de referencia:	(Inf. 1.5) Final de jornada (exposición a DISULFURO DE CARBONO)

Descripción:	ACIDO TRICLOROACETICO EN ORINA
Código:	TRICLOAC
Técnica:	Cromatografía de gases / Head-space
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada) al final de la semana laboral
Valores de referencia:	(Inf. 10) VLB Final de semana laboral (Exposición a Tricloroetano) (Inf. 15) VLB Final de semana laboral (Exposición a Tricloroetileno)

Descripción:	ACIDO TTMUCONICO (EXPOSICION BENCENO)
Código:	MUCONICO
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	OFJ HPLC
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ). Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 2.0) al final de la jornada laboral (exposición a BENCENO) VLB-INSHT

Descripción:	ACIDO URICO
Código:	URI
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(2.6 - 6.0) Mujer (3.5 - 7.2) Hombre

Descripción:	ACIDO URICO ORINA
Código:	URI2
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	g/24h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL orina Toma de muestra final de la jornada laboral
Valores de referencia:	(0.25 - 0.75)

Descripción:	ACIDO VALPROICO
Código:	VALPROICO
Técnica:	EIA
Unidades:	µg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(50 - 100) Rango Terapeútico

Descripción:	ACIDO VALPROICO LIBRE
Código:	VALPROICOL
Técnica:	INMUNOLUMINISCENCIA
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(5 - 20)

Descripción:	ACIDO VANILMANDELICO ORINA (VMA)
Código:	VANILMAN
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	Acidificar tubo 10 ml con 50 ul HCl 5N o 50 ul Ácido Ácético Glacial.
Valores de referencia:	(1.0 - 2.6) 3 años - 6 años (2.0 - 3.2) 6 años - 10 años (2.3 - 5.2) 10 años - 16 años (1.4 - 6.6) > 16 años

Descripción:	ACIDOS BILIARES TOTALES
Código:	BILIARES
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alt. Plasma EDTA Tripotásico
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	ACIDOS GRASOS EN ERITROCITOS
Código:	AGRE
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	10 mL de sangre total (EDTA). refrigerar y proteger de la luz
Valores de referencia:	

Código: ACGRASOSCL

Descripción: Acidos Grasos de cadena larga, Suero

Técnica: Cromatografía de gases

Comentario adicional:
3 ml de SUERO CONGELADO. Evitar hemólisis
Separar el suero lo antes posible.
Congelar la muestra inmediatamente.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ACGRAC22		Perfil ácido graso de cadena larga (C22)	mcg/mL	(Inf. 32.8)
Prueba	ACGRAC24		Perfil ácido graso de cadena larga (C24)	mcg/mL	(Inf. 33.7)
Prueba	ACGRAC26		Perfil ácido graso de cadena larga (C26)	mcg/mL	(0.09 - 0.35)
Prueba	ACGRC24		Perfil ácido graso de cadena larga indice (C24/22)		(0.55 - 0.89)
Prueba	ACGRC26		Perfil ácido graso de cadena larga indice (C26/22)		(Inf. 0.02)
Prueba	ACGRACOM		Comentario acidos grasos de cadena muy larga		

Código: ACGERITRO

Descripción: Acidos Grasos Eritrocitarios (cuantificación),Sangre

Técnica: Cromatografía de gases

Comentario adicional:
10 mL Sangre total EDTA (2-8 ºC - Refrigerar)
Proteger de la luz.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	AGE.PALMIT		Perfil AG eritrocitarios: Acido Palmitoleico (C161n7)	%	(0.10 - 0.30)
Prueba	AGE.OLEICO		Perfil AG eritrocitarios: Acido Oleico (C18:1n9)	%	(14.70 - 19.80)
Prueba	AGE.ALINOL		Perfil AG eritrocitarios: Acido alfa-Linolenico (C18:3n3)	%	(0.04 - 0.16)
Prueba	AGE.EICOSA		Perfil AG eritrocitarios: Acido Eicosapentanoico (C20:5n3)	%	(0.60 - 2.30)
Prueba	AGE.DECOSA		Perfil AG eritrocitarios:Acido Docosahexanoico (C22:6n3)	%	(3.10 - 8.50)
Prueba	AGE.LINOLE		Perfil AG eritrocitarios: Acido Linoleico (C18:2n6)	%	(8.60 - 13.20)
Prueba	AGE.GLINOL		Perfil AG eritrocitarios: Acido gamma-Linolenico (C18:3n6)	%	(0.04 - 0.50)
Prueba	AGE.DGLINO		Perfil AG eritrocitarios: Acido GLA Linolenico (C20:3n6)	%	(0.95 - 2.00)
Prueba	AGE.ARAQUI		Perfil AG eritrocitarios:Acido Araquidonico (C20:4n6)	%	(10.00 - 16.00)
Prueba	AGE.MIRIST		Perfil AG eritrocitarios: Acido Miristico (C14:0)	%	(0.13 - 0.67)
Prueba	AGE.PALMIL		Perfil AG eritrocitarios: Acido Palmitico (C16:0)	%	(25.00 - 32.80)
Prueba	AGE.ESTEAR		Perfil AG eritrocitarios: Acido Estearico (C18:0):	%	(17.00 - 21.45)
Prueba	AGE.INDIC1		Perfil AG eritrocitarios: indice Ac.Estearico/Ac.Oleico		(Sup. 1.10)
Prueba	AGE.ELAIDI		Perfil AG eritrocitarios: Acido Elaidico (t-C18:1n9):	%	(0.90 - 1.16)
Prueba	AGE.OMEGA3		Perfil AG eritrocitario: Indice Omega-3		(Sup. 4.00)
Prueba	AGE.N6N3		Perfil AG eritrocitarios: Indice n6/n3		(2.70 - 6.00)
Prueba	AGE.SP		Perfil AG eritrocitarios: Saturados/Poliinsaturados		(1.00 - 1.20)

Componentes					
Prueba	AGE.O6O3		Perfil AG eritrocitarios: Indice Omega 6/Omega 3		(2.70 - 6.00)
Prueba	AGE.DHGLIN		Perfil AG eritrocitarios:1/Acido Dihomo-gamma-Linolenico	%	(0.40 - 0.70)
Prueba	AGE.AR_DHG		Perfil AG eritrocitarios: Ac.Araquidonico/DHG-linolenico		(5.50 - 13.10)
Prueba	AGE.1DOCOS		Perfil AG eritrocitarios: 1/Acido Docosahexanoico	%	(Inf. 0.30)
Prueba	AGE.LI_AR		Perfil AG eritrocitarios: Ac.Araquidonico/DHG-linolenico		(0.40 - 0.80)

Código: ACGRASFRA
Descripción: Acidos Grasos Fracciones(cuantificación), Suero
Técnica: Cromatografía de gases
Comentario adicional: 1 mL de suero. Proteger de la luz.
Plazo de entrega: 20 días.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MIRISTICO		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. MIRISTICO	µg/mL	(15.00 - 60.00)
Prueba	PALMITICO		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. PALMITICO	µg/mL	(320.00 - 1075.00)
Prueba	ESTEARICO		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. ESTEARICO	µg/mL	(127.00 - 305.00)
Prueba	PALMITOLEI		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. PALMITOLEICO	µg/mL	(33.00 - 125.00)
Prueba	OLEICO		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. OLEICO	µg/mL	(260.00 - 1250.00)
Prueba	LINOLEICO		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. LINOLEICO	µg/mL	(576.00 - 1300.00)
Prueba	DHGAMALINO		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. DH-GAMA-LINOLENICO	µg/mL	(38.00 - 105.00)
Prueba	ARAQUIDONI		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. ARAQUIDONICO	µg/mL	(108.00 - 422.00)
Prueba	GAMALINOLE		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. GAMA-LINOLENICO	µg/mL	(4.00 - 42.00)
Prueba	ALFALINOLE		Perfil Acidos grasos fracciones AC. ALFA-LINOLENICO	µg/mL	(3.00 - 21.00)
Prueba	EICOSAPENT		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. EICOSAPENTANOICO	µg/mL	(5.00 - 73.00)
Prueba	DOCOSAHEXA		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. DOCOSAHEXAENOICO	µg/mL	(36.00 - 160.00)

Descripción: ACIDOS GRASOS LIBRES (NEFA)
Código: NEFA
Técnica: Colorimetría
Unidades: µmol/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero congelado

Descripción: ACIDOS GRASOS LIBRES (NEFA)
Valores de referencia: (100 - 600) Hombre
(100 - 450) Mujer

Descripción: ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA 3 Y OMEGA 6
Código: OMEGA3Y6
Técnica: cromatografia de gases
Unidades: mcmol/L
Plazo: 31 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ACIDOS ORGANICOS EN LCR
Código: ORGANILCR
Técnica: téc. cromatografía de gases/espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Acidos organicos en sangre (plasma o suero)
Código: ORGANICO
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 33 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 mL Suero congelado
Valores de referencia:

Descripción: ACIDOS ORGANICOS ORINA
Código: ORGANIC2
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 20 mL de orina Congelada
Valores de referencia:

Descripción: Acidosis láctica infantil letal. Sec Gen: SUCLG1.
Código: GEN_000012
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidosis tubular renal distal. Sec Gen: SLC4A1.
Código: GEN_000013

Descripción: Acidosis tubular renal distal. Sec Gen: SLC4A1.
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidosis tubular renal proximal AR. Sec Gen: SLC4A4.
Código: GEN_000014
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria 3-Metilglutacónica. Panel
Código: GEN_000015
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria alfa metil acetoacetil. Sec Gen: ACAT1.
Código: GEN_000016
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria argininosuccínica. Sec Gen: ASL.
Código: GEN_000017
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria glutárica tipo 1. Sec Gen: GCDH.
Código: GEN_000003
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Aciduria glutárica tipo 1. Sec Gen: GCDH.
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria L-2-hidroxiglutárica. Sec Gen: L2HGDH.
Código: GEN_000018
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria malónica y metilmalónica combi. Sec Gen: ACSF3.
Código: GEN_000019
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria orótica. Sec Gen: UMPS.
Código: GEN_000020
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: ACILCARNIT
Descripción: ACILCARNITINAS
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional: 1 mL PLASMA HEPARINA/SUERO, congelar y enviar congelado. INDISPENSABLE ENVIAR INFORMACIÓN CLÍNICA

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CARNITILIB		CARNITINA LIBRE PLASMA	mcmol/L	(10 - 74)
Prueba	ACETILCAR		Perfil Acilcarnitinas: ACETIL CARNITINA	mcmol/L	(Inf. 28)
Prueba	PROPIOCAR		Perfil Acilcarnitinas:PROPIONIL CARNITINA	mcmol/L	(Inf. 1.80)
Prueba	BUTIRILCAR		Perfil Acilcarnitinas: BUTIRIL CARNITINA	mcmol/L	(Inf. 1.10)
Prueba	VALERILCAR		Perfil Acilcarnitinas: VALERIL CARNITINA	mcmol/L	(Inf. 0.60)
Prueba	GLUTARICAR		Perfil Acilcarnitinas: GLUTARIL CARNITINA	mcmol/L	(Inf. 0.12)
Prueba	HEXANOICAR		HEXANOICAR	mcmol/L	(Inf. 0.23)
Prueba	OCTANOICAR		Perfil Acilcarnitinas: OCTANOIL CARNITINA	mcmol/L	(Inf. 0.78)
Prueba	DECANOICAR		Perfil Acilcarnitinas: DECANOIL CARNITINA	mcmol/L	(Inf. 0.91)
Prueba	LAUROILCAR		Perfil Acilcarnitinas: LAUROIL CARNITINA	mcmol/L	(Inf. 0.35)

Componentes					
Prueba	MISTIROCAR		Perfil Acilcarnitinas: MISTIROIL CARNITINA	mcmol/L	(Inf. 0.15)
Prueba	PALMITOCAR		Perfil Acilcarnitinas: PALMITOIL CARNITINA (C16)	mcmol/L	(Inf. 0.52)
Prueba	OCTADECAR		Perfil Acilcarnitinas: OCTADECANOIL CARNITINA	mcmol/L	(Inf. 0.14)
Prueba	NOTACAR		Perfil Acilcarnitinas:COMENTARIO ACILCARNITINAS		

Descripción: ACLARAMIENTO DE ACIDO URICO
Código: CLEARANURI
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mL/min
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 1 mL Suero
Indicar diuresis
Valores de referencia: (Sup. 10)

Descripción: ACLARAMIENTO DE ALFA-1 ANTITRIPSINA FECAL
Código: ACLARATT
Técnica: Nefelometría
Unidades: mL/24 h
Plazo: 5 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 1 mL suero y 5 g heces. Indispensable indicar peso de heces/24 h o 72 h. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (Inf. 20)

Descripción: ACLARAMIENTO DE CREATININA
Código: CLEARANCEC
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mL/min
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: Suero y diuresis
Valores de referencia: (70 - 120)

Descripción: ACLARAMIENTO DE UREA
Código: CLEARANCEU
Técnica: Espectrofotometria
Unidades: mL/min
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: Suero y diuresis
Valores de referencia: (59 - 94) Depuración Estandar
(70 - 170) Depuración máxima

Descripción: Acondrogénesis tipo 2. Sec Gen: COL2A1.
Código: GEN_000021
Técnica:
Unidades:

Descripción: Acondrogénesis tipo 2. Sec Gen: COL2A1.
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acondroplasia: mutaciones G380R y G375C gen FGFR3
Código: ACONDROPLA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Acrodisostosis. Sec Gen: PRKAR1A.
Código: GEN_000022
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acromatopsia. Panel
Código: GEN_000023
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ACTH (H.ADRENOCORTICOTROPA) PLASMA
Código: ACTH
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Plasma EDTA Pruebas Especiales
Comentario adicional: Plasma EDTA separado y congelado. Enviar congelado.
Valores de referencia: (Inf. 46) Mañana
(Inf. 20) Tarde

Descripción: ACTIVIDAD ANTI FACTOR Xa
Código: ACTIVIDFXA
Técnica: método cronométrico
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días

Descripción: ACTIVIDAD ANTI FACTOR Xa
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: Separa plasma y congelar inmediatamente y enviar congelado al laboratorio
Valores de referencia: (0.5 - 1.0) Actividad terapeútica
(0.2 - 0.5) Actividad profiláctica

Código: ADALIMUMAB
Descripción: ADALIMUMAB NIVELES SUERO Y AC. ANTIADALIMUMAB
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Comentario adicional: 2 mL Suero. Toma de muestras antes de la administración de la próxima dosis.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ADALIMUNIV		PERFIL ADALIMUMAB NIVELES SUERO	µg/mL	(5.0 - 12.0)
Prueba	ADALIMUAC		PERFIL ADALIMUMAB AC. SUERO	ng/mL	(Inf. 10)

Descripción: Adams-Oliver tipo 5, Sd. Sec Gen: NOTCH1
Código: GEN_000693
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ADAMTS-13 anticuerpos en plasma
Código: ADAMTS13AC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 2 mL Plasma Citrato sódico, CONGELAR.
Valores de referencia:

Descripción: ADDIS RECUENTO ORINA
Código: ADDIS
Técnica: Microscopía óptica
Unidades: /24h
Plazo: 3 días
Tubo: ADDIS orina 24 horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1000000) Hematíes
(Inf. 2000000) Leucocitos
(Inf. 5000) C. Hialinos

Descripción: Adenocarcinoma de pulmón. Sec Gen: ERBB2.
Código: GEN_000024
Técnica:
Unidades:

Descripción: Adenocarcinoma de pulmón. Sec Gen: ERBB2.
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Adenomas aislados de hipófisis familiar. Sec Gen: AIP.
Código: GEN_000025
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ADENOSINA DESAMINASA (ADA) EN MUESTRA
Código: ADAMUES
Técnica:
Unidades: U/L
Plazo: 4 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ADENOSINA DESAMINASA (ADA) SUERO
Código: ADASU
Técnica: Cinética - Espectrofotometria
Unidades: U/L
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Prueba realizable en Líquidos biológicos
Valores de referencia: (5.0 - 30.0)

Descripción: ADENOSINA DESAMINASA LCR
Código: ADALCR
Técnica: Cinetica - Espectrofotometria
Unidades: U/L
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: Prueba realizable en Líquidos biológicos
Valores de referencia: (Inf. 5)

Descripción: ADENOVIRUS AC. IGG
Código: ADENOACG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: ADENOVIRUS AC. IGG
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: ADENOVIRUS AC. IgG EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: ADENOACGLC
Técnica: Tec. EIA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: ADENOVIRUS AC. IGM
Código: ADENOACM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Alternativa Plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado
(Sup. 11) Positivo

Descripción: ADENOVIRUS AC. IgM EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: ADENOACMLC
Técnica: TEC. EIA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: ADENOVIRUS ANTÍGENO EN HECES
Código: ADENOVI
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heces Microbiología
Comentario adicional: 5 g de heces
Valores de referencia:

Descripción: ADENOVIRUS ANTÍGENO EN MUESTRA NASO-FARINGEAS
Código: ADENORESP
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Microbiología

Descripción: ADENOVIRUS ANTÍGENO EN MUESTRA NASO-FARINGEAS
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Adenovirus DNA PCR Cualitativa
Código: PCRADENOV
Técnica: Q-PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo:
Comentario adicional: Líquidos y muestras biológicas
1mL sangre total EDTA
0.5 mL de LCR, refrigerado
5mL orina
Heces
Aspirado nasofaringeo, hisopo conjuntival. Pedir kit a almacén (escobillón con medio de transporte liquido)
Valores de referencia:

Descripción: ADIPONECTINA
Código: ADIPONECTI
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: mcg/mL
Plazo: 18 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero Cong. También plasma (EDTA, heparina)
CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (8.11 - 12.65) Hombre 20 años - 29 años
(5.00 - 11.70) Hombre 29 años - 39 años
(5.69 - 10.53) Hombre 39 años - 49 años
(7.07 - 12.51) Hombre 49 años - 65 años
(5.97 - 13.73) Mujer 20 años - 29 años
(5.46 - 16.40) Mujer 29 años - 39 años
(8.97 - 14.99) Mujer 39 años - 49 años
(8.34 - 14.62) Mujer 49 años - 61 años

Descripción: ADN CAPILAR: CARGA GENETICA ASOCIADA A ALOPECIA
Código: ADNCAPILAR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: Adrenoleucodistrofia ligada al X: gen ABCD1 (NGS)
Código: ABCD1_MUTS
Técnica: NGS con TSOE de Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Adrenoleucodistrofia ligada al X: gen ABCD1 (NGS)
Comentario adicional: Muestras de tejido tumotal y sangre.
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Afibrinogenemia congénita. Panel
Código: GEN_000026
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Afibrinogenemia congénita. Sec Gen: FGG.
Código: GEN_000027
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: AG NEURONALES NUCLEARES AC. EN LCR (AC. ONCONEURONALES)
Código: ACAAGNENUC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Adjuntar un breve informe clínico para la interpretación de resultados.
Valores de referencia:

Descripción: Agamaglobulinemia ligada al X. Sec Gen: BTK.
Código: GEN_000028
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Agenesia renal. Sec Gen: UPK3A.
Código: GEN_000029
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Agenesia renal. Sec Gen: UPK3A.
Valores de referencia:

Descripción: AGLUTININA ANTI-A
Código: AGLUANTIA
Técnica: Columna gel
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Plasma EDTA, alternativo suero
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: AGLUTININA ANTI-B
Código: AGLUANTIB
Técnica: Columna gel
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Plasma EDTA, alternativo suero
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: AGOMELATINA SUERO
Código: AGOMELATIN
Técnica: CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA-TÁNDEM MASAS
Unidades: ng/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = 1 hora después de 25 mg: 8.8 ng/mL
= 1 hora después de 50 mg: 21 ng/mL

Descripción: Alagille. Panel
Código: GEN_000030
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Albinismo cutáneo. Panel
Código: GEN_000031
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Albinismo ocular ligado al cr. X. Sec Gen: GPR143.
Código: GEN_000032

Descripción: Albinismo ocular ligado al cr. X. Sec Gen: GPR143.
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Albinismo oculocutáneo. Panel
Código: GEN_000033
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Albinismo oculocutáneo: gen TYR (NGS)
Código: TYROSINASA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: ALBUMINA
Código: ALB
Técnica:
Unidades: g/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(2.8 - 4.4) 1 dia - 4 dias
(3.8 - 5.4) 4 dias - 14 años
(3.5 - 5.2) 14 años - 60 años
(3.2 - 4.6) 60 años - 90 años
(2.9 - 4.5) > 90 años

Descripción: ALBUMINA EN LCR
Código: ALBLCR
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (15 - 35)

Descripción: Alcaptonuria. Sec Gen: HGD.
Código: GEN_000034

Descripción: Alcaptonuria. Sec Gen: HGD.
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ALCOHOL (ETANOL) EN ORINA
Código: ALCOHOLOR
Técnica: Enzimática
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10.0) Límite de detección de la técnica

---

Descripción: ALCOHOL (ETANOL)
Código: ALCOHOL
Técnica: Enzimática
Unidades: g/L
Plazo: 3 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Tubo de suero.Durante la extracción no utilizar alcohol etílico para desinfectar la zona. Rotular el tubo con la palabra "ETANOL". Tubo exclusivo para esta determinación.
Valores de referencia:
(Inf. 0.1) No detectable
(0.1 - 0.5) Ligera euforia
(0.5 - 1.0) Rubor, retardo de reflejos
(1.0 - 2.0) Depresión SNC
(Sup. 2.0) Intoxicación severa
(Sup. 3.5) Coma

Descripción: Alcohol metilico (metanol) en sangre
Código: METANOL
Técnica: Cromatografía gases-Detección con ionización de llama
Unidades: mg/L
Plazo: 11 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
2.1 mL sangre total (EDTA) refrigerado
Alternativo 2.1mL Suero refrigerado
Valores de referencia: (Inf. 1.60)

Descripción: ALDOLASA
Código: ALDOLASA
Técnica: Cinética- Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 ºC
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero o plasma citrato, oxalato o EDTA
Valores de referencia: (Inf. 7.6)

Descripción:	ALDOSTERONA
Código:	ALDOS
Técnica:	CLIA
Unidades:	ng/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero.
Valores de referencia:	(1.76 - 23.2) P. supina (2.52 - 39.2) P. erguida

Descripción:	Aldosterona en orina
Código:	ALDOS2
Técnica:	Téc. RIA
Unidades:	nmol/24h
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10 mL orina de orina de 24 h. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(3.88 - 49.94)

Descripción:	Alexander, enfermedad de. Sec Gen: GFAP.
Código:	GEN_000035
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ALFA AMILASA EN SALIVA
Código:	AMISALIVA
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	U/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	1 mL de saliva.
Valores de referencia:	(3.1 - 423.1) Valores orientativos

Descripción:	ALFA AMINOADIPICO SEMIALDEHIDO ORINA
Código:	AMINOADIOR
Técnica:	Cromatografía Líquida Tándem-Masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mmol/molcrea
Plazo:	47 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	10 mL orina micción aislada. Indispensable fecha de nacimiento e historia clínica del paciente.
Valores de referencia:	(0.27 - 2.85)

Descripción:	ALFA GLUCOSIDASA PLASMA SEMINAL
Código:	GLUCOSIDSE
Técnica:	Espectrofotometria
Unidades:	mUI/mL

Descripción: ALFA GLUCOSIDASA PLASMA SEMINAL
Plazo: 17 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: 1 ml de plasma seminal
Congelar y enviar congelado
Indicar volumen eyaculado
Valores de referencia: = Igual o superior a 20mU/eyaculado
= Igual o superior a 6.35 mUI/mL

Descripción: ALFA GLUCOSIDASA (E.POMPE) SANGRE SECA
Código: GLUCOSISEC
Técnica: Fluorimetrica
Unidades: nmols/21hxdisco
Plazo: 32 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Sangre seca recogida en papel de filtro especial
Pedir instrucciones
Indispensable informe clinico y antecedentes familiares
Valores de referencia: (0.47 - 8.27)

Descripción: ALFA-1 ANTITRIPSINA FECAL
Código: A1ATTFEC
Técnica: Téc. nefelometría
Unidades: mg/g heces húme
Plazo: 8 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 5 g de heces refrigeradas
Valores de referencia: (Inf. 0.30)

Descripción: ALFA-1-ANTITRIPSINA
Código: A1ANTI
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Valores de referencia: (90 - 200)

Descripción: Alfa-1-Antitripsina fenotipo en suero
Código: A1ANTIFENO
Técnica: isoelectroenfoque e inmunofijación
Unidades: %
Plazo: 21 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL. Separar y enviar congelado
Valores de referencia:

Descripción: ALFA-1-FETOPROTEINA
Código: A1FETO.
Técnica: CMIA
Unidades: ng/mL

Descripción: ALFA-1-FETOPROTEINA
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Alternativo heparina de sodio y litio, EDTA.
Valores de referencia: (Inf. 8.8)
= Observaciones: En los primeros meses de vida, los valores son mucho más elevados, descendiendo gradualmente

---

Descripción: ALFA-1-FETOPROTEINA LIQUIDO AMNIOTICO
Código: A1FETOLIQ
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: =16410 Mediana semana 15
=13380 Mediana semana 16
=10910 Mediana semana 17
=8890 Mediana semana 18
=7250 Mediana semana 19
=5910 Mediana semana 20
=4820 Mediana semana 21

Descripción: ALFA-1-FETOPROTEINALCR
Código: A1FETOLCR
Técnica: Inmunoluminiscencia
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ALFA-1-GLUCOPROTEINA ACIDA (OROSOMUCOIDE)
Código: A1GLUCO
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (50 - 120)

Descripción: ALFA-1-MICROGLOBULINA (ORINA)
Código: ALFA1MICRO
Técnica: Inmunonefelometría
Unidades: mg/L
Plazo: 13 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 8)

Descripción:	Alfa2-Antiplasmina en plasma
Código:	ANTIPLASMI
Técnica:	Téc. Espectrometria de Absorción Molecular
Unidades:	%
Plazo:	12 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	2 mL Plasma Citrato Sódico congelado
Valores de referencia:	(80 - 120)

Descripción:	Alfa-2-Macroglobulina
Código:	A2MACRO
Técnica:	Inmunonefelometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero o plasma heparina. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(130 - 300) Hombre (130 - 300) Mujer

Descripción:	Alfa-Galactosidasa A
Código:	ALFAGALAC
Técnica:	fluorometría
Unidades:	nmol/h/mL
Plazo:	34 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	3 mL suero, Congelar inmediatamente. Alternativo 3 mL Plasma EDTA congelado. Se requiere información clínica.
Valores de referencia:	(2.40 - 10.20)

Descripción:	Alfa-manosidosis. Sec Gen: MAN2B1.
Código:	GEN_000037
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Alfa-talasemia HBA. Del a3.7, a4.2, a20.5, aSEA, aFIL, aMED
Código:	GEN_000038
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Alfa-talasemia. Sec Gen: HBA.
Código:	GEN_000039

Descripción: Alfa-talasemia. Sec Gen: HBA.
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Allan-Herndon-Dudley, Sd. Sec Gen: SLC16A2.
Código: GEN_000040
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Alport y nefropatía por membrana basal fina, Sd. Panel
Código: GEN_000041
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ALPRAZOLAM
Código: ALPRAZOLAM
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero
Valores de referencia: (5 - 50)

Descripción: Alteraciones de la región 19q13. Reord/Amplificación
Código: MDFISH19Q
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
min 2 ml médula ósea.
Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Alteraciones del gen EGFR (17p11). Reord/Amplificación.
Código: MDFISHEGFR
Técnica:
Unidades:

Descripción: Alteraciones del gen EGFR (17p11). Reord/Amplificación.
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
min 2 ml médula ósea.
Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Alteraciones del gen FGFR1 (8p11). Reord/Amplificación
Código: MDFISHFGFR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
min 2 ml médula ósea.
Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Alteraciones del gen MET (7q31). Reord/Amplificación
Código: MDFISHMET
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
min 2 ml médula ósea.
Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Alteraciones numéricas del cromosoma 3
Código: MDFISHCEN3
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
min 2 ml médula ósea.
Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Alteraciones numéricas del cromosoma 7
Código: MDFISHCEN7
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
min 2 ml médula ósea.
Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Alteraciones numéricas del cromosoma 8 (Trisomía 8)
Código: MDFISHCEN8
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
min 2 ml médula ósea.
Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: ALUMINIO
Código: AL
Técnica: Técnica ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 11 días
Tubo: especial aluminio
Comentario adicional: Tubo especial con instrucciones según protocolo.
Valores de referencia: (Inf. 20)
(Inf. 45) Pacientes en diálisis

Descripción: ALUMINIO EN ORINA
Código: AL2
Técnica: Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades: mcg/g creatin.
Plazo: 7 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada). Al final del turno en exposición laboral.
Valores de referencia:

Descripción: Alzheimer, enfermedad de. Panel
Código: GEN_000044
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: AMANITINAS (AMATOXINAS) EN ORINA
Código: AMANITINAS
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL de orina
Valores de referencia: (Inf. 3)

Descripción: Amaurosis congénita de Leber 13: gen RDH12 (NGS)
Código: RDH12_MUTS

Descripción: Amaurosis congénita de Leber 13: gen RDH12 (NGS)
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Amaurosis congénita de Leber: >10 genes (NGS)
Código: LEBER_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: AMIKACINA
Código: AMIKA
Técnica: FPIA
Unidades: mcg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (15 - 25) Pico
(25 - 35) Pico - Infecciones severas
(Sup. 35) Pico - Tóxico
(Inf. 5) Valle

Descripción: AMILASA
Código: AMI
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 ºC
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
También Líquidos biológicos
Valores de referencia: (25 - 125) < 70 años
(20 - 160) > 70 años

Código: AMILAISO
Descripción: AMILASA ISOENZIMAS SUERO
Técnica: Electroforesis en gel de agarosa
Comentario adicional: 1 mL suero.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	AMILAISP		Perfil Amilasa isoenzimas fraccion pancreatica	%	(26.0 - 58.0)

Componentes					
Prueba	AMILAISS2		Perfil Amilasa isoenzimas fraccion salivar S2	%	(35.0 - 61.0)
Prueba	AMILAIS34		Perfil Amilasa isoenzimas fraccion salivar S3+S4	%	(3.0 - 16.0)

Descripción: AMILASA ORINA
Código: AMI2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L
Plazo: 3 días
Tubo: Orina Bioquímica
Comentario adicional:
Valores de referencia: (110 - 555)

Descripción: AMILASA PANCREATICA
Código: AMIPAN
Técnica: Inhibición con anticuerpos - Enzimático colorimétrico
Unidades: U/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
0.5 ml plasma heparina litio alternativo
Valores de referencia: (13 - 53)

Descripción: AMILASA PANCREATICA EN LIQUIDO QUISTICO
Código: AMILLIQQ
Técnica: Cinética-inhibición: Inhibición por anticuerpos monoclonales (substrato etilideno G7 PNP)
Unidades: U/L
Plazo: 5 días
Tubo: Líquido Bioquímica
Comentario adicional: 1 mL de líquido de quiste pancreático
Valores de referencia: (Inf. 250)

Descripción: AMILOIDE A (SAA-1) SUERO
Código: AMILOIDEA
Técnica: INMUNOANÁLISIS
Unidades: mg/L
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero. Alternativo plasma EDTA
CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (Inf. 5.0)

Código: AMINOLCR
Descripción: AMINOACIDOS LCR (COMPLETO)
Técnica: UHPLC
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ASPLCR		AC. ASPARTICO EN LCR	mcmol/L	(Inf. 10) Niños (Inf. 6) Adultos
Prueba	GLUTLCR		AC. GLUTAMICO EN LCR	mcmol/L	(1 - 48) Adultos
Prueba	ASPALCR		ASPARAGINA EN LCR	mcmol/L	(4 - 40) Adulto
Prueba	SERLCR		SERINA EN LCR	mcmol/L	(27 - 70) Niños (20 - 41) Adultos
Prueba	GLUTHILCR		GLUTAMINA+HISTIDINA EN LCR	mcmol/L	(360 - 910) Niños (355 - 910) Adultos
Prueba	GLILCR		GLICINA LCR	mcmol/L	(1 - 16) Niños (3 - 11) Adultos
Prueba	TRELCR		TREONINA EN LCR	mcmol/L	(12 - 74) Niños (18 - 45) Adultos
Prueba	ARGLCR		ARGININA LCR	mcmol/L	(5 - 28) Niños (7 - 30) Adultos
Prueba	ALALCR		ALANINA EN LCR	mcmol/L	(6 - 47) Niños (15 - 44) Adultos
Prueba	TAULCR		TAURINA EN LCR	mcmol/L	(2 - 26) Niños (4 - 11) Adultos
Prueba	TIRLCR		TIROSINA LCR	mcmol/L	(5 - 24) Niños (5 - 17) Adultos
Prueba	METLCR		METIONINA EN LCR	mcmol/L	(Inf. 8) Adultos
Prueba	VALLCR		VALINA LCR	mcmol/L	(4 - 28) Niños (7 - 31) Adultos
Prueba	TRIPLCR		TRIPTOFANO LCR	mcmol/L	(Inf. 3) Adultos
Prueba	FENALALCR		FENILALANINA LCR	mcmol/L	(7 - 16) Niños (5 - 15) Adultos
Prueba	ISOLELCR		ISOLEUCINA LCR	mcmol/L	(3 - 15) Niños (1 - 11) Adultos
Prueba	LEULCR		LEUCINA EN LCR	mcmol/L	(6 - 21) Niños (7 - 23) Adultos
Prueba	ORNLCR		ORNITINA LCR	mcmol/L	(Inf. 14) Niños (Inf. 7) Adultos
Prueba	LISLCR		LISINA LCR	mcmol/L	(10 - 33) Niños (12 - 37) Adultos

Código: AMINOLCM2

Descripción: AMINOACIDOS ORINA (COMPLETO)

Técnica: Ultra cromatografía líquida de alta presión (UHPLC)

Comentario adicional: 10 - 20 mL de orina. CONGELAR

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ACA2		PERFIL AÁ ORINA: AC. ASPARTICO ORINA	mmol/mol crea	(2.0 - 50.0) > 18 años (2.0 - 50.0) < 18 años
Prueba	ACG2		PERFIL AÁ ORINA: AC. GLUTAMICO ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 12.0) > 18 años (Inf. 30.0) < 2 años (Inf. 20.0) 2 años - 12 años (Inf. 10) 12 años - 18 años

Componentes					
Prueba	ASP2		PERFIL AÁ ORINA: ASPARAGINA ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 125) > 18 años (Inf. 125) < 18 años
Prueba	SER2		PERFIL AÁ ORINA:SERINA EN ORINA	mmol/mol crea	(17.0 - 50.0) > 18 años (40.0 - 290) < 1 mes (40.0 - 200) 1 mes - 12 años (20 - 160) 12 años - 18 años
Prueba	GLI2		PERFIL AÁ ORINA: GLICINA ORINA	mmol/mol crea	(40.0 - 200.0) > 18 años (50 - 1090) < 1 mes (50 - 740) 1 mes - 2 años (50 - 360) 2 años - 12 años (50 - 350) 12 años - 18 años
Prueba	TRE2		PERFIL AÁ ORINA: TREONINA ORINA	mmol/mol crea	(3.0 - 30.0) > 18 años (6 - 140) < 1 mes (6 - 90) 1 mes - 2 años (6 - 70) 2 años - 18 años
Prueba	ARG2		PERFIL AÁ ORINA: ARGININA ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 10.0) > 18 años (Inf. 15.0) < 12 años (Inf. 17.0) 12 años - 18 años
Prueba	ALA2		PERFIL AÁ ORINA: ALANINA ORINA	mmol/mol crea	(2.0 - 70.0) > 18 años (10 - 240) < 1 mes (10 - 200) 1 mes - 2 años (10 - 160) 2 años - 12 años (4 - 115) 12 años - 18 años
Prueba	TIR2		PERFIL AÁ ORINA: TIROSINA ORINA	mmol/mol crea	(1.0 - 50.0) > 18 años (3 - 60) < 12 años (1 - 55) 12 años - 18 años
Prueba	MET2		PERFIL AÁ ORINA: METIONINA ORINA	mmol/mol crea	(0.5 - 16.0) > 18 años (1 - 40) < 1 mes (1 - 25) 1 mes - 2 años (1 - 20) 2 años - 12 años (1 - 21) 12 años - 18 años
Prueba	VAL2		PERFIL AÁ ORINA: VALINA ORINA	mmol/mol crea	(1.0 - 15.0) > 18 años (1 - 26) < 1 mes (1 - 20) 1 mes - 18 años
Prueba	TRI2		PERFIL AÁ ORINA:TRIPTOFANO ORINA	mmol/mol crea	(2.0 - 25.0) > 18 años (2 - 50) < 18 años
Prueba	FEN2		PERFIL AÁ ORINA: FENILALANINA	mmol/mol crea	(2.0 - 60.0) > 18 años (3 - 30) < 12 años (3 - 50) 12 años - 18 años
Prueba	ISO2		PERFIL AÁ ORINA: ISOLEUCINA	mmol/mol crea	(Inf. 4.0) > 18 años (Inf. 7) < 18 años
Prueba	LEU2		PERFIL AÁ ORINA: LEUCINA ORINA	mmol/mol crea	(1.0 - 12.0) > 18 años (1 - 32) < 1 mes (1 - 30) 1 mes - 12 años (1 - 18) 12 años - 18 años
Prueba	ORN2		PERFIL AÁ ORINA: ORNITINA ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 6.0) > 18 años (Inf. 20) < 1 mes (Inf. 15) 1 mes - 2 años (Inf. 8) 2 años - 12 años (Inf. 6) 12 años - 18 años
Prueba	LIS2		PERFIL AÁ ORINA: LISINA EN ORINA	mmol/mol crea	(1.0 - 60.0) > 18 años (1 - 170) < 1 mes (1 - 200) 1 mes - 2 años (1 - 80) 2 años - 12 años (0.5 - 70) 12 años - 18 años
Prueba	FOS2		PERFIL AÁ ORINA: FOSFOSERINA	mmol/mol crea	(Inf. 100) > 18 años (Inf. 100) < 18 años
Prueba	HID2		PERFIL AÁ ORINA: HIDROXIPROLINA	mmol/mol crea	(Inf. 200.0) > 18 años (Inf. 200) < 18 años

Componentes					
Prueba	FETA2		PERFIL AÁ ORINA: FOSFOETANOLAMINA	mmol/mol crea	(1.0 - 146.0) > 18 años (1 - 222) < 18 años
Prueba	HIS2		PERFIL AÁ ORINA: HISTIDINA	mmol/mol crea	(25.0 - 180.0) > 18 años (40 - 300) < 1 mes (40 - 350) 1 mes - 2 años (40 - 290) 2 años - 12 años (40 - 300) 12 años - 18 años
Prueba	SUL2		PERFIL AÁ ORINA: SULFOCISTEÍNA	mmol/mol crea	(Inf. 1.0) > 18 años (Inf. 1.0) < 18 años
Prueba	ASG2		PERFIL AÁ ORINA: ASPARTILGLUCOSAMINA	mmol/mol crea	(Inf. 10.0) > 18 años (Inf. 10.0) < 18 años
Prueba	MTH_32		PERFIL AÁ ORINA: 3-METILHISTIDINA	mmol/mol crea	(Inf. 250.0) > 18 años (Inf. 350) < 18 años
Prueba	TAU2		PERFIL AÁ ORINA: TAURINA	mmol/mol crea	(16.0 - 200.0) > 18 años (6 - 250) < 1 mes (6 - 200) 1 mes - 2 años (6 - 200) 2 años - 12 años (13 - 350) 12 años - 18 años
Prueba	MTH_12		PERFIL AÁ ORINA: 1-METILHISTIDINA	mmol/mol crea	(Inf. 85.0) > 18 años (Inf. 100) < 12 años (Inf. 200) 12 años - 18 años
Prueba	GTM2		PERFIL AÁ ORINA: GLUTAMINA	mmol/mol crea	(20.0 - 100.0) > 18 años (20 - 250) < 2 años (20 - 270) 2 años - 12 años (20 - 250) 12 años - 18 años
Prueba	CAR2		PERFIL AÁ ORINA: CARNOSINA	mmol/mol crea	(Inf. 25.0) > 18 años (Inf. 85) < 18 años
Prueba	ANS2		PERFIL AÁ ORINA: ANSERINA	mmol/mol crea	(Inf. 200.0) > 18 años (Inf. 200) < 12 años (Inf. 400) 12 años - 18 años
Prueba	ETA2		PERFIL AÁ ORINA: ETANOLAMINA	mmol/mol crea	(Inf. 85.0) > 18 años (Inf. 300) < 1 mes (Inf. 100) 1 mes - 12 años (Inf. 85) 12 años - 18 años
Prueba	AAS2		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO ARGININSUCCINICO	mmol/mol crea	(Inf. 1.0) > 18 años (Inf. 1) < 18 años
Prueba	SAR2		PERFIL AÁ ORINA: SARCOSINA	mmol/mol crea	(Inf. 30.0) > 18 años (Inf. 30) < 18 años
Prueba	CIT2		PERFIL AÁ ORINA: CITRULINA	mmol/mol crea	(Inf. 14.0) > 18 años (Inf. 14) < 18 años
Prueba	BAL2		PERFIL AÁ ORINA: BETA-ALANINA	mmol/mol crea	(Inf. 20.0) > 18 años (Inf. 30) < 1 mes (Inf. 20) 1 mes - 18 años
Prueba	AAL2		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO AMINOLEVULINICO	mmol/mol crea	(Inf. 1.0) > 18 años (Inf. 1.0) < 18 años
Prueba	HOM2		PERFIL AÁ ORINA: HOMOCITRULINA	mmol/mol crea	(Inf. 9.0) > 18 años (Inf. 9) < 18 años
Prueba	AGAB2		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO GAMMA AMINO BUTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 8.0) > 18 años (Inf. 20) < 1 mes (Inf. 8) 1 mes - 18 años
Prueba	AAD2		PERFIL AÁ ORINA: AMINOADIPICO	mmol/mol crea	(Inf. 25.0) > 18 años (Inf. 25) < 18 años
Prueba	PRO2		PERFIL AÁ ORINA: PROLINA	mmol/mol crea	(Inf. 20.0) > 18 años (10 - 215) < 1 mes (Inf. 130) 1 mes - 2 años (Inf. 40) 2 años - 18 años

Componentes					
Prueba	ABAB2		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO BETA AMINOISOBTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 90.0) > 18 años (Inf. 200) < 1 mes (Inf. 215) 1 mes - 2 años (Inf. 230) 2 años - 12 años (Inf. 175) 12 años - 18 años
Prueba	HILIS_12		PERFIL AÁ ORINA: HIDROXILISINA 1	mmol/mol crea	(Inf. 25.0) > 18 años (Inf. 25) < 18 años
Prueba	HILIS_22		PERFIL AÁ ORINA: HIDROXILISINA 2	mmol/mol crea	(Inf. 11.0) > 18 años (Inf. 20) < 1 mes (Inf. 11) 1 mes - 18 años
Prueba	CISTA2		PERFIL AÁ ORINA: CISTATIONINA	mmol/mol crea	(Inf. 8.0) > 18 años (Inf. 8) < 18 años
Prueba	AAAB2		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO ALFA AMINO BUTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 25)
Prueba	CIS2		PERFIL AÁ ORINA: CISTINA	mmol/mol crea	(3.0 - 25.0) > 18 años (4 - 110) < 1 mes (4 - 80) 1 mes - 2 años (4 - 50) 2 años - 12 años (4 - 45) 12 años - 18 años
Prueba	APP2		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO PIPECOLICO	mmol/mol crea	(Inf. 1.0) > 18 años (Inf. 1) < 18 años
Prueba	SAC2		PERFIL AÁ ORINA: SACAROPINA	mmol/mol crea	(Inf. 1.0) > 18 años (Inf. 1) < 18 años
Prueba	ALLOI2		PERFIL AÁ ORINA: ALLO-ISOLEUCINA	mmol/mol crea	(Inf. 5.0) > 18 años (Inf. 5) < 18 años
Prueba	HOMO2		PERFIL AÁ ORINA: HOMOCISTEINA	mmol/mol crea	(Inf. 2.0) > 18 años (Inf. 2) < 18 años
Prueba	CAMINO2		COMENTARIO AMINOACIDOS ORINA		

Código: AMINO30

Descripción: AMINOACIDOS Plasma AAS (LC-MS/MS)

Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)

Comentario adicional: Plasma HEPARINA congelado.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BIO.ALANIN		Perfil 30 AÁ: ALANINA	µmol/L	(233 - 331) < 1 mes (253 - 427) 1 mes - 6 meses (238 - 400) 6 meses - 1 año (224 - 324) 1 año - 2 años (215 - 343) 2 años - 4 años (226 - 410) 4 años - 7 años (214 - 346) 7 años - 10 años (255 - 431) 10 años - 13 años (286 - 416) > 13 años
Prueba	BIO.ARGIN		Perfil 30 AÁ: ARGININA	µmol/L	(49 - 77) < 1 mes (56 - 104) 1 mes - 6 meses (60 - 98) 6 meses - 1 año (52 - 88) 1 año - 2 años (56 - 92) 2 años - 4 años (66 - 104) 4 años - 7 años (54 - 104) 7 años - 10 años (55 - 95) 10 años - 13 años (61 - 103) > 13 años

Componentes					
Prueba	BIO.ASPARG		Perfil 30 AÁ: ASPARAGINA	µmol/L	(48 - 76) < 6 meses (40 - 86) 6 meses - 1 año (40 - 72) 1 año - 2 años (44 - 66) 2 años - 4 años (37 - 73) 4 años - 7 años (36 - 70) 7 años - 10 años (45 - 69) 10 años - 13 años (45 - 72) > 13 años
Prueba	BIO.ASPART		Perfil 30 AÁ: ACIDO ASPARTICO	µmol/L	
Prueba	BIO.CITRUL		Perfil 30 AÁ: CITRULINA	µmol/L	(12 - 28) < 1 mes (20 - 34) 1 mes - 6 meses (23 - 33) 6 meses - 1 año (21 - 35) 1 año - 2 años (16 - 34) 2 años - 4 años (22 - 34) 4 años - 7 años (18 - 34) 7 años - 10 años (24 - 36) 10 años - 13 años (20 - 34) > 13 años
Prueba	BIO.CISTIN		Perfil 30 AÁ: CISTINA	µmol/L	(61 - 105) < 1 mes (64 - 100) 1 mes - 6 meses (61 - 103) 6 meses - 1 año (62 - 96) 1 año - 2 años (58 - 94) 2 años - 4 años (66 - 102) 4 años - 7 años (70 - 98) 7 años - 10 años (68 - 98) 10 años - 13 años (65 - 109) > 13 años
Prueba	BIO.ACGLUT		Perfil 30 AÁ: ACIDO GLUTAMICO	µmol/L	(25 - 155) < 1 año (9 - 107) > 1 año
Prueba	BIO.GLUTAM		Perfil 30 AÁ: GLUTAMINA	µmol/L	(400 - 760) < 1 año (432 - 706) > 1 año
Prueba	BIO.GLICIN		Perfil 30 AÁ: GLICINA	µmol/L	(189 - 291) < 1 mes (182 - 264) 1 mes - 6 meses (201 - 289) 6 meses - 1 año (186 - 238) 1 año - 2 años (187 - 295) 2 años - 4 años (187 - 263) 4 años - 7 años (179 - 269) 7 años - 10 años (190 - 276) 10 años - 13 años (181 - 293) > 13 años
Prueba	BIO.HISTID		Perfil 30 AÁ: HISTIDINA	µmol/L	(61 - 91) < 1 mes (69 - 101) 1 mes - 6 meses (58 - 104) 6 meses - 1 año (35 - 61) 1 año - 2 años (65 - 89) 2 años - 4 años (64 - 96) 4 años - 7 años (73 - 97) 7 años - 10 años (68 - 94) 10 años - 13 años (73 - 97) > 13 años
Prueba	BIO.HIDROX		Perfil 30 AÁ: HIDROXIPROLINA	µmol/L	(20 - 80) < 1 mes (Inf. 73) 1 mes - 6 meses (Inf. 43) 6 meses - 1 año (Inf. 29) 1 año - 2 años (Inf. 30) 2 años - 4 años (Inf. 36) 4 años - 7 años (Inf. 15) 7 años - 10 años (Inf. 28) 10 años - 13 años (Inf. 37) > 13 años

Componentes					
Prueba	BIO.ISOLEU		Perfil 30 AÁ: ISOLEUCINA	µmol/L	(40 - 80) < 1 mes (56 - 90) 1 mes - 6 meses (44 - 72) 6 meses - 1 año (43 - 67) 1 año - 2 años (49 - 73) 2 años - 4 años (50 - 76) 4 años - 7 años (57 - 77) 7 años - 10 años (54 - 82) 10 años - 13 años (54 - 78) > 13 años
Prueba	BIO.ALLOIS		Perfil 30 AÁ: ALLO-ISOLEUCINA	µmol/L	
Prueba	BIO.LEUCIN		Perfil 30 AÁ: LEUCINA	µmol/L	(79 - 151) < 1 mes (107 - 157) 1 mes - 6 meses (83 - 135) 6 meses - 1 año (82 - 128) 1 año - 2 años (94 - 148) 2 años - 4 años (93 - 143) 4 años - 7 años (110 - 158) 7 años - 10 años (104 - 154) 10 años - 13 años (109 - 153) > 13 años
Prueba	BIO.LISINA		Perfil 30 AÁ: LISINA	µmol/L	(141 - 211) < 1 mes (153 - 239) 1 mes - 6 meses (133 - 219) 6 meses - 1 año (124 - 202) 1 año - 4 años (172 - 210) 4 años - 7 años (147 - 225) 7 años - 10 años (161 - 203) 10 años - 13 años (157 - 231) > 13 años
Prueba	BIO.METION		Perfil 30 AÁ: METIONINA	µmol/L	(23 - 35) < 1 mes (24 - 38) 1 mes - 6 meses (13 - 31) 6 meses - 1 año (20 - 26) 1 año - 2 años (17 - 27) 2 años - 4 años (19 - 35) 4 años - 7 años (20 - 32) 7 años - 10 años (22 - 32) 10 años - 13 años (21 - 35) > 13 años
Prueba	BIO.ORNIT		Perfil 30 AÁ: ORNITINA	µmol/L	(55 - 121) < 1 mes (59 - 99) 1 mes - 6 meses (45 - 91) 6 meses - 1 año (41 - 75) 1 año - 2 años (40 - 74) 2 años - 4 años (60 - 98) 4 años - 7 años (42 - 90) 7 años - 10 años (48 - 104) 10 años - 13 años (50 - 100) > 13 años
Prueba	BIO.FENILA		Perfil 30 AÁ: FENILALANINA	µmol/L	(45 - 65) < 1 mes (49 - 67) 1 mes - 6 meses (44 - 68) 6 meses - 1 año (43 - 57) 1 año - 2 años (43 - 59) 2 años - 4 años (44 - 66) 4 años - 7 años (48 - 68) 7 años - 10 años (41 - 71) 10 años - 13 años (43 - 65) > 13 años
Prueba	BIO.PROLIN		Perfil 30 AÁ: PROLINA	µmol/L	(149 - 233) < 1 mes (135 - 239) 1 mes - 6 meses (138 - 232) 6 meses - 1 año (128 - 198) 1 año - 2 años (127 - 201) 2 años - 4 años (117 - 229) 4 años - 7 años (129 - 203) 7 años - 10 años (120 - 270) 10 años - 13 años (150 - 224) > 13 años

Componentes					
Prueba	BIO.SERINA		Perfil 30 AÁ: SERINA	µmol/L	(107 - 163) < 1 mes (111 - 165) 1 mes - 6 meses (111 - 197) 6 meses - 1 año (111 - 159) 1 año - 2 años (101 - 167) 2 años - 4 años (108 - 164) 4 años - 7 años (111 - 163) 7 años - 10 años (103 - 145) 10 años - 13 años (98 - 174) > 13 años
Prueba	BIO.TAURIN		Perfil 30 AÁ: TAURINA	µmol/L	(30 - 170) < 1 mes (29 - 143) 1 mes - 6 meses (46 - 116) 6 meses - 1 año (40 - 112) 1 año - 2 años (48 - 92) 2 años - 4 años (47 - 115) 4 años - 7 años (53 - 135) 7 años - 10 años (43 - 107) 10 años - 13 años (30 - 116) > 13 años
Prueba	BIO.TREONI		Perfil 30 AÁ: TREONINA	µmol/L	(89 - 167) < 1 mes (102 - 179) 1 mes - 6 meses (78 - 162) 6 meses - 1 año (78 - 116) 1 año - 2 años (72 - 130) 2 años - 4 años (92 - 144) 4 años - 7 años (86 - 146) 7 años - 10 años (88 - 180) 10 años - 13 años (97 - 197) > 13 años
Prueba	BIO.TRIPTO		Perfil 30 AÁ: TRIPTOFANO	µmol/L	
Prueba	BIO.TIROSI		Perfil 30 AÁ: TIROSINA	µmol/L	(52 - 106) < 1 mes (59 - 101) 1 mes - 6 meses (48 - 74) 6 meses - 1 año (49 - 69) 1 año - 2 años (49 - 77) 2 años - 4 años (52 - 80) 4 años - 7 años (48 - 84) 7 años - 10 años (53 - 87) 10 años - 13 años (50 - 76) > 13 años
Prueba	BIO.VALINA		Perfil 30 AÁ: VALINA	µmol/L	(145 - 249) < 1 mes (186 - 264) 1 mes - 6 meses (176 - 250) 6 meses - 1 año (173 - 253) 1 año - 2 años (187 - 295) 2 años - 4 años (196 - 272) 4 años - 7 años (226 - 280) 7 años - 10 años (209 - 293) 10 años - 13 años (213 - 283) > 13 años
Prueba	BIO.1METIL		Perfil 30 AÁ: 1-METILHISTIDINA	µmol/L	
Prueba	BIO.AAMNBU		Perfil 30 ÁA: ACIDO ALFA-AMINOBUTIRICO	µmol/L	
Prueba	BIO.ARGSUC		PErfil 30 ÁA: ACIDO ARGININSUCCINICO	µmol/L	
Prueba	BIO.BETAAL		Perfil 30 ÁA: BETA-ALANINA	µmol/L	
Prueba	BIO.ETAAMI		Perfil 30 AÁ: ETANOLAMINA	µmol/L	
Prueba	BIO.FOSFOE		Perfil 30 ÁA: FOSFOETANOLAMINA	µmol/L	
Prueba	BIO.SARCOS		Perfil 30 AÁ: SARCOSINA	µmol/L	
Prueba	BIO.SACARO		Perfil 30 AÁ: SACAROPINA	µmol/L	
Prueba	BIO.COMENT		Comentario		

Descripción: Amiodarona en suero
Código: AMIODARONA
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades: mcg/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.52 - 2.52)
(Sup. 2.51) Tóxico

Descripción: Amiotrofia escapuloperoneal: Kaeser, Sd. Sec Gen: DES.
Código: GEN_000045
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: AMITRIPTILINA+NORTRIPTILINA
Código: AMITRIP
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL de suero.
Muestra extraída en pre dosis.
Valores de referencia: (80 - 200) Margen terapéutico según consenso europeo AGNP-TDM

Descripción: AMONIACO (AMONIO) EN LCR
Código: AMONLCR
Técnica: Espectrofotometría ultravioleta
Unidades: µg/dL
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 50)

Descripción: AMONIO (AMONIACO) EN PLASMA
Código: AMONIACO
Técnica: Colorimetría
Unidades: mcmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL de plasma EDTA congelado
Valores de referencia: (9 - 30)

Descripción: AMONIO ORINA AISLADA
Código: AMONIO
Técnica: Espectrofotometría

Descripción: AMONIO ORINA AISLADA
Unidades: g/L
Plazo: 7 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 1 mL Orina 24h. (alícuota)
Congelar la muestra inmediatamente.
Valores de referencia:

Descripción: AMPA 1 ANTICUERPOS SUERO
Código: AMPA1
Técnica: Inmunocitoquímica (Cell Based Assay).
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero
Valores de referencia: = Negativo Título < 1:10

Descripción: AMPA 2 ANTICUERPOS SUERO
Código: AMPA2
Técnica: Inmunocitoquímica (Cell Based Assay).
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero
Valores de referencia: = Negativo Título < 1:10

Descripción: AMP-CICLICO NEFROGENICO ORINA/PLASMA
Código: AMPNEFRO
Técnica: Radioisotópica
Unidades: nmol/dL F.G.
Plazo: 32 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: PLASMA EDTA CONGELADO Y ORINA 24H CONGELADA
Valores de referencia: (0.3 - 3.8) filtrado glomerular

Descripción: AMP-CICLICO ORINA
Código: AMPCI2
Técnica: Radioisotópica por unión competitiva
Unidades: nmol/24 h
Plazo: 8 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: ORINA 24 H CONGELADA (10 mL)
10mL de orina 24h. CONGELAR
Valores de referencia: (2260 - 10000)

Descripción: AMP-CICLICO PLASMA
Código: AMPCI
Técnica: Radioisotópica
Unidades: nmol/L
Plazo: 23 días

Descripción: AMP-CICLICO PLASMA
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 2 ml PLASMA EDTA CONGELADO
Valores de referencia: (18 - 45.4)

Descripción: AMPHIPHYSINA AC. EN LCR
Código: AMPHILCR
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 0.5 ml LCR
Valores de referencia:

Descripción: Amplificación del gen MDM2 (12q15).
Código: MDFISHMDM2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
min 2 ml médula ósea.
Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Amplificacion gen MYCN, y regiones 17p, 17q
Código: MYCN
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 1 mutacion de cualquier gen (sec. Sanger)
Código: UNA_MUTACI
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 1 mutación de cualquier gen por MLPA
Código: SOLO_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días

Descripción: Análisis de 1 mutación de cualquier gen por MLPA
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ANÁLISIS DE ANTICUERPOS ANTI RECEPTORES DE GLICINA EN MUESTR
Código: GLICINACLC
Técnica: Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 46 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml de muestra
Valores de referencia:

Descripción: Análisis de cualquier gen por MLPA 2 SALSAS
Código: DOS_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Andersen-Tawil, Sd. Sec Gen: KCNJ2.
Código: GEN_000046
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ANDROSTANDIOL GLUCURONIDO
Código: ANDROSGLU
Técnica: EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero
Valores de referencia: (1.53 - 14.82) Hombre
(0.51 - 4.03) Mujer Pubertad
(0.22 - 4.64) Adultas
(0.61 - 3.71) Post-menopausia

Descripción: ANDROSTENDIONA DELTA 4
Código: DELTA4
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días

Descripción: ANDROSTENDIONA DELTA 4
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.6 - 3.1) Hombre
(0.3 - 3.3) Mujer

Descripción: Anemia de células falciformes: gen HBB (sec. Sanger)
Código: ANEM_FALCI
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Anemia de Diamond-Blackfan. Panel
Código: GEN_000047
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Anemia de Fanconi: >10 genes (NGS)
Código: FANCONI
Técnica: MLPA y NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Anemia diseritropoyética congénita. Panel
Código: GEN_000048
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Anemia megaloblástica respuesta tiamina. Sec Gen SLC19A2
Código: GEN_000049
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Anemia megaloblástica respuesta tiamina. Sec Gen SLC19A2
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Anemia sideroblástica ligada al X. Panel
Código: GEN_000050
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aneurisma aorta torácica: >10 genes (NGS)
Código: ANEURIS_AO
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ANEXINA V ANTICUERPOS IGG SUERO
Código: ANEXINVACG
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.2) Indeterminado

Descripción: ANEXINA V ANTICUERPOS IGM SUERO
Código: ANEXINVACM
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.2) Indeterminado

Descripción: ANFETAMINA ORINA
Código: ANFETA
Técnica: Enzimoinmunoensayo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:

Descripción: ANFETAMINA ORINA
Valores de referencia:

Descripción: Angelman, Sd. Sec Gen: UBE3A.
Código: GEN_000051
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Angioedema hereditario tipo 1. Sec Gen: SERPING1.
Código: GEN_000052
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Angiopatía amiloide cerebral. Panel
Código: GEN_000053
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ANGIOTENSINA II PLASMA
Código: ANGIOTEN2
Técnica:
Unidades: pg/mL
Plazo: 32 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 3 mL plasma (EDTA). Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (Inf. 30) Valores de referencia orientativos

---

Descripción: ANHIDRASA CARBONICA II AC. SUERO
Código: ANHCARBII
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: ANION GAP
Código: ANIONGAP

Descripción: ANION GAP
Técnica: Cálculo
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (10 - 20)

Descripción: Aniridia. Sec Gen: PAX6.
Código: GEN_000054
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ANNA-3 ANTICUERPOS
Código: ANNA3
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta/Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Título < 1:60 Negativo
= Título > 1:60 Positivo

Descripción: ANTI NUCLEOSOMAS AC.
Código: AC.NUCLEOS
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: ANTI OXIDANTE GENETICO
Código: ANTIOXCOMP
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Código: SINTETASA
Descripción: ANTI SINTETASA AC (Jo-1, SRP, PL-7 PL12, EJ,OJ)
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SRPAC		SRP (SIGNAL RECOGNITION PARTICLE) AC. SUERO		= Negativo
Prueba	JO1AC		Jo-1 AC. SUERO		= Negativo
Prueba	PL7PL12AC		PL-7/PL-12 AC. SUERO		=Negativo
Prueba	EJAC		EJ AC. SUERO		=NEGATIVO
Prueba	OJAC		OJ AC. SUERO		=NEGATIVO

Descripción: ANTIBIOGRAMA
Código: ATB
Técnica: Tarjetas con reactivos colorimétricos
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Anticoagulante Lupico (dRVVT VÍBORA DE RUSSELL)
Código: ANTILUPICO
Técnica: Téc. coagulativa
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL plasma citrato.
Se recomienda doble centrifugacion para eliminar las plaquetas del plasma: Primera centrifugación 15 minutos a 2000-2500 g. Separar el sobrenadante plasmático y centrifugarlo una segunda vez durante 15 minutos a 2000-2500 g. El número de plaquetas res

Enviar la muestra congelada.

Enviar congelado y rotulado como DOBLE CCENTRIFUGACION.

Valores de referencia: (Inf. 1.2) Negativo
(1.2 - 1.5) Positivo débil
(1.5 - 2) Positivo moderado
(Sup. 2) Positivo fuerte

Código: LUPISILICE
Descripción: ANTICOAGULANTE LUPICO ACTIVADO CON SILICE
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PTT_LA		PTT_LA SCREEN	segundos	(33 - 45)
Prueba	PTT_LACONF		PTT_LA CONFIRMACION STACLOT LA	segundos	(Inf. 8) :Negativo (Sup. 8) :Positivo

Descripción:	ANTICUERPOS ANTI DFS70 EN SUERO
Código:	DFS70
Técnica:	Téc. EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	ANTICUERPOS ANTI INMUNOGLOBULINA A SUERO
Código:	IGAAC
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(Sup. 10) Positivo (7 - 10) Zona límite

Descripción:	ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM (SYPHILIS TP)
Código:	VDRL
Técnica:	SYPHILIS TP
Unidades:	Indice
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma de EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 0.99) Negativo

Descripción:	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES EN LCR
Código:	ANALCR
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTICUERPOS BP180 (BPAG2)
Código:	BP180
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	= Positivo índice >1.00

Descripción:	ANTICUERPOS GP210
Código:	GP210

Descripción: ANTICUERPOS GP210
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: ANTICUERPOS INHIBIDORES DEL FACTOR VII PLASMA
Código: INHIFVII
Técnica: Téc. Coagulométrica
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL plasma citrato pobre en plaquetas (doble centrifugacion 2500g/15 min) y congelar. Enviar congelado.
Valores de referencia: =Negativo Negativo

Descripción: ANTICUERPOS M2 MITOCONDRIALES SUERO
Código: AMA2
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: =NEGATIVO No se detecta

Descripción: ANTICUERPOS Sp-100 SUERO
Código: SP100
Técnica: Téc. Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: =NEGATIVO No se detecta

Descripción: ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS CONFIRMACION ORINA
Código: ANTIDEPRE
Técnica: HPLC
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS CONFIRMACIÓN SUERO
Código: ANPRETRIC
Técnica: téc. HPLC
Unidades:
Plazo: 12 días

Descripción: ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS CONFIRMACIÓN SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ANTIDIABÉTICOS ORALES EN ORINA
Código: SULFONILU2
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem masas
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina, micción aislada
Valores de referencia:

Descripción: ANTIDIDIABÉTICOS ORALES EN SUERO
Código: SULFONILU
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: ANTI-DNA (CRITHIDIA LUCILIAE) AC.
Código: ANTIDNACRI
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo < 1:10
= Positivo > 1:10

Descripción: ANTIESTREPTOLISINA O
Código: ASLO
Técnica: Turbidimetría
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 200)

Descripción: ANTIFUNGIGRAMA
Código: ANTIFUNGI
Técnica: Tarjetas con reactivos colorimétricos
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción:	ANTIGENO BETA-D-GLUCANO SUERO
Código:	GLUCANO
Técnica:	Enzimoimmunología
Unidades:	pg/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1mL de suero separar y congelar inmediatamente.
Valores de referencia:	(Inf. 60) Negativo (60 - 80) Indeterminado (Sup. 80) Positivo

Descripción:	ANTIGENO DE ASPERGILLUS (GALACTOMANANO)
Código:	GALACTOMA
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Se necesitan 600 µl de suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.16) Negativo (0.16 - 0.19) Indeterminado (Sup. 0.19) Positivo

Descripción:	ANTIGENO DE ASPERGILLUS (GALACTOMANANO) BAL/BAS, ASPIR, BRON
Código:	GALACTOBAL
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	6 días
Tubo:	Muestra Microbiología
Comentario adicional:	Aspirado, Lavado broncoalveolar
Valores de referencia:	(Inf. 0.16) Negativo (0.16 - 0.19) Indeterminado (Sup. 0.19) Positivo

Descripción:	Antígeno de Helicobacter pylori en heces
Código:	HELIAG
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Heces Microbiología
Comentario adicional:	Muestra: 2 g heces (Refrigerado)
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTÍGENO SARS-CoV-2 TEST RAPIDO
Código:	AGCOVDETEC
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	1 días
Tubo:	TORUNDA AG. COVID (MICRO)
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción: ANTIGENO SOLUBLE HEPATICO AC. SUERO
Código: SLALPAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: ANTIGRANULOCITOS AC. (NEUTROFILOS)
Código: ANGRA
Técnica: CITOMETRÍA DE FLUJO
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 15 mL SANGRE TOTAL EDTA y 1 ml SUERO. ENVIO A TEMPERATURA AMBIENTE. Evitar envío viernes y vísperas de festivo. Indispensable historia clínica En niños pequeños se aceptan 5 ml de EDTA y 0.5 mL de suero.
Valores de referencia:

Descripción: ANTIMONIO EN ORINA
Código: ANTIMONIO2
Técnica: Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente
Unidades: µg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 15 ml orina aislada
Valores de referencia:

Descripción: ANTIMONIO SANGRE TOTAL TUBO ESPECIAL
Código: ANTIMONIO
Técnica: Espectrometría de Masas / Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)
Unidades: mcg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 2 ml de sangre total (tubo heparina de litio de TAPÓN NARANJA CON PERLITAS DENTRO). (evitar extracciones tipo Vacutainer).
No hace falta centrifugación.
Valores de referencia: (Inf. 1)

Descripción: ANTINUCLEARES (ANA) AC. LIQUIDO PLEURAL
Código: ANALP
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: = < 1/20 Negativo
= > 1/20 Positivo

Descripción: ANTINUCLEARES AC. (ANA) MUESTRA HUMANA
Código: ANAMUES
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades: Titulo
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: Hay que indicar tipo de muestra.
Valores de referencia:

Descripción: ANTIOXIDANTES TOTALES
Código: CAT
Técnica: Téc. espectrofotométrica
Unidades: mmol/L
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero refrigerado.
Valores de referencia: (1.30 - 1.77)

Código: ANTIPATERN
Descripción: ANTIPATERNALES AC. CITOTÓXICOS
Técnica: Microlinfocitotoxicidad
Comentario adicional: Sangre total del padre y Suero de la madre

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ANTIPATERH		AC. CITOTOXICOS ANTIPATERNALES (HOMBRE)		
Prueba	ANTIPATERM		AC. CITOTOXICOS ANTIPATERNALES (MUJER)	%	= Negativo <20% cel.muertas = Negativo dudoso 20-29%cel.muertas = Positivo dudoso 30-49%cel.muertas = Positivo 50-80%cel.muertas = Positivo alto >80 %

Descripción: ANTITROMBINA III
Código: ATIII
Técnica: Sustrato cromogénico
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (80 - 120)

Descripción: Antitrombina III (Proteina)
Código: ATIIIPRO
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 10 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato

Descripción: Antitrombina III (Proteina)

Comentario adicional: 1 mL Plasma Citrato sódico CONGELADO

Centrifugar la sangre a 2500g durante 15 minutos. Separar 3/4 partes superiores del plasma con pipeta (no decantar) y traspasarlo a otro tubo de polipropileno. Centrifugar una segunda vez el plasma traspasado al tubo de polipropileno, a 2500g durante

Valores de referencia: (22 - 39)

Descripción: Añadir DNA mitocondrial a panel NGS

Código: AÑADIRMT

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Añadir marcadores MSI a panel NGS

Código: NGS_MSI

Técnica:

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética

Valores de referencia:

Descripción: APOLIPOPROTEINA A1

Código: APOA

Técnica: Turbidimetría

Unidades: mg/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 0.5 mL suero.
Alternativa plasma heparina.

Valores de referencia: (Sup. 130)

Descripción: APOLIPOPROTEINA B

Código: APOB

Técnica: Turbidimetría

Unidades: mg/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 0.5 mL de suero
Alternativa plasma heparina.

Valores de referencia: (Inf. 100)

Descripción: Apolipoproteína CII en suero

Código: APOCII

Técnica: Inmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 12 días

Descripción:	Apolipoproteína CII en suero
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(16 - 42)

Descripción:	Apolipoproteína CIII en suero
Código:	APOCIII
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(16 - 45)

Descripción:	APOLIPOPROTEINA E
Código:	APOE
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero o plasma EDTA No congelar
Valores de referencia:	(13 - 76) Hombre (Inf. 94) Mujer

Descripción:	ARABINOSA EN ORINA
Código:	ARABINOSA
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mmol/mol crea
Plazo:	18 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	100 mL orina (Refrigerado)
Valores de referencia:	(Inf. 50)

Descripción:	Aracnodactilia contractural congénita. Sec Gen: FBN2.
Código:	GEN_000055
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ARILSULFATASA A EN LEUCOCITOS
Código:	ARILSULFA
Técnica:	Enzimática
Unidades:	nmol/17h/mg pro
Plazo:	90 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	10 mL SANGRE TOTAL (Heparina). INDISPENSABLE AVISAR PREVIAMENTE PARA PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO. Informe clínico. Envío de sangre control en idénticas condiciones.

Descripción: ARILSULFATASA A EN LEUCOCITOS
Valores de referencia:

Descripción: ARIPIPRAZOL SUERO
Código: ARIPIPRAZO
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (150 - 250)

Descripción: Array CGH 60k: líquido amniótico
Código: CGHARRAYLA
Técnica: Solicitar tubo truncado a genetica@megalab.es
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: Solicitar tubos truncados a genetica@megalab.es
Valores de referencia:

Descripción: Array CGH 60k: restos abortivos
Código: CGHARRAYAB
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Citogenética
Comentario adicional: Muestra en medio de cultivo. Refrigerada.
Contactar con genetica@megalab.es para envío de medio
Valores de referencia:

Descripción: Array CGH 60k: vellosidad corial
Código: CGHARRAYVC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Citogenética
Comentario adicional: Muestra en medio de cultivo. Refrigerada.
Contactar con genetica@megalab.es para envío de medio
Valores de referencia:

Descripción: Array CytoSNPs 850K
Código: ARRAY_850K
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Array de exoma: Infinium OmniExpressExome-8 v1.4
Código: ARRAYEXOMA
Técnica: Array Infinium OmniExpressExome-8 v1.4
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: ARSENICO EN PELO
Código: ARSENIPELO
Técnica: Espectrometría de absorción atómica-generador hidruros
Unidades: mcg/g
Plazo: 17 días
Tubo:
Comentario adicional: 200 mg de pelo aprox.
Valores de referencia: (Inf. 0.90)

Descripción: ARSENICO INORGANICO Y SUS METABOLITOS METILADOS EN ORINA
Código: ASINORG2
Técnica: Espectrofotometría de Abssorción Atómica/Generador de HIdruros
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 mL Orina (micción aislada) al final de la semana laboral
Valores de referencia: (Inf. 35) VLB-INSHT Fin de la semana Laboral

---

Descripción: ARSENICO SUERO
Código: AS
Técnica: Técnica Espectometría de Absorción Atómica con cámara de grafito y corrección por efecto Zeeman.
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero. Refrigerado
No ingerir pescado, marisco ni conservas durante los tres días previos a la extracción
Valores de referencia: (Inf. 15)

Descripción: Arteriopatía, infarto subcortical, leucoencefalopatía Panel
Código: GEN_000056
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Artrogriposis. Panel
Código: GEN_000057

Descripción: Artrogriposis. Panel
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Arts, Sd. Sec Gen: PRPS1.
Código: GEN_000058
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ASIALOGLICOPROTEINA RECEPTOR AC. SUERO
Código: RECASIALO
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (Sup. 1) Positivo

Descripción: Asociación VACTERL. Sec Gen: HOXD13.
Código: GEN_000059
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aspartilglucosaminuria. Sec Gen: AGA
Código: GEN_000060
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ASPECTO LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: LIQLCASP
Técnica: Observación
Unidades:
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos

Descripción: ASPECTO LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ASPERGILLUS ANTICUERPOS
Código: ASPERAC
Técnica: Hemaglutinación indirecta
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo <1:320
= Positivo >1:640

Descripción: ASPERGILLUS SPP. DNA (PCR)
Código: ASPERGIPCR
Técnica: hibridación molecular con amplificación (PCR)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 ml sangre total y otras muestras.
Valores de referencia:

Descripción: ASTROVIRUS RNA PCR EN MUESTRA
Código: ASTROVIPCR
Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN (PCR)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Heces (10 mL o g) vómito (10 mL o g). Envío CONGELADO
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia de Friedreich: gen FXN (NGS)
Código: FRIEDR_SEC
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia de Friedreich: gen FXN secuencia (GAA)n
Código: FRIEDREICH
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de framgentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato

Descripción: Ataxia de Friedreich: gen FXN secuencia (GAA)n
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia episódica: >10 genes (NGS)
Código: ATAXIA_EPI
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia espinocerebelosa 3: gen ATXN3 secuencia (CAG)n
Código: MACHADOJOS
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia espinocerebelosa tipo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, y 17
Código: ATAXIA_SP
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia telangiectasia: gen ATM (NGS)
Código: TELANGIECT
Técnica: NGS con TSOE Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestras de tejido tumotal y sangre.
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia y anemia sideroblástica lig. al X. Sec Gen ABCB7
Código: GEN_000061
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Ataxia y anemia sideroblástica lig. al X. Sec Gen ABCB7
Valores de referencia:

Descripción: Ataxias autosómicas recesivas. Panel
Código: GEN_000062
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ataxias hereditarias no dinámicas. Panel
Código: GEN_000063
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ataxias hereditarias. Panel
Código: GEN_000064
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ATOMOXETINA SUERO
Código: ATOMOXETIN
Técnica: Comotagrafia liquida /Tándem masas
Unidades: ng/dL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (30 - 160) Tras toma 2x20 mg/dia
(503 - 915) Metabolizadores lentos(misma dosis)

Descripción: Atrofia dentatorrubro pálido-luisiana: gen DRPLA sec (CAG)n
Código: DRPLA_DNA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Atrofia medular espinal: gen SMN1 (sec. Sanger)
Código: SMN1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Atrofia muscular bulboespinal - Enf. Kennedy: sec (CAG)n AR
Código: KENNEDYPCR
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Atrofia muscular espinal. Panel
Código: GEN_000065
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Atrofia muscular espinal: deleciones en SMN1 y SMN2
Código: SMN_PCR
Técnica: PCR-RFLP y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Atrofia óptica hereditaria: >10 genes (NGS)
Código: ATROFI_OPT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ausencia congénita conducto deferente. Sec Gen: CFTR
Código: GEN_000066

Descripción: Ausencia congénita conducto deferente. Sec Gen: CFTR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Autismo y TDAH: >10 genes (NGS)
Código: AUTIS_TDAH
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: AVIDEZ IGG EPSTEIN-BARR
Código: AVIDEZEPSB
Técnica: EIA
Unidades: % avidez IgG
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: AVIDEZ IGG VARICELA ZOSTER
Código: AVIDEZVARI
Técnica:
Unidades: % avidez IgG
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Axenfeld-Rieger, Sd. Sec Gen: FOXC1
Código: GEN_000067
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: AZATIOPRINA (6-MERCAPTOPURINA)
Código: AZATI
Técnica: LC-MS/MS (Cromatografia líquida /Tándem masas)
Unidades: ng/mL
Plazo: 15 días

Descripción: AZATIOPRINA (6-MERCAPTOPURINA)
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: SUERO CONGELADO. Toma de muestra a 1-2 horas post-tratamiento
Valores de referencia: (40 - 300)

Descripción: BABESIA HUMANA AC.
Código: BABESIA
Técnica: Téc. I.F.I
Unidades:
Plazo: 19 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero (Refrigerado).
Valores de referencia: =<1/8 Negativo < 1/8
=>1/8 Positivo > o = 1/8

Descripción: BABESIA SPP PCR SANGRE TOTAL
Código: BABESPCR
Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 Ml SANGRE TOTAL EDTA.
Valores de referencia:

Descripción: BACILOSCOPIA DE ESPUTO
Código: BACILOES
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Esputo
Comentario adicional: Esputo en frasco esteril
Valores de referencia:

Descripción: BACILOSCOPIA DE ORINA
Código: BACILO2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: BACLOFENO
Código: BACLOFENO
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (0.10 - 0.60)

Descripción: Bact. periodont. y polim.genes IL1A IL1B DNA PCR Cualitativa
Código: PERIO_IL1
Técnica: PCR y digestión
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclcusiva para esta determinación: puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta).
Valores de referencia:

Descripción: Bacterias periodontales DNA PCR Cualitativa
Código: PERIODNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: mucosa gingival en puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta) que se envían en tubos estériles de tapón de rosca proporcionados por el laboratorio.
Valores de referencia:

Descripción: Bacterias periodontales DNA PCR Cuantitativa
Código: PERIOCUAN
Técnica: PCR cuantitativa
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: mucosa gingival en puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta) que se envían en tubos estériles de tapón de rosca proporcionados por el laboratorio.
Valores de referencia:

Descripción: Baller-Gerold, Sd. Sec Gen: RECQL4
Código: GEN_000068
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: BANOLIGIGG
Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR IGG
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BANOLIGOLC		BANDAS OLIGOCLONALES IGG LCR (Indispensable 1 ml de suero)		
Prueba	BANOLIGGSU		BANDAS OLIGOCLONALES IGG SUERO (1 ml de suero+LCR)		

Código: BANOLIGIGM
Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR IGM
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BANOLIGOLM		BANDAS OLIGOCLONALES IGM LCR (Indispensable enviar suero)		
Prueba	BANOLIGMSU		BANDAS OLIGOCLONALES IGM SUERO (1 ml de suero+LCR)		

Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES IGG LCR (Indispensable 1 ml de suero)
Código: BANOLIGOLC
Técnica: Téc. Isoelectroenfoque/Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL de LCR. Indispensable enviar también 1 mL de suero.
Valores de referencia:

Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES IGM LCR (Indispensable enviar suero)
Código: BANOLIGOLM
Técnica: ISOELECTROENFOQUE E INMUNODETECCIÓN CON FOSFATASA ALCALINA
Unidades:
Plazo: 60 días
Tubo: Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional: Condiciones de la muestra: 3 alícuotas de 200 µL cada una de LCR y de suero, ambas congeladas. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADAS. Extracción LCR y suero el mismo día.
Valores de referencia:

Descripción: BARBITURICOS ORINA (DETECCION DE METABOLITOS)
Código: BARBITU2
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:
Valores de referencia: =Negativo

Descripción: Bardet-Biedl, Sd. Panel
Código: GEN_000069
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	BARIO EN ORINA
Código:	BARIOORINA
Técnica:	Espectrometría de emisión atómica/Espectrometría de masas (ICP-MS)(Espectrofotometría de absorción atómica / Cámara de grafito hasta 3/09/2012)
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(3 - 6)

Descripción:	BARIO EN SUERO
Código:	BARIO
Técnica:	Espectrometría de emisión atómica/Espectrometría de masas (ICP-MS)(Espectrofotometría de absorción atómica / Cámara de grafito hasta 3/09/2012)
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 15)

Descripción:	BARTONELLA HENSELAE AC IGG
Código:	BARHEIGG
Técnica:	Técnica IFI
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero.
Valores de referencia:	=<1/64 Negativo <1/64 =>1/64 Positivo >1/64

Descripción:	BARTONELLA HENSELAE AC IGM
Código:	BARHEIGM
Técnica:	Técnica IFI
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero.
Valores de referencia:	=<1/12 Negativo <1/12 =>1/12 Positivo >1/12

Descripción:	Bartonella henselae DNA PCR Cualitativa
Código:	BARTONDNA
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 mL Sangre total EDTA, suero o plasma. Refrigerado 0.5 mL de LCR. Refrigerado Biopsia/Punción de ganglios sin medio de transporte.
Valores de referencia:	

Descripción: BARTONELLA QUINTANA AC IGG SUERO
Código: BARQUIIGG
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.(Refrigerado).
Valores de referencia: = Negativo <1/64

Descripción: BARTONELLA QUINTANA AC IGM SUERO
Código: BARQUIIGM
Técnica: Técnica IFI
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero
Valores de referencia: = Negativo <1/20

Descripción: Bartter, Sd. Panel
Código: GEN_000070
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BCR/ABL1 gen de fusión: detección y cuantificación (EMR)
Código: BCR_ABL1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con onco.

IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA

Muestra: sangre periférica o médula ósea
NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción: BCR/ABL1 mutaciones dominio tirosina quinasa (TK)
Código: BCRABL_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Descripción: BCR/ABL1 mutaciones dominio tirosina quinasa (TK)

Comentario adicional: 3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

Muestra: sangre periférica o médula ósea

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción: Beckwith-Wiedemann, Sd. Sec Gen: CDKN1C

Código: GEN_000071

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: BENCENO EN SANGRE

Código: BENCENO

Técnica: Cromatografía de gases

Unidades: mcg/L

Plazo: 9 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional: 2 mL de sangre total EDTA al final de la jornada

Valores de referencia: (Inf. 5) Personas expuestas. Valor límite orientativo. Al final de la jornada laboral

---

Descripción: BENZODIAZEPINAS ORINA (DETECCION DE METABOLITOS)

Código: BENZODI2

Técnica: Inmunoensayo

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Orina Drogas de Abuso

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: BENZODIAZEPINAS ORINA CONFIRMACION

Código: BENZOCONF

Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS) y Enzimoinmunoanálisis

Unidades:

Plazo: 12 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: 10 ml de orina

Valores de referencia:

Descripción: BENZODIAZEPINAS SUERO

Código: BENZODI

Técnica: EIA

Unidades: µg/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Descripción: BENZODIAZEPINAS SUERO
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.3) Valor de corte

Descripción: Berardinelli-Seip, Sd. Panel
Código: GEN_000072
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BERILIO EN ORINA
Código: BERILIO2
Técnica: Espectrometría de Masas-Plasma acoplado inductivamente
Unidades: mcg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: 10 mL (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 1.0) Personas no expuestas
(Inf. 20) Personas expuestas a Berilio Valor límite biológico orientativo (Baselt RC. Biological Monitoring Methods for Industrial Chemicals)

Descripción: BETA TRACE (FISTULA CEFALORRAQ. EN RINO/OTICO)
Código: FISTULALCR
Técnica: Inmunonefelometría
Unidades: mg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1mL LCR, líquido biológico, sereción nasal, suero
Valores de referencia: (Sup. 1.11) Fístula LCR
(15.00 - 25.00) LCR
(Inf. 1.00) Secreción nasal, ótica
(Inf. 1.00) Suero

Descripción: BETA TRACE EN LIQUIDOS BIOLOGICOS
Código: BETATRACE
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml de líquido biológico
Valores de referencia: (8.89 - 25.9) En LCR
(Inf. 1.3) En suero
(Inf. 1.3) En secreción nasal, ótica
(Sup. 1.3) Fístula compatible con LCR

Descripción: BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGA
Código: B2GLICOA
Técnica: EIA

Descripción:	BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGA
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero (Refrigerado). Alternativa: plasma
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGG
Código:	B2GLICOI
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGM
Código:	B2GLICOM
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	BETA-2 MICROGLOBULINA SUERO
Código:	B2MICRO
Técnica:	Inmunoturbidimetría
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero
Valores de referencia:	(1.1 - 2.4)

Descripción:	BETA-2-MICROGLOBULINA EN ORINA
Código:	B2MICRO2
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mcg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina Bioquímica
Comentario adicional:	5 ML ORINA (PH IGUAL O SUPERIOR A 6) Se recomienda el siguiente procedimiento de recolección: El paciente ha de vaciar la vejiga, luego beber al menos 0,5L de agua. La muestra de orina ha de recogerse en una hora, y ajustar el pH (con NaOH 1M) a 6-8.
Valores de referencia:	(Inf. 202)

Descripción:	Beta-Caroteno en suero
Código:	BCAROTENO

Descripción: Beta-Caroteno en suero
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Ultravioleta.
Unidades: µg/dL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero. Proteger de la luz.
Valores de referencia: (7.5 - 85)

Descripción: BETA-CROSSLAPS (CTX) TELOPEPTIDO C TERMINAL COLAGENO TIPO I
Código: CTX
Técnica: Electroquimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (0.016 - 0.584) Hombre 30 años - 50 años
(0.010 - 0.704) Hombre 50 años - 70 años
(0.010 - 0.854) Hombre > 70 años
(0.025 - 0.573) Mujer Premenopausia
(0.104 - 1.008) Mujer Postmenopausia

Descripción: Beta-Glucocerebrosidasa (E. Gaucher), sangre seca
Código: BGLUCOCER
Técnica: Fluorimetría
Unidades: µmol/L x Hora
Plazo: 17 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Recoger gotas de sangre SIN ANTICOAGULANTE en 2 a 4 circulos de papel filtro (Solicitar a almacen). Dejar secar al aire libre durante 1 hora. Guardar en nevera en bolsa de plástico cerrada hasta el envio.
Enviar a temperatura ambiente.
INDISPENSABLE informe clínico y antecedentes familiares.
Valores de referencia: (1.30 - 10.06)

Descripción: BETAHCG
Código: BETAHCG.
Técnica: CMIA
Unidades: mU/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 5) Mujer (No embarazo)
(202 - 231000) Mujer Embarazo 1-10 semana gestación
(22536 - 234990) Mujer Embarazo 11-15 semana gestación
(8007 - 50064) Mujer Embarazo 16-22 semana gestación
(1600 - 49413) Mujer Embarazo 23-40 semana gestación
(Inf. 5) Hombre

Descripción: BETA-HEXOSAMINIDASA TOTAL Y DISTRIB. ISOENZIMATICA (SUERO)
Código: BHEXOSASUE
Técnica: Electroforesis manual, Fluorimetría
Unidades:
Plazo: 33 días

Descripción: BETA-HEXOSAMINIDASA TOTAL Y DISTRIB. ISOENZIMATICA (SUERO)
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 5 mL Suero. Congelar. Centrifugar la muestra de sangre a 2500rpm 10 minutos a temperatura ambiente en las primeras 2 horas de su obtención, separar el sobrenadante a otro tubo y congelarlo inmediatamente a -20ºC

Adjuntar historia clínica resumida
Valores de referencia:

Descripción: BICARBONATO EN ORINA
Código: BICARORINA
Técnica: Volumetría
Unidades: mmol/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 1 mL orina (micción aislada).
Valores de referencia: (Inf. 26) Rango de referencia

Descripción: BILIRRUBINA DIRECTA
Código: BILD
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero o plasma.
Proteger de la luz
Valores de referencia: (Inf. 0.5)

Descripción: BILIRRUBINA INDIRECTA SUERO (COLEMIA INDIRECTA)
Código: BILI
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero o plasma
Valores de referencia: (Inf. 1)

Descripción: BILIRRUBINA TOTAL
Código: BILT
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 6.0) < 1 dia
(Inf. 10.0) < 2 dias
(Inf. 12.0) 3 dias - 5 dias
(Inf. 10) 6 dias - 7 dias
(0.2 - 1.2)

Código: BIOPSIARAD
Descripción: BIOPSIA CON CIRUGÍA RADICAL
Técnica:

Código: BIOPSIARAD

Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP		Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED1		SNOMED1		
Prueba	DIAGNOST		DIAGNOST		
Prueba	DMACRO		DMACRO		
Prueba	DMICRO		DMICRO		
Prueba	NOTABIOP		NOTA		
Prueba	PATOLOGO		PATOLOGO		
Prueba	TDMRADICAL		TIPIO DE MUESTRA CIRUGÍA RADICAL		

Código: BIOPDISECC

Descripción: BIOPSIA CON DISECCION

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP		Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED1		SNOMED1		
Prueba	DIAGNOST		DIAGNOST		
Prueba	DMACRO		DMACRO		
Prueba	DMICRO		DMICRO		
Prueba	NOTABIOP		NOTA		
Prueba	PATOLOGO		PATOLOGO		
Prueba	TDMDISECCI		TIPO DE MUESTRA CON DISECCIÓN		

Código: BIOPINTRA

Descripción: BIOPSIA INTRAOPERATORIA

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP		Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED1		SNOMED1		
Prueba	DIAGNOST		DIAGNOST		
Prueba	DMACRO		DMACRO		
Prueba	DMICRO		DMICRO		
Prueba	NOTABIOP		NOTA		

Componentes					
Prueba	PATOLOGO		PATOLOGO		
Prueba	TDMINTRAO		TIPO DE MUESTRA INTRAOPERATORIA		

Descripción: Biopsia líquida cáncer colon
Código: BIOLICOLON
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Solicitar kit específico
se envía a BIOSECUENCE
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida cáncer de pulmón NSCLC
Código: BIOLIQPULM
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Solicitar kit específico
se envía a BIOSECUENCE
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida en los genes IDH1, IDH2
Código: BIOLIDH1_2
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 2 TUBOS STRECK
Rotular con ONCO
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida gen ALK-EML4 (variante determinada)
Código: BIOLIQEML4
Técnica: Nanostring
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 2 TUBOS STRECK
Tubo alternativo:2 tubos sangre EDTA
se envia a Pangaea
Rotular con ONCO
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida gen BRAF exones 11 a 15
Código: BIOLIBRAFE
Técnica: NGS

Descripción: Biopsia líquida gen BRAF exones 11 a 15
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:
```
2 TUBOS STRECK
Tubo alternativo:2 tubos sangre EDTA
se envia a Pangaea
Rotular con ONCO
```
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida gen c-KIT exones 8, 9, 11, 13, 14, 17
Código: BIOLIQKIT
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:
```
2 TUBOS STRECK
Tubo alternativo:2 tubos sangre EDTA
se envia a Pangaea
Rotular con ONCO
```
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida gen EGFR mutación T790M o C719S
Código: EGFR_T790M
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:
```
2 TUBOS STRECK
Rotular con ONCO
Tubo alternativo:2 tubos sangre EDTA
```
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida gen ERBB2 exones 8, 17, 19, 20 y 21
Código: BIOLIQERB2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:
```
2 TUBOS STRECK
Tubo alternativo:2 tubos sangre EDTA
se envia a Pangaea
Rotular con ONCO
```
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida gen ERBB4 exones 8, 17, 19, 20 y 21
Código: BIOLIQERB4
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Descripción: Biopsia líquida gen ERBB4 exones 8, 17, 19, 20 y 21

Comentario adicional:
```
2 TUBOS STRECK
Tubo alternativo:2 tubos sangre EDTA
se envia a Pangaea
Rotular con ONCO
```

Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida gen KRAS exones 2, 3 y 4

Código: BIOLIQKRAS

Técnica: RT-PCR

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional:
```
2 TUBOS STRECK
Rotular con ONCO
```

Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida gen NRAS exones 2, 3 y 4

Código: BIOLIQNRAS

Técnica: RT-PCR

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional:
```
2 TUBOS STRECK
Rotular con ONCO
```

Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida gen PDGFRA exones 12 y 18

Código: BIOLIPDGFR

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional:
```
2 TUBOS STRECK
Tubo alternativo:2 tubos sangre EDTA
se envia a Pangaea
Rotular con ONCO
```

Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida gen PIK3CA exones 10 y 21

Código: BIOLIQPIK3

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional:
```
2 TUBOS STRECK
Tubo alternativo:2 tubos sangre EDTA
se envia a Pangaea
Rotular con ONCO
```

Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida mama RH+ HER2+
Código: BIOLIQMAMA
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Solicitar kit específico
se envía a BIOSECUENCE
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida mutación V600X gen BRAF
Código: BIOLIBRAFM
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 2 TUBOS STRECK
Rotular con ONCO
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida panel 30 genes
Código: BIOLIQPASM
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Pinchar en EDTA y un tubo de strek
se envía a Pangaea
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida panel de 40 genes
Código: BIOLIQPANE
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Solicitar kit específico
se envía a BIOSECUENCE
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia liquida Pulmon
Código: ONCOLIPUL
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Tubo sangre total especial
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida variante de splicing gen MET 7/8 o 14
Código: BIOLIQMET

Descripción: Biopsia líquida variante de splicing gen MET 7/8 o 14
Técnica: Nanostring
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 2 TUBOS STRECK
Tubo alternativo:2 tubos sangre EDTA
se envia a Pangaea
Rotular con ONCO
Valores de referencia:

Código: BIOPSIADP1
Descripción: BIOPSIA PIEZA PEQUEÑA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP		Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED		SNOMED		
Prueba	DIAGNOST		DIAGNOST		
Prueba	DMACRO		DMACRO		
Prueba	DMICRO		DMICRO		
Prueba	NOTABIOP		NOTA		
Prueba	PATOLOGO		PATOLOGO		
Prueba	TBIOPSIA		Tipo Biopsia		

Código: BIOPSENC
Descripción: BIOPSIA SENCILLA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP		Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED		SNOMED		
Prueba	DIAGNOST		DIAGNOST		
Prueba	DMACRO		DMACRO		
Prueba	DMICRO		DMICRO		
Prueba	NOTABIOP		NOTA		
Prueba	PATOLOGO		PATOLOGO		
Prueba	TDMSENC		TIPO DE MUESTRA BIOPSIA SENCILLA		

Descripción: Biotina (Vitamina H)
Código: BIOTINA

Descripción:	Biotina (Vitamina H)
Técnica:	EIA
Unidades:	ng/L
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 ml de Suero congelado.
Valores de referencia:	= Niveles bajos <100 ng/L = Niveles intermedios 100-250 ng/L = Niveles normales >250 ng/L

Descripción:	Biotinidasa en plasma
Código:	BIOTINID
Técnica:	Espectrometría de Absorción Molecular
Unidades:	nmol/min/mL
Plazo:	22 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma de EDTA. Congelar inmediatamente
Valores de referencia:	(Sup. 7.80) (Inf. 13.50)

Descripción:	Biperideno (Akineton) en suero
Código:	BIPERI
Técnica:	HPLC
Unidades:	µg/L
Plazo:	19 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL.
Valores de referencia:	(10 - 100)

Descripción:	Birk-Barel, Sd. Sec Gen: KCNK9
Código:	GEN_000073
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	BISMUTO EN ORINA
Código:	BISMUTO2
Técnica:	Espectometría de Emisión Atómica/MS
Unidades:	mcg/24 h
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	.10 mL orina 24 h.Indicar volumen orina 24 horas.
Valores de referencia:	(Inf. 3)

Descripción:	BISMUTO SANGRE TOTAL
Código:	BISMUSAN
Técnica:	Espectometría de masas-plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)

Descripción: BISMUTO SANGRE TOTAL
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 ml sangre total EDTA
Valores de referencia: (Inf. 5.0)

Descripción: Björnstadt, Sd. Sec Gen: BCS1L
Código: GEN_000074
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BLASTOCYSTIS HOMINIS en HECES PCR
Código: BLASTOPCR
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: Heces
Valores de referencia:

Descripción: Bloom, Sd. Sec Gen: BLM
Código: GEN_000075
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BOR, Sd., artrocalasia tipo Ehlers-Danlos. Panel NGS
Código: GEN_000688
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BOR, Sd., Autoinmune proliferativo. Panel NGS
Código: GEN_000689
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: BOR, Sd., Autoinmune proliferativo. Panel NGS
Valores de referencia:

Descripción: BORDETELLA PARAPERTUSSIS AC. IGG SUERO
Código: BORDEPAACG
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =< 1:160 Negativo <1:160
=>1:160 Positivo >1:160

Descripción: BORDETELLA PARAPERTUSSIS AC. IGM SUERO
Código: BORDEPAACM
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =<1:160 Negativo <1:160
=>1:160 Positivo >1:160

Descripción: BORDETELLA PERTUSSIS AC. IGA SUERO
Código: BORDETEIGA
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo <1/20
= Positivo >o=1/20

Descripción: BORDETELLA PERTUSSIS AC. IGG SUERO
Código: BORDETEACG
Técnica: CLIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 54) Negativo
(55 - 65) Indeterminado
(Sup. 66) Positivo

Descripción: BORDETELLA PERTUSSIS AC. IGM SUERO
Código: BORDETEACM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: BORDETELLA PERTUSSIS AC. IGM SUERO
Comentario adicional: Suero
Alternativa: plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado
(Sup. 11) Positivo

Descripción: Bordetella pertussis y parapertussis DNA PCR Cualitativa
Código: B.PERTUSSI
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Muestras: esputo, broncoaspirado, moco, lavado broncoalveolar, etc.
Valores de referencia:

Descripción: Borjeson-Forssman-Lehmann, Sd. Sec Gen: PHF6
Código: GEN_000076
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BORO SUERO
Código: BORO
Técnica: ICP-MS
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 100)

Descripción: BORRELIA BURGDORFERI AC. IGG (ENFERMEDAD DE LYME) SUERO
Código: BORRELIACG
Técnica: CLIA
Unidades: UA/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Alternativa: Plasma (citrato, EDTA, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(10 - 15) Indeterminado

Descripción: BORRELIA BURGDORFERI AC. IGG (ENFERMEDAD DE LYME) LCR
Código: BORREACGLC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días

Descripción:	BORRELIA BURGDORFERI AC. IGG (ENFERMEDAD DE LYME) LCR
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (1 - 1.2) Indeterminado (Sup. 1.2) Positivo

Descripción:	BORRELIA BURGDORFERI AC. IGM (ENFERMEDAD DE LYME) LCR
Código:	BORREACMLC
Técnica:	Inmunoquimioluminiscencia
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (1 - 1.5) Indeterminado (Sup. 1.5) Positivo

Descripción:	BORRELIA BURGDORFERI AC. IGM (ENFERMEDAD DE LYME) SUERO
Código:	BORRELIACM
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.91 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	Borrelia burgdorferi DNA PCR Cualitativa
Código:	BORRPCR
Técnica:	PCR a tiempo real
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero, Plasma, Sangre Total EDTA, LCR, líquido sinovial(0.5ml minimo), tejido de la picadura, biopsia cutanea.
Valores de referencia:	

Descripción:	BORRELIA SPP. CONFIRMACION DE AC. IgG
Código:	BORGCONF
Técnica:	Immunoblot
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	BORRELIA SPP. CONFIRMACION DE AC.IgM
Código:	BORMCONF
Técnica:	Immunoblot
Unidades:	
Plazo:	12 días

Descripción: BORRELIA SPP. CONFIRMACION DE AC.IgM
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: BP230 (PENFIGOIDE BULLOSO) AC. SUERO
Código: BP230
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: = Positivo índice > 1.00

Descripción: Braquidactilia tipo a1. Sec Gen: IHH
Código: GEN_000077
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BRIVARACETAM SUERO
Código: BRIVARACET
Técnica: Cromatografía Líquida-Tándem Masas
Unidades: mcg/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Rango de referencia terapéutico (AGNP 2017)
(0.5 - 0.9) (Dosis 2x50 mg/día)
(0.9 - 1.8) (Dosis 80-150 mg/día)
(1.8 - 3.6) (Dosis 150-300 mg/día)

Descripción: BROMUROS EN ORINA
Código: BROMUR2
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución.
Unidades: mg/L
Plazo: 24 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ML orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 15) Personal no expuesto
(Inf. 115) Personal expuesto

Descripción: BROMUROS EN SUERO
Código: BROMUROS
Técnica: HPLC
Unidades: mg/L
Plazo: 23 días

Descripción: BROMUROS EN SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 12)
(200 - 1200) Nivel bajo
(Sup. 3000) Tóxico

Descripción: Bronquiectasia idiopática. Sec Gen: SCNN1A
Código: GEN_000078
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BRUCELLA AC. IGG LCR
Código: BRUCEACGLC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo
(Sup. 1.00) Positivo

Descripción: BRUCELLA AC. IGG SUERO
Código: BRUCELAACG
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: BRUCELLA AC. IgM LCR
Código: BRUCEACMLC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo
(Sup. 1.00) Positivo

Descripción: BRUCELLA AC. IGM SUERO
Código: BRUCELAACM
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: BRUCELLA AC. IGM SUERO
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción: BRUCELLA AC. SEROAGLUTINACION
Código: AGLUBRU
Técnica: AGLUTINACIÓN
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Compatible con primoinfectados >1/160

Descripción: BRUCELLA AGLUTINACION EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: AGLUBRLC
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Brucella melitensis DNA PCR Cualitativa
Código: BRUCEPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: BRUCELLA SPP. DNA PCR
Código: BRUCESPPCR
Técnica: PCR Nested
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: 10 ml de sangre total edta, refrigerado
Puede hacerse tambien en otro liquido biológico
Distintas especies de Brucella
Valores de referencia:

Descripción: BRUCELLA TEST DE COOMBS SUERO
Código: COOMBSBRU
Técnica: Aglutinación de Ac. Incompletos
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: BRUCELLA TEST DE COOMBS SUERO
Valores de referencia:

Descripción: Bruck, Sd. Sec Gen: PLOD2
Código: GEN_000694
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BUN (NITROGENO UREICO)
Código: BUN
Técnica: Enzimático colorimétrico.
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL suero.
Valores de referencia: (7 - 21) > 14 años
(7 - 29) > 70 años

Descripción: BUPROPION SUERO
Código: BUPROPION
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades: ng/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (25.0 - 100.0) Rango terapéutico.

Descripción: Buschke-Ollendorff, Sd. Sec Gen: LEMD3
Código: GEN_000079
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: C1Q ANTICUERPOS SUERO
Código: C1QAC
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: U/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo

Descripción: C4b-BP (PROTEINA LIGANTE PROTEINA S)
Código: C4B.BP

Descripción:	C4b-BP (PROTEINA LIGANTE PROTEINA S)
Técnica:	Inmunoanálisis.
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	.Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(68 - 140)

Descripción:	CA 125 II SUERO
Código:	CA125
Técnica:	CMIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Determinación realizable en Líquidos Biológicos
Valores de referencia:	(Inf. 35)

Descripción:	CA 15-3 suero
Código:	CA153
Técnica:	CMIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Determinación realizable también en Liquidos Biológicos
Valores de referencia:	(Inf. 32)

Descripción:	CA 199 EN MUESTRA
Código:	CA199MUEST
Técnica:	ECLIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CA 19-9 SUERO
Código:	CA199
Técnica:	ECLIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero y Plasma tratado con heparina (litio, sodio, amonio) y EDTA tripotásico. No emplear plasma con citrato de sodio.
Valores de referencia:	(Inf. 34)

Descripción:	CA 50 SUERO
Código:	CA50
Técnica:	CLIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	7 días

Descripción: CA 50 SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero congelado
Valores de referencia: (Inf. 25)

Descripción: CA 72-4 SUERO (TAG-72)
Código: CA72.4
Técnica: INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Alternativo 1 ml de plasma (EDTA o de Heparina litio, Heparina sódica)
Valores de referencia: (Inf. 6.9)

Descripción: Ca. de colon HNPCC: <10 genes (NGS)
Código: LYNCH_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 45 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: CA-27.29 en suero
Código: CA27.29
Técnica: Inmunoquimioluminiscencia.
Unidades: U/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Determinación realizable también en Liquidos Biológicos
Valores de referencia: (Inf. 38.6)

Descripción: CADASIL: gen NOTCH3 (NGS)
Código: CADASILTOT
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: CADASIL: gen NOTCH3 exones 3 y 4 (sec. Sanger)
Código: CADASIL
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: CADASIL: gen NOTCH3 exones 3 y 4 (sec. Sanger)

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Código: CADENASLI2

Descripción: CADENAS LIGERAS LIBRES ORINA KAPPA LAMBDA

Técnica: Nefelometría

Comentario adicional: 10 ml orina.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	KAPPALIB2		CADENAS LIGERAS KAPPA LIBRES EN ORINA	mg/dL	(Inf. 3.29)
Prueba	LAMBDALIB2		CADENAS LIGERAS LAMBDA LIBRES EN ORINA	mg/dL	(Inf. 0.38)
	COCKLLIB2				

Código: FREELITE

Descripción: CADENAS LIGERAS LIBRES SUERO

Técnica: Inmunoanálisis

Comentario adicional: Suero. Refrigerado

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FREELITEK		CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA SUERO	mg/dL	(0.33 - 1.94)
Prueba	FREELITEL		CADENAS LIGERAS LIBRES LAMBDA SUERO	mg/dL	(0.57 - 2.63)
Prueba	FREELITECO		COCIENTE KAPPA/LAMBDA LIBRES SUERO		(0.26 - 1.65)

Descripción: CADMIO ORINA

Código: CD2

Técnica: ICP-MS.

Unidades: mcg/g creatin.

Plazo: 7 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: 10 mL de orina (micción aislada)
Momento de muestreo no es crítico.

Valores de referencia: (Inf. 2) Exposición (VLB -INSHT)

Descripción: CADMIO SANGRE

Código: CD

Técnica: ICP-MS

Unidades: mcg/L

Plazo: 6 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional: 1ml de Sangre total EDTA.
Momento de muestreo no es crítico.

Valores de referencia: (Inf. 5) Indice de exposición (B.E.I.)

Descripción: Caffey, enfermedad de. Sec Gen: COL1A1
Código: GEN_000080
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Calcif. cerebr. fam. primaria: SLC20A2, PDGFRB, PDGFB, XPR1
Código: CALCI_CERE
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Calcinosis tumoral hipofosfatémica: gen GALNT3 (NGS)
Código: GALNT3_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: CALCIO IONICO
Código: CAIONICO
Técnica: Electrodo selectivo.
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Separar y congelar
Valores de referencia: (1.01 - 1.36)

Descripción: CALCIO TOTAL
Código: CA
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (8.5 - 11) < 14 años
(8.2 - 10.6) > 14 años

Descripción: CALCIO TOTAL ORINA
Código: CA2

Descripción:	CALCIO TOTAL ORINA
Técnica:	Colorimetría.
Unidades:	mg/24h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	.Indicar diuresis.
Valores de referencia:	(100 - 300)

Descripción:	CALCITONINA
Código:	CALCITO
Técnica:	Téc. CLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	0.5 mL suero. No muestra existe muestra alternativa
Valores de referencia:	(Inf. 11.8) Hombre (Inf. 4.8) Mujer

Descripción:	CALCULO BILIAR
Código:	CALCULBI
Técnica:	Espectrofotometría infrarroja
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Cálculo
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CALCULO SALIVAL
Código:	CALCULOSAL
Técnica:	Espectrofotometría infrarroja.
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Cálculo
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CALCULO URINARIO: ANALISIS QUIMICO
Código:	CALCULOR
Técnica:	Espectroscopía infrarroja.
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Cálculo
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CALPROTECTINA EN HECES
Código:	CALPROTEC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis.
Unidades:	mg/Kg

Descripción:	CALPROTECTINA EN HECES
Plazo:	5 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	Se recomienda recoger las primeras heces del día. Preferiblemente heces formes. Evitar heces sanguinolentas. Enviar congeladas.
Valores de referencia:	(Inf. 50)

Descripción:	CAMPYLOBACTER JEJUNI AC. IGG LCR
Código:	JEJUACGLCR
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Ausencia de niveles detectables de anticerpos (0.80 - 1.09) Zona límite

Descripción:	CAMPYLOBACTER JEJUNI AC. IGA
Código:	JEJUNIACA
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Ausencia de niveles detectables de anticuerpos (0.80 - 1.09) Zona límite

Descripción:	CAMPYLOBACTER JEJUNI AC.IGG
Código:	JEJUNACG
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero. Alt. plasma (EDTA, citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 20) Negativo (20 - 30) Indeterminado

Descripción:	Camurati-Engelmann, enfermedad de. Sec Gen: TGFB1
Código:	GEN_000081
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Código:	CANACALCR
Descripción:	CANALES DE CALCIO AC. LCR
Técnica:	RADIOINMUNOANÁLISIS
Comentario adicional:	1 mL LCR (Refrigerado)

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CANCAPLCR		PERFIL CANALES CALCIO AC. LCR TIPO PQ	pmol/L	(Inf. 40.0)
Prueba	CANCANLCR		PERFIL CANALES CALCIO AC. LCR TIPO N		(Inf. 15.0) Ratio

Código: CANACAAC
Descripción: CANALES DE CALCIO AC. SUERO
Técnica: Radioinmunoanálisis
Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CANACAACPQ		CANALES DE CALCIO AC. SUERO TIPO PQ	pmol/L	(Inf. 40)
Prueba	CANACAACN		CANALES DE CALCIO AC. SUERO TIPO N		(Inf. 15) Ratio

Descripción: CANALES DE POTASIO AC. LCR
Código: CANAKACLCR
Técnica: Radioinmunoanálisis
Unidades: pmol/L
Plazo: 18 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 31.0) Negativo
(31.1 - 85.0) Indetermminado
(Sup. 85.1) Positivo

Descripción: CANALES DE POTASIO AC. SUERO
Código: CANAKAC
Técnica: Radioinmunoanálisis
Unidades: pmol/L
Plazo: 18 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 31.0) Negativo
(31.1 - 85.0) Indeterminado
(Sup. 85.1) Positivo

Descripción: Canalopatías del sistema nervioso central. Panel
Código: GEN_000082
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Canavan, enfermedad de. Sec Gen: ASPA
Código: GEN_000083
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer cabeza y cuello. Muts, fusiones, reordenamient
Código: NGS_CABCUS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer colon no polipósico familiar. Sec Gen: BMPR1A
Código: GEN_000087
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer colon. Poliposis adenomatosa atenuada. Gen MUTYH
Código: MUTYH_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer colorrectal Panel 2. Somático. Mutaciones y fusiones
Código: NGS_COL2S
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon familiar ampliado. Panel
Código: GEN_000084
Técnica:

Descripción: Cáncer de colon familiar ampliado. Panel
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon familiar. Panel
Código: GEN_000085
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon HNPCC: gen MLH1 (NGS)
Código: MLH1_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon HNPCC: gen MSH2 (NGS)
Código: MSH2_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon HNPCC: gen MSH6 (NGS)
Código: MSH6_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon HNPCC: gen PMS2 (NGS)
Código: PMS2_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:

Descripción: Cáncer de colon HNPCC: gen PMS2 (NGS)
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon no polipósico familia. Sec Gen: EPCAM
Código: GEN_000515
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon no polipósico familiar. Sec Gen: MLH3
Código: GEN_000090
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon no polipósico familiar. Sec Gen: PMS1
Código: GEN_000086
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon: expresión de MYH
Código: MYH_INMUN
Técnica: Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra: tejido incluido en parafina.
Una vez hechos los cortes que se necesitan para el análisis, se devuelve el bloque al paciente/médico.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon: gen SEPT9 metilado en plasma
Código: M_SEPT9
Técnica: Real Time PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Cáncer de colon: gen SEPT9 metilado en plasma
Comentario adicional: Se necesitan mínimo 20 ml de sangre en tubos de EDTA.
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de hígado. Mutaciones, amplificaciones y fusiones
Código: NGS_HIGS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de mama / ovario familiar. Sec Gen: BRCA1
Código: GEN_000091
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de mama / ovario familiar. Sec Gen: BRCA2
Código: GEN_000092
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de mama / ovario familiar. Sec Gen: RAD51D
Código: GEN_000093
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de mama y ovario panel 2. Somático.Mutaci y fusiones
Código: NGS_OVA1S
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética

Descripción: Cáncer de mama y ovario panel 2. Somático.Mutaci y fusiones
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de páncreas somático. Mutaciones y fusiones
Código: NGS_PANCS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de próstata familiar. Panel NGS > 10 genes
Código: PROSTATAH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de próstata somático. Mutaciones
Código: NGS_PROS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de prostata: gen PCA3 expresión en orina
Código: PCA3
Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR (PCR)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Especial BM
Comentario adicional: Tubo especial para la regogida de la muestra que hay que solicitar a Almacén (Valderribas)
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de pulmón (NSCLC): gen EGFR ex. 18 a 21 (sec. Sanger)
Código: EGFR_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Una vez hechos los cortes que se necestian para el estudio, devolvemos el bloque al paciente / médico.
Rotular ONCO.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de pulmón NSCLC: reordenamientos EML4-ALK
Código: EML4_ALK
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Una vez hechos los cortes que se necestian para el estudio, devolvemos el bloque al paciente / médico.
Rotular ONCO.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de pulmón Panel 2. Muataciones, fusiones, splicing
Código: NGS_PULM2S
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina. Tª ambiente
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de tiroides Panel 2. Somático. Mutaciones
Código: NGS_TIROIS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de Vejiga somático. Mutaciones
Código: NGS_VEJS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer endometrio familiar. Panel NGS < 10 genes
Código: ENDOMETRH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama y ovario: genes BRCA1 y BRCA2 (NGS)
Código: BRCA1.2
Técnica: MLPA, PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama y ovario: genes BRCA1 y BRCA2 MLPA
Código: BRCA_MLPA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama y ovario: sec. BRCA1 y BRCA2 (NGS)
Código: BRCA1.2SEC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama, ovario y colon: 29 genes (NGS)
Código: BRCA_PLUS
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer gástrico difuso hereditario: gen CDH1 (NGS)
Código: CANCERGAST
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato y muestra de tejido.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer gástrico familiar. Panel NGS > 10 genes
Código: GASTRICOH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer hereditario: secuenciación >150 genes
Código: PANCANCER
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer páncreas familiar. Panel NGS > 10 genes
Código: PANCREASH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer renal familiar. Panel NGS > 10 genes
Código: RENALH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: CANDIDA ALBICANS AC. IGA
Código: CANDIDAIGA
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero (Refrigerado)
Alternativa: Plasma citrato, plasma heparina
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo

Descripción: CANDIDA ALBICANS AC. IGG SUERO
Código: CANDIDA
Técnica: Técnica CLIA

Descripción: CANDIDA ALBICANS AC. IGG SUERO
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo

Descripción: CANDIDA ALBICANS AC. IGM
Código: CANDIDAIGM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero (Refrigerado)
Alternativa: Plasma citrato, plasma heparina
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo

Descripción: CANNABIS
Código: CANNA
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: CANVAS: gen RFC1 secuencia (AAGGG)n
Código: RFC1_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: CAPACIDAD TOTAL FIJACION DE HIERRO (TIBC)
Código: TIBC
Técnica:
Unidades: µg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (230 - 400)

Descripción: CARBAMAZEPINA
Código: CARBA
Técnica: Enzimoinmunoensayo.
Unidades: µg/mL
Plazo: 3 días

Descripción: CARBAMAZEPINA
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (4 - 12) Rango Terapeútico

Descripción: CARBAMAZEPINA 10:11 EPOXIDO
Código: CARBAEPOX
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µg/mL
Plazo: 16 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL
Valores de referencia: (0.80 - 3.20)

Descripción: CARBAMAZEPINA LIBRE SUERO (TEGRETOL LIBRE)
Código: CARBALI
Técnica: Ultrafiltración/EIA (Ultrafiltración/Inmunoluminiscencia desde el 4-2012)
Unidades: mcg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL
Valores de referencia: (1 - 3)

Descripción: CARBIDOPA
Código: CARBIDOPA
Técnica: Cromatografía líquida / Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mcg/L
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (20 - 200)

Descripción: CARBOXIHEMOGLOBINA
Código: COHB
Técnica: Espectroscopía de absorción visible.
Unidades: %
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 3.5) Exposición a monóxido de carbono
(Inf. 10) Fumadores
(Sup. 20) Tóxico

Descripción: Carcinoma medular de tiroide familiar. Sec Gen: RET
Código: GEN_000102
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Carcinoma medular de tiroide familiar. Sec Gen: RET
Valores de referencia:

Descripción: Carcinoma papilar familiar cels renales. Sec Gen: MET
Código: GEN_000103
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: CARDINESCO
Descripción: CARDIOINCODE SCORE
Técnica: array
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SCORPMF		CARDIOSCORE POLIMORFISMOS		
Prueba	SCORIESGO		CARDIOSCORE RIESGO		

Descripción: CARDIOLIPINA AC. IGG SUERO
Código: CARDIACG
Técnica: EIA
Unidades: GLP-U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(10 - 40) Indeterminado

Descripción: CARDIOLIPINA AC. IGM SUERO
Código: CARDIACM
Técnica: EIA
Unidades: MLP-U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(10 - 40) Indeterminado

Descripción: CARDIOLIPINAS AC. IGA SUERO
Código: CARDIACA
Técnica: EIA
Unidades: ALP-U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: CARDIOLIPINAS AC. IGA SUERO
Comentario adicional: 0.5 mL Suero.
Alternativa: Plasma
Valores de referencia: (Inf. 14) Negativo
(14 - 20) Indeterminado

Descripción: Carga mutacional tumoral e inestabilidad de microsatélites
Código: TMB_INESMI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido tumoral. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO EN SANGRE DE CORDON UMBILICAL
Código: CARIOCUMB
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO EN TEJIDOS
Código: CARIOTEJ
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Muestra Citogenética
Comentario adicional: Biopsia o restos abortivos en medio RPMI
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO EN VELLOSIDADES CORIONICAS
Código: CARIOCORIO
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: GENETICA
Comentario adicional: Vellosidad corial en medio RPMI.
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO LIQUIDO AMNIOTICO
Código: CARIOAMN
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Líquidos Biológicos

Descripción: CARIOTIPO LIQUIDO AMNIOTICO

Comentario adicional: 15-20 mL Líquido amniótico a tª ambiente.
Enviar la muestra preferentemente en dos tubos truncados esteriles de 10 mL
Se requiere consentimiento informado
Se requiere información clínica, imprescindible semanas de gestación y teléfono de contacto del médico prescriptor.

Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO MEDULA OSEA

Código: CARIOMED

Técnica: Cultivo celular

Unidades:

Plazo: 21 días

Tubo: Heparina Litio

Comentario adicional: Médula ósea en medio RPMI
Conservar en nevera

Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO ONCOLOGICO EN SANGRE PERIFÉRICA

Código: CARIOSPMD

Técnica:

Unidades:

Plazo: 21 días

Tubo: Heparina Litio

Comentario adicional: HEPARINA
conservar y transportar a 4ºC

Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO SANGRE ALTA RESOLUCION

Código: CARIOSAR

Técnica: Cultivo celular

Unidades:

Plazo: 12 días

Tubo: Heparina Litio

Comentario adicional: 5 ml sangre total Heparina de litio.
Envío inmediato a temperatura ambiente.
Se requiere información clínica.

Alternativa sangre total Heparina de sodio.

Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO SANGRE PERIFERICA

Código: CARIOTIP

Técnica: Cultivo celular

Unidades:

Plazo: 21 días

Tubo: Heparina Litio

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: CARNITINA LIBRE ORINA

Código: CARNILI2

Técnica: LC-MS/MS

Descripción:	CARNITINA LIBRE ORINA
Unidades:	mcmol/g crea.
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 mL de orina. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(Inf. 1066)

Descripción:	CARNITINA LIBRE PLASMA
Código:	CARNITILIB
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	13 días
Tubo:	Plasma de Heparina Congelado
Comentario adicional:	2 ml de plasma (HEPARINA).CONGELAR y enviar congelado. Alternativa: Suero congelado
Valores de referencia:	(10 - 74)

Descripción:	CARNITINA LIBRE PLASMA SEMINAL
Código:	CARNILISE
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	1 mL plasma seminal
Valores de referencia:	(250 - 620)

Descripción:	CARNITINA TOTAL PLASMA (PERFIL)
Código:	CARNITITOT
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	µmol/L
Plazo:	13 días
Tubo:	Plasma de Heparina Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma (heparina). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(15 - 84)

Descripción:	Catarata congénita, miocardiopatía hipertrófica. Gen SLC25A4
Código:	GEN_000105
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Catarata nuclear tipo 23. Sec Gen: CRYAB
Código:	GEN_000106
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días

Descripción: Catarata nuclear tipo 23. Sec Gen: CRYAB

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Código: CATECOL2BA

Descripción: CATECOLAMINAS EN ORINA ESPONTANEA

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico

Comentario adicional: Añadir a 10 ml orina espontanea, 60 ul de HCL 5N (40% HCl 37º+ 60% agua). Identificar tubo con el comentario +ácido

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ADRE2BAS		PERFIL CATECOLAMINAS EN ORINA ESPONTANEA ADRENALINA	ug/g creatinina	(1 - 69) < 3 meses (1 - 75) 3 meses - 6 meses (1 - 60) 6 meses - 12 meses (1 - 39) 1 año - 2 años (1 - 37) 2 años - 5 años (1 - 29) 5 años - 10 años (1 - 18) 10 años - 18 años (1 - 44) > 18 años
Prueba	NORAD2BAS		PERFIL CATECOLAMINAS EN ORINA ESPONTANEA NORADRENALINA	ug/g creatinina	(36 - 272) < 3 meses (44 - 197) 3 meses - 6 meses (28 - 195) 6 meses - 12 meses (12 - 139) 1 año - 2 años (9 - 91) 2 años - 5 años (6 - 72) 5 años - 10 años (5 - 53) 10 años - 18 años (9 - 112) > 18 años
Prueba	DOPAM2BASA		DOPAMINA/CREATININA	ug/g creatinina	(193 - 2675) < 3 meses (458 - 2453) 3 meses - 6 meses (463 - 1933) 6 meses - 12 meses (220 - 1654) 1 año - 2 años (168 - 1156) 2 años - 5 años (72 - 847) 5 años - 10 años (69 - 552) 10 años - 15 años (65 - 413) 15 años - 18 años (30 - 350) > 18 años

---

Código: CATECOF

Descripción: CATECOLAMINAS FRACCIONADAS PLA

Técnica: LC-MS/MS

Comentario adicional: Volumen y condiciones de la muestra: 3 mL plasma (EDTA). Separar el plasma lo antes posible, CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. Usar tubos de 5 mL (¡sin llenar completamente!)

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NORADRENA		Perfil, Noradrenalina en plasma	pg/mL	(110 - 410) P. Supina (120 - 680) P. Sentado (125 - 700) P. Ortostática
Prueba	ADRENALI		Perfil, Adrenalina en plasma	pg/mL	(Inf. 50) P. Supina (Inf. 60) P. Sentado (Inf. 90) P. Ortostática
Prueba	DOPAMINA		Perfil, Dopamina en plasma	pg/mL	(Inf. 87)

Código: CATECO2
Descripción: CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico
Comentario adicional: 10 ml orina 24 horas con 60 ul de HCL 5N. Indicar diuresis de orina.Identificar tubo con el comentario +ácido

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HORAS_VOL		VOLUMEN DE ORINA: HORAS		
Prueba	NORADRENA2		PERFIL CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS NORADRENALINA	µg/24h	(Inf. 10) < 1 año (Inf. 17) 1 año - 2 años (Inf. 29) 2 años - 4 años (8 - 45) 4 años - 7 años (13 - 65) 7 años - 9 años (Inf. 76) > 10 años
Prueba	ADRENALI2		PERFIL CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS ADRENALINA	µg/24h	(Inf. 2.5) < 1 año (Inf. 3.5) 1 año - 2 años (Inf. 6) 2 años - 4 años (Inf. 10) 4 años - 10 años (Inf. 20) 10 años - 16 años (Inf. 18) > 16 años
Prueba	DOPAMINA2		PERFIL CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS DOPAMINA	µg/24h	(Inf. 85) < 1 año (10 - 140) 1 año - 2 años (40 - 260) 2 años - 4 años (Inf. 390) > 4 años

Descripción: CD3-CD56+CD16+ TOTALES
Código: CD3_5616T
Técnica:
Unidades: /µL
Plazo:
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO)
Código: CEA
Técnica: CMIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: (Inf. 5)

Descripción: Cegeura congénita: >10 genes (NGS)
Código: CEGUERACON
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Ceguera nocturna estacionaria congénita 2. Sec Gen PDE6B
Código: GEN_000107
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CELULAS EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: LIQLCCE
Técnica: Recuento manual
Unidades: /µL
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 5) Leucocitos (/µL)

Descripción: CELULAS ENDOTELIALES ANTICUERPOS
Código: CELENDOTEL
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =<1:100 Negativo título <1:100
=>1:100 Positivo título >1:100

Descripción: CELULAS LIQUIDO SINOVIAL
Código: LIQSICE
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: NKT
Descripción: CELULAS NKT (CELULAS LGL/T) SUBPOBLACIONES
Técnica:
Comentario adicional: 5 mL DE SANGRE EDTA TOTAL

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CD3CD56		CD3+CD56+	%	(Inf. 13)
Prueba	CD3_5616		CD3-CD56+CD16+	%	(4 - 16)
Prueba	CD3_5616_		CD3-CD56+CD16-	%	(Inf. 2)
Prueba	CD3_56_16		CD3-CD56-CD16+	%	(Inf. 2)
Prueba	CD3CD56T		CD3+CD56+ TOTALES	/µL	

Componentes					
Prueba	CD3_5616T		CD3-CD56+CD16+ TOTALES	/µL	
Prueba	CD3_56_16T		CD3-CD56-CD16+ TOTALES	/µL	
Prueba	CD3_5616_T		CD3-CD56+CD16- TOTALES	/µL	
Prueba	NOTATIP		NOTA TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		
Prueba	CELULASNK1		LINFOCITOS NATURAL KILLER SANGRE		
Prueba	CELNK1TOT		CELULAS NK TOTALES	/µL	
Prueba	LINFOTOT		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/µL	(900 - 5175)

Descripción: CERULOPLASMINA SUERO
Código: CERULO
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero.Nota tecnica 20 de 06/2019 es inestable con tubo de edta. Heparina litio si puede utilizarse
Valores de referencia: (14.8 - 29.6)

Descripción: Char, Sd. Sec Gen: TFAP2B
Código: GEN_000108
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 1: gen EGR2 (NGS)
Código: CMT1A_EGR2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 1: gen MPZ (NGS)
Código: CMT1_MPZ
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 1: gen PMP22 (NGS)
Código: CMT1_PMP22
Técnica: PCr y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 1A: deleciones y duplicaciones gen PMP22
Código: CHARCOT.MT
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 2: gen MFN2 (NGS)
Código: CMT2A_MFN2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 4A: gen GDAP1 (NGS)
Código: CMT4_GDAP1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth ligado X: gen GJB1 (NGS)
Código: CMTX_CX32
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth tipo 3. Panel
Código: GEN_000109
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth: >10 genes (NGS)
Código: CHARCOT_MT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Chediak-Higashi, Sd. Sec Gen: LYST
Código: GEN_000110
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CHIKUNGUNYA AC. IGG EN SUERO
Código: CHIKUNGIGG
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Alternativa plasma Citrato sódico
Alternativa plasma EDTA tripotásico
Alternativa plasma Heparina litio
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.09) Indeterminado

Descripción: CHIKUNGUNYA AC. IGM EN SUERO
Código: CHIKUNGIGM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Alternativa plasma Citrato sódico
Alternativa plasma EDTA tripotásico
Alternativa plasma Heparina litio

Descripción: CHIKUNGUNYA AC. IGM EN SUERO
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.09) Indeterminado

Descripción: Chikungunya DNA PCR Cualitativa
Código: CHIKUNGPCR
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero, Plasma, Orina, Saliva. Refrgerado
Valores de referencia:

Descripción: CHLAMYDIA ANTIGENO MUESTRA
Código: CHLAMYDIA
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional: Torunda específica de Chlamydia.
En mujeres toma cervical y en hombres toma uretral u orina
Valores de referencia:

Descripción: CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC. IGG
Código: CHLAPNEACG
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Ausencia exposición
(0.9 - 1.1) Zona límite
(Sup. 1.1) Presencia de anticuerpos

Descripción: CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC. IGM
Código: CHLAPNEACM
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo
(0.90 - 1.10) Indeterminado
(Sup. 1.10) Positivo

Descripción: CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC.IGA
Código: CHLAPNEACA
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC.IGA
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo <1:16
= Positivo >1:16

Descripción: Chlamydia pneumoniae DNA PCR Cualitativa
Código: CHLAMPNPCR
Técnica: Q-PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Exudado faringeo
Lavado broncoalveolar,Esputo
Biopsia respiratoria, vascular o cardiaca (sin fijación)
Liquido pericardico
0.5 mL LCR refrigerado

Coloque las biopsias en un tubo seco o con un medio de transporte.(M4RT)
Todos los fijadores histológicos están prohibidos.
Las muestras tomadas con torunda requieren el uso de un medio de transporte para virus,medio suministrado bajo pedido M4RT (REMEL)
otras muestras biológicas no deben diluirse y se tienen que mandar en un tubo seco
Valores de referencia: =Negativo Negativo

Descripción: CHLAMYDIA PSITACCI AC. IGG SUERO
Código: CHLAPSIACG
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =<1:32 Negativo < 1:32
=>1:32 Positivo >1:32

Descripción: CHLAMYDIA PSITACCI AC. IGM SUERO
Código: CHLAPSIACM
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =< 1:20 Negativo < 1:20
=> 1:20 Positivo > 1:20

Descripción: CHLAMYDIA PSITTACI AC. IGA SUERO
Código: CHLAPSIACA
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =< 1/16 Negativo <1/16
=> 1/16 Positivo >1/16

Descripción:	CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC Ig A
Código:	CHLATRAACA
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Sup. 1.1) Positivo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Inf. 0.9) Negativo

Descripción:	CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC. IGG SUERO
Código:	CHLATRAACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.89) Negativo

Descripción:	CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC. IGM
Código:	CHLATRAACM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.89) Negativo

Descripción:	Chlamydia trachomatis DNA PCR Cualitativa
Código:	CHLAMPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Muestra exclusiva para esta determinación: torunda sin medio, y rotulada con BM. Otras muestras: orina, semen,etc
Valores de referencia:	

Descripción:	CICLOHEXANOL EN ORINA
Código:	CICLOHEXAN
Técnica:	Cromatografía de gases-Ionización de llama.
Unidades:	mg/L
Plazo:	15 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	. 10 ml de orina final de jornada laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 8) Fin de la jornada laboral.

Descripción:	CICLOSPORINA
Código:	CICLOSPO
Técnica:	Inmunofluorescencia de polarización.
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	. 1 ml de sangre total EDTA.
Valores de referencia:	(150 - 250) Transplante Cardíaco (100 - 400) Transplante Hepático. (100 - 300) Transplante Médula ósea (100 - 200) Transplante Renal

Descripción:	CID sindrom. o con sintomas asociada. Sec Gen STAT5B
Código:	GEN_000111
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	CININÓGENO DE ALTO PESO MOLECULAR EN PLASMA
Código:	CININOGENO
Técnica:	Coagulación
Unidades:	%
Plazo:	17 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas, congelado
Valores de referencia:	(70 - 120)

Descripción:	CISTATINA C SUERO
Código:	CISTATINAC
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero .
Valores de referencia:	(0.62 - 1.11)

Descripción:	CISTINA EN ORINA
Código:	CISTINA
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	ORINA MICCIÓN AISLADA
Valores de referencia:	= Niños 6-170 mg/g creatinina = Adultos 10-50 mg/g creatinina

Descripción: Cistina intraleucocitaria (Cistinosis), sangre total
Código: CISTINAINT
Técnica: HPLC-EM/EM
Unidades: nmol cist/mg pt
Plazo: 30 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 10mL de sangre total Heparina a temperatura ambiente. Enviar de Lunes a miércoles.

Condiciones de obtención:
Obtener la sangre heparinizada. Si es para control de tratamiento, extraer la sangre transcurridas 6 horas de la última medicación. No congelar

Valores de referencia: = < 0.5 nmol cistina/mg proteína

Descripción: CISTINA ORINA 24H
Código: CISTINA24H
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/24 h
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml orina 24h. Indicar volumen 24h
Valores de referencia: (7 - 67)

Descripción: Cistinosis. Sec Gen: CTNS
Código: GEN_000112
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cistinuria. Sec Gen: SLC3A1
Código: GEN_000113
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cistinuria. Sec Gen: SLC7A9
Código: GEN_000114
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CITALOPRAM
Código: CITALOPRAM

Descripción: CITALOPRAM
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (10 - 300)

Descripción: Citocromo 450 2B6. Sec Gen: CYP2B6
Código: GEN_000115
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Citocromo 450 2C9. Sec Gen: CYP2C9
Código: GEN_000116
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Citocromo 450 2D6. Sec Gen: CYP2D6
Código: GEN_000117
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: CITOLB
Descripción: CITOLOGÍA DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS (ORINA, BRONCOASPIRADOS...)
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT		NREGCIT		
Prueba	SNOMEDC		SNOMED Citologías		
Prueba	PATO		PATÓLOGO		
Prueba	DMACROCITO		EXAMEN MACROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	DMICROCITO		EXAMEN MICROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	NOTACITO		Nota Citologia		
Prueba	RESDIAG		Resumen Diagnóstico		

Componentes					
Prueba	TDMBIOLOGI		TIPO DE MUESTRA BIOLOGICA		

Código: CITOPAAF
Descripción: CITOLOGIA DE PAAF
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT		NREGCIT		
Prueba	SNOMEDC		SNOMED Citologías		
Prueba	PATO		PATÓLOGO		
Prueba	DMACROCITO		EXAMEN MACROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	DMICROCITO		EXAMEN MICROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	NOTACITO		Nota Citologia		
Prueba	RESDIAG		Resumen Diagnóstico		
Prueba	TDMPAAF		TDMPAAF		

Código: CITOEXFO
Descripción: CITOLOGÍA EXFOLIATIVA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT		NREGCIT		
Prueba	SNOMEDC		SNOMED Citologías		
Prueba	PATO		PATÓLOGO		
Prueba	ESTHORM		ESTHORM		
Prueba	ASPMORG		Aspecto Morfológico		
Prueba	NOTACITO		Nota Citologia		
Prueba	RESDIAG		Resumen Diagnóstico		
Prueba	TDMEXFOLI		TOMA DE MUESTRA EXFOLIATIVA		
Prueba	CATCALIDAD		CATCALIDAD		
Prueba	ESTMICRO		ESTMICRO		

Código: CITOLIQ
Descripción: CITOLOGÍA GINECOLOGICA EN MEDIO LIQUIDO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT		NREGCIT		
Prueba	TDMBIOLOGI		TIPO DE MUESTRA BIOLOGICA		
Prueba	ESTHORM		ESTHORM		
Prueba	CATCALIDAD		CATCALIDAD		
Prueba	ESTMICRO		ESTMICRO		
Prueba	ASPMORG		Aspecto Morfológico		
Prueba	RESDIAG		Resumen Diagnóstico		
Prueba	NOTACITO		Nota Citologia		
Prueba	SNOMEDC		SNOMED Citologías		
Prueba	PATO		PATÓLOGO		

Descripción: CITOMEGALOVIRUS AC. IGG
Código: CITOACG
Técnica: CMIA.
Unidades: AU/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 5.9) Negativo
(Sup. 6.0) Inmunidad adquirida o en evolucion

Descripción: CITOMEGALOVIRUS AC. IGG EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: CITOGLC
Técnica: Inmunoanálisis (Téc. Enzimoinmunoanálisis hasta el 22-03-2012)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: CITOMEGALOVIRUS AC. IGM
Código: CITOACM
Técnica: CMIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.85) Negativo

Descripción: CITOMEGALOVIRUS AC. IGM EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: CITOMLC
Técnica: Inmunoanálisis (Hasta el 13/03/2012 Técnica EIA)
Unidades:
Plazo: 6 días

Descripción: CITOMEGALOVIRUS AC. IGM EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: .
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Citomegalovirus DNA PCR cualitativa
Código: CITOPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Muestras: suero, plasma, LCR, torunda seca, heces, orina, líquido amniótico, etc.
Valores de referencia:

Descripción: Citomegalovirus DNA PCR Cuantitativa
Código: CITOCUAN
Técnica: PCR cuantitativa
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: CITOMEGALOVIRUS IgG AVIDEZ
Código: AVIDEZCITO
Técnica: EIA
Unidades: %
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero o plasma (citrato, heparina) positiva para CMV IgG
Valores de referencia: (Inf. 45) Baja Avidez.Compatible con primoinfeccion adquirida en los últimos 2 meses.
(45 - 55) Moderada Avidez. No permite distinguir infección reciente de antigua.
(Sup. 55) Alta Avidez. Compatible con infección o reinfección pasada.

Descripción: Citopenia ligada al X asociada a GATA1. Sec Gen: GATA1
Código: GEN_000118
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CITOPLASMA NEUTROFILOS AC. (ANCA)
Código: ANCA
Técnica: IFI
Unidades:

Descripción: CITOPLASMA NEUTROFILOS AC. (ANCA)
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
= Negativo < 1/40
= Positivo > 1/40

Descripción: CITOSOL HEPATICO AC. SUERO
Código: LC1
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
=<1:10 <1:10 Negativo
=>1:10 >1:10 Positivo

Descripción: CITRULINA PLASMA
Código: CITRU
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades: mcmol/L
Plazo: 13 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional:
TUBOS ESPECIALES, SOLICITAR AL LABORATORIO.

NSTRUCCIONES OBTENCIÓN MUESTRA:
Extraer sangre total en tubo de Heparína ó EDTA y separar el PLASMA.
Mezclar a partes iguales INMEDIATAMENTE después, el plasma separado con Ácido Perclórico 1 mol/L (tubos enviados).

Ej: 1mL de plasma + 1 mL de Ácido perclórico.

Centrifugar a 3000 r.p.m. durante 10 minutos.
Separar el SOBRENADANTE en tubo adjunto (vacio), UNA VEZ SEPARADO, CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.

Valores de referencia: (15 - 50)

Descripción: Citrulinemia tipo 1. Sec Gen: ASS1
Código: GEN_000119
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Citrulinemia tipo 2. Sec Gen: SLC25A13
Código: GEN_000182
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Citrulinemia tipo 2. Sec Gen: SLC25A13
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CK ISOENZIMA MB
Código: CKMB
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 0.5 mL suero congelado
Valores de referencia: (Inf. 24)

Descripción: CK ISOENZIMA MB (MASA)
Código: CKMBMASA
Técnica: CMIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Alternativo plasma de Heparina y EDTA.
Valores de referencia: (Inf. 5.2) Hombre
(Inf. 3.1) Mujer

Descripción: Clobazam en suero
Código: CLOBAZAM
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia-Espectrometría de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero. Refrigerado. Alternativa 1 ml de plasma EDTA tripotásico.
Valores de referencia: (100.00 - 600.00) Rango terapéutico

Descripción: CLOMETIAZOL
Código: CLOMETIAZO
Técnica: Cromatografía líquida-tándem masas
Unidades: mcg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL de suero
Valores de referencia: (1.0 - 4.0)

Código: CLOMIPRAMI
Descripción: clomipramina+desmetilclomipramina
Técnica: Cromatografía Líquida de Alta Resolución
Comentario adicional: 2 mL suero

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CLPM		CLOMIPRAMINA	ng/mL	

Componentes					
Prueba	DESMECLO		DESMETILCLOMIPRAMINA	ng/mL	
Prueba	SUMACLDES		CLO+DESMET	ng/mL	(230 - 450)

Descripción: CLONAZEPAM
Código: CLONAZEPAM
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 ml suero
Valores de referencia: (15 - 70)
(Sup. 120) Tóxico

Descripción: Clorazepato (Tranxilium) en suero
Código: CLORAZEPAM
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia-Espectometría de masas
Unidades: mcg/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: .
1 ml de suero.Alternativa 1 ml de plasma de EDTA.
Valores de referencia: (0.02 - 0.8)

Descripción: CLORDIAZEPOXIDO (LIBRIUM)
Código: CLORDIAZE
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (500 - 1000)

Descripción: CLORPROMACINA
Código: CLORPROMA
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 ml suero
Valores de referencia: (50 - 300) Valores terapeúticos
(Sup. 1500) Toxicidad

Descripción: CLORURO DE METILENO (DICLOROMETANO) EN ORINA
Código: CLORUMETIL
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mg/L
Plazo: 12 días
Tubo: Orina Final de Jornada

Descripción: CLORURO DE METILENO (DICLOROMETANO) EN ORINA
Comentario adicional: de 5 a 10 mL orina (micción aislada)al final de la jornada laboral
Valores de referencia: (Inf. 0.3) Personas expuestas (Diclorometano); Final de la jornada

---

Descripción: CLORURO DE METILENO (DICLOROMETANO) EN SANGRE
Código: CLORUROMET
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mg/L
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 ml de sangre total (EDTA)
Valores de referencia: (Inf. 1.0) 2 horas tras inicio de jornada

---

Descripción: CLORUROS
Código: CL
Técnica:
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (90 - 110)

Descripción: CLOSTRIDIUM DIFFICILE PCR CUALITATIVA EN HECES
Código: CLOSTRIPCR
Técnica: PCR (HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN)
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: Heces diarreicas o acuosas. No se recomienda realizar una prueba para toxina de clostridium difficile si las heces no son diarreicas o líquidas.
Valores de referencia:

Descripción: Clouston, Sd. Sec Gen: GJB6
Código: GEN_000120
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: COACH, Sd. Sec Gen: TMEM67
Código: GEN_000121
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	COBALTO EN ORINA
Código:	COBALTO2
Técnica:	Espectrometría de masas- Plasma acoplado inductivamente
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 ml de orina aislada al final de la semana laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 15) (VLB-INSHT) Exposición al final de la semana laboral

Descripción:	COBALTO EN SANGRE TOTAL
Código:	COBALTOSAN
Técnica:	IPC-MS
Unidades:	mcg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Plasma EDTA Pruebas Especiales
Comentario adicional:	. 1 ml de sangre total EDTA al final de la semana laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 1.0)

Descripción:	COBALTO EN SUERO
Código:	COBALTO
Técnica:	Espectrometría de masas -Plasma acoplado inductivamente
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero
Valores de referencia:	(Inf. 1.0) Individuos no expuestos (Inf. 10) Prótesis de cadera (SECCA)

Descripción:	COBRE EN ORINA AISLADA
Código:	CU2_MCG
Técnica:	Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 mL de orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(2 - 80) Personas no expuestas

Descripción:	Cobre en tejido hepatico-Muestra parafinada
Código:	COBRETEJID
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	mcg/g peso seco
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	2-3 mg de tejido. Congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(10 - 43)

Descripción:	COBRE LIBRE EN SUERO
Código:	CULIBRE
Técnica:	Ultrafiltración-Espectrometría de Emisión Atómica/ Espectrometría de masas(ICP-MS)

Descripción: COBRE LIBRE EN SUERO
Unidades: µg/dL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL.
Valores de referencia: (0.0 - 10.0)

Descripción: COBRE ORINA DE 24 HORAS
Código: CU2
Técnica: Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente
Unidades: µg/24h
Plazo: 8 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 5 ml de orina de 24 horas. Indicar volumen 24 h
Valores de referencia: (Inf. 60)

Descripción: COBRE SUERO
Código: CU
Técnica: Espectrofotometría.
Unidades: µg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Valores de referencia: (70 - 140) Hombre > 12 años
(80 - 155) Mujer > 12 años
(118 - 302) Mujer > 12 años Embarazo
(20 - 70) < 6 meses
(90 - 190) 6 meses - 6 años
(80 - 160) 6 años - 12 años

Descripción: COCAINA
Código: COCA
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional: .
Valores de referencia:

Descripción: COCCIDIOIDES IMMITIS AC.
Código: COCCI
Técnica: Inmunodifusión Ouchterlony.
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: COCIENTE ALDOSTERONA/RENINA DIRECTA
Código: RAR
Técnica: Cálculo

Descripción: COCIENTE ALDOSTERONA/RENINA DIRECTA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Cockayne tipo B. Panel
Código: GEN_000122
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: COENZIMA Q 10 (ANNE)
Código: COEQ10
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Ultravioleta.
Unidades: mg/L
Plazo: 13 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 2 mL plasma(EDTA).Separar y congelar inmediatamente. Proteger de la luz.
Valores de referencia: (0.5 - 1.8)

Descripción: COFACTOR II HEPARINA EN PLASMA
Código: COFACTHEPA
Técnica: Substrato cromogénico.,
Unidades: %
Plazo: 31 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL plasma.Congelar y enviar congelado
Valores de referencia: (65 - 145)

Descripción: Coffin-Lowry, Sd. Sec Gen: RPS6KA3
Código: GEN_000123
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cohen, Sd. Sec Gen: VPS13B
Código: GEN_000124
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Cohen, Sd. Sec Gen: VPS13B
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: COLAGENO TIPO II AC. SUERO
Código: COLAGTIPII
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: UA/mL
Plazo: 27 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero, refrigerado
Valores de referencia: = <1.0 Negativo
= > ò = 1 Positivo

Descripción: COLAGENO TIPO VII NC1 ANTICUERPOS SUERO
Código: COLAGTVII
Técnica: Enzimoinmunoanalisis
Unidades: Indice
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: = Negativo < 1
= Positivo >1

Descripción: Colestasis intrahepática familiar progresiva. Panel
Código: GEN_000125
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Colestasis intrahepática familiar progresiva: gen MDR3 (NGS)
Código: MDR3_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Colestasis intrahepática familiar. Sec Gen: ABCB11
Código: GEN_000126
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Colestasis intrahepática familiar. Sec Gen: ABCB11
Valores de referencia:

Descripción: COLESTEROL
Código: CHOL
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 200)

Descripción: COLINESTERASA
Código: COLI
Técnica: Colorimétrico multifrecuencia.
Unidades: U/L a 37 ºC
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Valores de referencia: (5100 - 13700) Hombre
(4400 - 12100) Mujer

Descripción: COLINESTERASA ERITROCITARIA
Código: COLINESERI
Técnica: Cinética.
Unidades: U/L (37º)
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 mL sangre total.Evitar envío fin de semana.
Valores de referencia: (5600 - 15500)

Descripción: Coloboma renal, Sd. Sec Gen: PAX2
Código: GEN_000127
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: COLOR LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: LIQLCCOLOR
Técnica: Observación
Unidades:
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Compatibilidad genética 5 enferm: FQ, FRAXA, SMN, GJB2 y HBB
Código: COMPAT_BAS

Descripción: Compatibilidad genética 5 enferm: FQ, FRAXA, SMN, GJB2 y HBB
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Complejo de Carney. Sec Gen: PRKAR1A
Código: GEN_000128
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: COMPLEMENTO C-1 ESTERASA INHIBIDOR ACTIVIDAD PLASMA
Código: C1ESTERA
Técnica: Téc.Cromogénica
Unidades: %
Plazo: 5 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1mL plasma citrato Congelado
Valores de referencia: (70 - 130)

Descripción: COMPLEMENTO C-1 ESTERASA INHIBIDOR PROTEÍNA
Código: C1ESTERAP
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (21 - 38)

Descripción: COMPLEMENTO C-1 Q SUERO
Código: C1Q
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: (25.7 - 37.9)

Descripción: COMPLEMENTO C-2 SUERO
Código: C2
Técnica: Inmunodifusión radial
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días

Descripción: COMPLEMENTO C-2 SUERO
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero congelado
Valores de referencia: (14.0 - 25.0)

Descripción: COMPLEMENTO C-3 ACTIVADOR SUERO
Código: C3ACTIVA
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Alt. plasma EDTA o plasma heparina
Valores de referencia: (Sup. 20)

Descripción: COMPLEMENTO C-3 SUERO
Código: C3
Técnica: Inmunoturbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero.
NOTA TECNICA ABBOTT (21-5-2019) NO SE PUEDE UTLIZAR EDTA Alternativa plasma heparina.
Valores de referencia: (82 - 173) Mujer 1 año - 14 años
(83 - 193) Mujer 14 años - 80 años
(80 - 170) Mujer > 81 años
(80 - 170) Hombre 1 año - 14 años
(82 - 185) Hombre 14 años - 80 años
(80 - 170) Hombre > 81 años

Descripción: COMPLEMENTO C-4 SUERO
Código: C4
Técnica: Inmunoturbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Alt. plasma EDTA o plasma heparina
NOTA TECNICA ABBOTT (21-5-2019) NO SE PUEDE UTLIZAR EDTA NI PLASMA HEPATINA
Valores de referencia: (13 - 46) Mujer 1 año - 14 años
(15 - 57) Mujer 14 años - 80 años
(14 - 44) Mujer > 81 años
(14 - 44) Hombre 1 año - 14 años
(15 - 53) Hombre 14 años - 80 años
(14 - 44) Hombre > 81 años

Descripción: COMPLEMENTO C-5 SUERO
Código: C5
Técnica: INMUNODIFUSION RADIAL
Unidades: mg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL de suero refrigerado.

Descripción:	COMPLEMENTO C-5 SUERO
Valores de referencia:	(100 - 169) Mujer (90 - 172) Hombre

Descripción:	COMPLEMENTO C-6 SUERO
Código:	C6
Técnica:	Inmunodifusión radial
Unidades:	mg/dL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	(7.1 - 12.8)

Descripción:	COMPLEMENTO C-7 SUERO
Código:	C7
Técnica:	Inmunodifusión radial
Unidades:	mg/dL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	(4.0 - 11.0)

Descripción:	COMPLEMENTO C-8 SUERO
Código:	C8
Técnica:	Inmunodifusión radial
Unidades:	mg/dL
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	(10.7 - 24.9)

Descripción:	COMPLEMENTO C-9 SUERO
Código:	C9
Técnica:	Inmunodifusión radial
Unidades:	mg/dL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(12.5 - 26.5)

Descripción:	COMPLEMENTO HEMOLITICO 50 SUERO
Código:	CH50
Técnica:	Inmunoensayo in vitro automatizado basado en liposomas
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero. Congelar inmediatamente
Valores de referencia:	(41 - 95)

Descripción:	Comunicación interauricular cardíaca. Sec Gen: MYH6
Código:	GEN_000129

Descripción: Comunicación interauricular cardíaca. Sec Gen: MYH6
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia metafisaria tipo Jansen. Sec Gen: PTH
Código: GEN_000130
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia metafisaria tipo Schmid: gen COL10A1 (NGS)
Código: COL10A1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia punctata ligada al X t1. Sec Gen: ARSE
Código: GEN_000131
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia punctata ligada al X t2. Sec Gen: EBP
Código: GEN_000132
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia punctata ligada al X. Panel
Código: GEN_000133
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Condrodisplasia punctata ligada al X. Panel
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia tipo Blomstrand. Sec Gen: PTH1R
Código: GEN_000134
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Convul. neonat-infantil benigna famil. Sec Gen: SCN2A
Código: GEN_000136
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: COPROVET
Descripción: Coprocultivo veterinaria
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVOVET	HECES	Cultivo general veterinaria en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE HECES		

Descripción: COPROPORFIRINA ISOMEROS (I-III) ORINA
Código: COPROISOME
Técnica: HPLC
Unidades: mcg/24h
Plazo: 9 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 mL de orina 24 horas. Indicar volumen total de 24 horas.
Valores de referencia: (Inf. 35) COPROPORFIRINA I
(Inf. 65) COPROPORFIRINA III

Descripción: Corea benigna familiar. Sec Gen: NKX2-1
Código: GEN_000137
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Corea benigna familiar. Sec Gen: NKX2-1
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Corea hereditaria benigna: gen NKK2-1 (NGS)
Código: NKX2_1_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cornelia de Lange, Sd. Panel
Código: GEN_000138
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Coronavirus SARS-COV-2 genotipo
Código: COV2GENOTI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 2 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra respiratoria: torunda nasofaríngea con medio de transporte Vircell (solicitar al almacén Valderribas).
Valores de referencia:

Descripción: Coronavirus SARS-COV-2 RT-PCR
Código: COV2PCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 2 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra respiratoria: torunda nasofaríngea con medio de transporte Vircell (solicitar al almacén Valderribas)
Valores de referencia:

Descripción: CORTICOSTERONA SUERO
Código: CORTICOSTE
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/dL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 ml de suero congelado
Valores de referencia: (0.1 - 2.0) Adultos
(Inf. 6.5) Despues de ACTH

Descripción:	CORTISOL EN SALIVA (1 MUESTRA) 23-24 HORAS
Código:	CORTISA24H
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	18 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	1 mL saliva
Valores de referencia:	(Inf. 1.00)

Descripción:	CORTISOL EN SALIVA (1 MUESTRA) MAÑANA
Código:	CORTISA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	18 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	1 mL saliva
Valores de referencia:	(1.19 - 7.21)

Descripción:	CORTISOL EN SALIVA (1 MUESTRA) TARDE
Código:	CORTISATAR
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	18 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	1 ml saliva
Valores de referencia:	(0.33 - 2.23)

Descripción:	CORTISOL LIBRE URINARIO
Código:	CORTI2
Técnica:	ICMA
Unidades:	mcg/24 h
Plazo:	4 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 53) < 20 años (Inf. 90) > 20 años

Descripción:	CORTISOL SUERO
Código:	CORTI
Técnica:	ICMA
Unidades:	mcg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(5 - 25) Mañana (3 - 16) Tarde

Descripción:	COTININA ORINA (METABOLITO DE NICOTINA)
Código:	COTININA
Técnica:	Técnica ICMA

Descripción:	COTININA ORINA (METABOLITO DE NICOTINA)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina pruebas especiales
Comentario adicional:	10 mL orina Recoger orina sin conservantes.
Valores de referencia:	(Inf. 500) No Fumadores (Sup. 500) Fumadores

Descripción:	COTININA SUERO (METABOLITOS DE NICOTINA)
Código:	COTININASU
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	ng/ml
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero.
Valores de referencia:	(Inf. 25) No Fumadores (Sup. 25) Fumadores

Descripción:	COVID IGG SEROLOGIA ELISA
Código:	COVIDGEIA
Técnica:	
Unidades:	.
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: Plasma de heparina/citrato.
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo

Descripción:	COVID IGM SEROLOGIA ELISA
Código:	COVIDMEIA
Técnica:	
Unidades:	Indice
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo

Descripción:	COVID19 IGG SEROLOGIA CMIA
Código:	COVIDIGG
Técnica:	CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma de Edta
Valores de referencia:	(Inf. 1.4) Negativo

Descripción:	Cowden, Sd. Panel
Código:	GEN_000139
Técnica:	

Descripción: Cowden, Sd. Panel
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Coxiella burnetii Fase II Ac. IGM
Código: COXIEIACM
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Alternativa: plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9.01 - 11) Indeterminado

Código: COXIEIACG
Descripción: COXIELLA BURNETII FASE I/II AC. IGG
Técnica: EIA
Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COGFASEI		Coxiella burnetii Fase I IgG	Índice	(Inf. 9) Negativo (9.01 - 11) Indeterminado
Prueba	COGFASEII		Coxiella burnetii Fase II IgG	Índice	(Inf. 9) Negativo (9.01 - 11) Indeterminado

---

Descripción: Coxiella burnetii Fase II IGG LCR
Código: COXBURLCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Biopsia ganglio: Se puede hacer siempre y cuando la muestra no esté conservada en FORMOL, tienen que en solución salina estéril.
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Coxiella burnetii Fase II IGM LCR
Código: COXBIMLCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR

Descripción: Coxiella burnetii Fase II IGM LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: COXSACKIE A9 AC. IGG
Código: COXACKIA9G
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: = <1:40 Negativo
= > ó = 1:40 Positivo

Descripción: COXSACKIE A9 AC. IGM
Código: COXACKIA9M
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta.
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: = < 1:20 Negativo
= > ó = 1:20 Positivo

Descripción: COXSACKIE A9 AC. IgG EN LCR
Código: COXACKA9GL
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR
Valores de referencia: = Positivo título>1:1

Descripción: COXSACKIE A9 AC. IgM EN LCR
Código: COXACKA9ML
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR
Valores de referencia: = Positivo título>1:1

Descripción: COXSACKIE B AC. IgM EN LCR
Código: COXACKBML
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta.
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR
Valores de referencia: = Positivo título>1:1

Descripción:	COXSACKIE B AC. IgG EN LCR
Código:	COXACKBGL
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR
Valores de referencia:	= Positivo título>1:1

Descripción:	COXSACKIE B AC. IGG EN SUERO
Código:	COXACKIB1G
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Índice
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero Alt. Plasma
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	COXSACKIE B AC. IGM EN SUERO
Código:	COXACKIB1M
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Índice
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1ml Suero Alt. Plasma
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	Craneosinostosis: <10 genes (NGS)
Código:	CRANEOSINO
Técnica:	NGS con TSO Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	CREATIN KINASA
Código:	CK
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL de suero
Valores de referencia:	(Inf. 190) Hombre (Inf. 167) Mujer

Descripción:	Creatina en suero
Código:	CREATINAS
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	mg/dL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(0.17 - 0.5) Hombre (0.35 - 0.93) Mujer

Descripción:	CREATINA ORINA
Código:	CREATINA
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	µmol/24 h
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	Congelar
Valores de referencia:	(Inf. 305.0) Hombre (Inf. 609.0) Mujer

Descripción:	CREATININA
Código:	CREA
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.55 - 1.02) Mujer > 20 años (0.73 - 1.18) Hombre > 20 años (0.34 - 0.54) < 1 año (0.35 - 0.59) 1 año - 6 años (0.40 - 0.68) Mujer 6 años - 11 años (0.52 - 0.71) Hombre 6 años - 11 años (0.52 - 0.79) Mujer 11 años - 15 años (0.52 - 0.82) Hombre 11 años - 15 años (0.58 - 0.91) Mujer 15 años - 20 años (0.61 - 1.04) Hombre 15 años - 20 años

Descripción:	CREATININA ORINA
Código:	CREA2
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	g/24h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(1.2 - 2.5) Hombre (0.8 - 1.4) Mujer

Código:	CKISOEN
Descripción:	CREATINQUINASA ISOENZIMAS -MACROCREATINQUINASA
Técnica:	Electroforesis en gel de agarosa

Código: CKISOEN

Comentario adicional: 1 mL suero.
Plazo: 12 días

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FRACCKBB		ISOENZIMAS CK (CK-MB, CK-MM, CKBB) Electroforesis		

Descripción: Creutzfeldt-Jakob, enf. Gen: PRNP.Polimorfismo 129 (M129V)
Código: GEN_000325
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cribado neonatal ampliado
Código: TALONAMPLI
Técnica: Espectrometría de masa en tándem (EMT)
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Recogida de la sangre sobre tarjeta de papel de filtro (FTA).
El estudio puede realizarse en sangre de cordón, sangre de talón, o por venopunción.
Valores de referencia:

Descripción: Crigler Najjar 1, Sd.Gen: UGT1A1. Detección de inserción TA
Código: GEN_000140
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Crigler Najjar tipo 1, Sd. Sec Gen: UGT1A1
Código: GEN_000141
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CRIOAGLUTININAS SUERO
Código: CRIOAGLU
Técnica: Aglutinación
Unidades:

Descripción: CRIOAGLUTININAS SUERO
Plazo: 5 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Suero extraído en tubo seco (tapón marrón, SIN gelosa. Los geles pueden interferir al quedar partículas de gel adsorbidas a la superficie del hematíe) Y tubo de EDTA. TUBOS EXCLUSIVOS PARA ESTAS DETERMINACIONES.
Valores de referencia: = Valores significativos a partir de 1/32

Descripción: Criofibrionogeno en plasma
Código: CRIOFIBRI
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 2 mL Plasma Citrato sódico
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: CRIOGLOBULINAS
Código: CRIOGLO
Técnica: Precipitación
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero extraido en tubo seco (tapón marrón, SIN gelosa). TUBO EXCLUSIVO PARA ESTA DETERMINACIÓN.

Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que precipitan a bajas temperaturas, por ello la muestra se debe obtener y mantener en todo momento hasta la obtención del suero a 37 º C.
Para ello la jeringa y el tubo en que se va a extraer la muestra se debe mantener en estufa 30 minutos antes de la extracción. Para poder tener siempre disponible material a 37º C, en la estufa de Hematología se mantienen siempre tubos de bioquímica (

descender, se transportan en el mismo recipiente en el que se encuentran en la estufa: termo lleno de arena en el que se "hunden" los tubos y del que sólo se sacan en el momento de la extracción, volviéndolo a colocar en la arena para su transporte ha

extracción la muestra se transporta a 37 º C en la arena del termo y se deja coagular a 37 º C en baño maría o en estufa.
Cuando ya se ha producido la coagulación, se centrifuga el tubo y se obtiene el suero.
Si el proceso se ha mantenido en todo momento a 37º C las crioglobulinas presentes en el suero se podrán recuperar por precipitación en frío.

Valores de referencia: = Negativo

Descripción: Crisponi. Panel
Código: GEN_000142
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Crohn, enfermedad de. Panel
Código: GEN_000327
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CROMO ORINA
Código: CR2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 5 mL orina (micción aislada) al final de la semana laboral o al principio y final de la jornada laboral.
Valores de referencia:

Descripción: CROMO ORINA FINAL DE JORNADA (INCREMENTO TURNO)
Código: CR2F
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 5 mL orina (micción aislada) final de jornada laboral
Valores de referencia: (Inf. 25) Personal expuesto (Final jornada laboral)

Descripción: CROMO ORINA INICIO DE JORNADA (INCREMENTO TURNO)
Código: CR2I
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 7 días
Tubo: ORINA INICIO JORNADA LABORAL
Comentario adicional: 5 mL orina (micción aislada) al final de la semana laboral o al principio y final de la jornada laboral.
Valores de referencia:

Descripción: CROMO SUERO
Código: CR
Técnica: Plasma acoplado inductivamente con detector de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 2) No expuestos
(Inf. 5) Prótesis de cadera (SECCA)
(Sup. 12) Considerar cirugía (SECCA)

Descripción: CROMOGRANINA A SUERO
Código: CROMOGRANI
Técnica: EIA
Unidades: mcg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero. Ayunas.
Valores de referencia: (Inf. 100)

Descripción: Crouzon, Sd. Sec Gen: FGFR2
Código: GEN_000143
Técnica:

Descripción: Crouzon, Sd. Sec Gen: FGFR2
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS AG. EN LCR
Código: CRYPTOLCR
Técnica: Aglutinación.
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: = Negativo <1/2

Descripción: CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIGENO
Código: CRYPTOAG
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =<1/4 Negativo < 1/4

Descripción: CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS MUESTRA PCR
Código: CRYPTOCPCR
Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN (PCR)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 2 mL Sangre Total y otras muestras.
Valores de referencia:

Descripción: CRYPTOSPORIDIUM MUESTRA PCR
Código: CRYPTOSPCR
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 2 mL sangre total y otras muestras (LCR...)
Valores de referencia:

Descripción: Cuantificación ADN en bloque tumoral parafinado
Código: CUANTIFADN
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:

Descripción: Cuantificación ADN en bloque tumoral parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Cuantificacion de DNA libre circulante
Código: CFDNA_CUAN
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo Streck
Valores de referencia:

Descripción: CUERPOS REDUCTORES EN HECES
Código: REDUCTORES
Técnica: Colorimetrica
Unidades: g/dL
Plazo: 4 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.50)

Descripción: Culler-Jones, Sd. Sec Gen: GLI2
Código: GEN_000144
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CULTIVO EN MEDIO LOWENSTEIN IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA (C
Código: LOWES
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional: Muestra en frasco esteril
Valores de referencia:

Descripción: Currarino, Sd. Sec Gen: MNX1
Código: GEN_000145
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: MELATOSA
Descripción: CURVA DE MELATONINA EN SALIVA

Código: MELATOSA
Técnica: EIA
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MELATOSA20		MELATONINA EN SALIVA (1 MUESTRA) A LAS 20:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA21		MELATONINA EN SALIVA (1 MUESTRA) A LAS 21:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA22		MELATONINA EN SALIVA (1 MUESTRA) A LAS 22:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA23		MELATONINA EN SALIVA (1 MUESTRA) A LAS 23:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA24		MELATONINA EN SALIVA (1 MUESTRA) A LAS 24:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA01		MELATONINA EN SALIVA A LAS 01:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA02		MELATONINA EN SALIVA A LAS 02:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA03		MELATONINA EN SALIVA A LAS 03:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA04		MELATONINA EN SALIVA A LAS 04:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA05		MELATONINA EN SALIVA A LAS 05:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA06		MELATONINA EN SALIVA A LAS 06:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA07		MELATONINA EN SALIVA A LAS 07:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA08		MELATONINA EN SALIVA A LAS 08:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA18		MELATONINA EN SALIVA (1 MUESTRA) A LAS 18:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE
Prueba	MELATOSA19		MELATONINA EN SALIVA (1MUESTRA) A LAS 19:00 HORAS	pg/mL	(Inf. 5) DIA (Sup. 10) NOCHE

Descripción: Cutis Laxa autosómico recesiva. Panel
Código: GEN_000146
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cutis Laxa. Panel
Código: GEN_000147
Técnica:
Unidades:

Descripción: Cutis Laxa. Panel
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CYFRA 21.1 SUERO
Código: CYFRA21.1
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero recogido en tubos estándar de muestra o en tubos que contienen gel de separación.
Plasma tratado con heparina de litio o con EDTA di o tripotásico.
Pueden emplearse tubos para plasma que contengan gel de separación.
Valores de referencia: (Inf. 3.3)

Descripción: CYFRA 21-1 EN LIQUIDO PLEURAL
Código: CYFRA211LP
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Líquido Bioquímica
Comentario adicional: 1 mL líquido pleural
Valores de referencia: (Inf. 50) Compatible con pleuritis benignas

---

Descripción: DAO: mutaciones gen DAO
Código: DAO_GEN
Técnica: SANGER
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Darier-White, enfermedad de. Sec Gen: ATP2A2
Código: GEN_000148
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Def. glucosa-6-fosfato deshidr.: gen G6PD (NGS)
Código: G6PD_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:

Descripción: Def. glucosa-6-fosfato deshidr.: gen G6PD (NGS)
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defect coagulac por defici recep prot C. Sec Gen: PROCR
Código: GEN_000152
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos coagula por deficien Factor XI. Sec Gen: F11
Código: GEN_000151
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos congénitos de la glicosilación. Panel
Código: GEN_000149
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos en la biogénesis de peroxisomas. Panel
Código: GEN_000150
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos en la fosforilación oxidativa. Panel
Código: GEN_000153
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Defectos en la fosforilación oxidativa. Panel
Valores de referencia:

Descripción: Defectos en la oxidación de los ácidos grasos. Panel
Código: GEN_000154
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia del transportador de MCT8: gen SLC16A2 (NGS)
Código: SLC16A2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en 21-hidroxilasa: secuenciacion gen CYP21A2
Código: CYP21
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en 5-alfa-reductasa: gen SRD5A2 (NGS)
Código: ALFA_REDUC
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en mioadelinato desaminasa: gen AMPD1 (NGS)
Código: AMPD1
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en TPMT: gen TPMT (NGS)
Código: TPMT_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia transp. glucosa 1 (GLUT1): gen SLC2A1 (NGS)
Código: SLC2A1
Técnica: NGS con TSOE de Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3-hidroxiacil-CoA deshidrogena. Sec Gen: HADH
Código: GEN_000161
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3hidroxiacilCoA deshidrogenasa cad larga Gen HADHA
Código: GEN_000160
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3-metilcrotonil-CoA carboxi 1. Sec Gen: MCCC1
Código: GEN_000162
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3-metilcrotonil-CoA carboxil2. Sec Gen: MCCC2
Código: GEN_000163
Técnica:

Descripción: Déficit 3-metilcrotonil-CoA carboxil2. Sec Gen: MCCC2
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit Acil-CoA deshidr cadena media. Sec Gen: ACADM
Código: GEN_000165
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit Acil-CoA deshidrog cad larga. Sec Gen: ACADVL
Código: GEN_000167
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit Acil-CoA deshidroge cad corta. Sec Gen: ACADS
Código: GEN_000166
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit acil-CoA oxidasa peroxisomal. Sec Gen: ACOX1
Código: GEN_000168
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit adenina fosforribosiltransfer. Sec Gen: APRT
Código: GEN_000169
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Déficit adenina fosforribosiltransfer. Sec Gen: APRT
Valores de referencia:

Descripción: Déficit arginina:glicina amidinotransf. Sec Gen: GATM
Código: GEN_000173
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit carnitina palmitoiltransfer 1. Sec Gen: CPT1A
Código: GEN_000178
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit carnitina palmitoiltransfer 2. Sec Gen: CPT2
Código: GEN_000179
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit carnitina-acilcarnitina. Sec Gen SLC25A20
Código: GEN_000180
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit combinado de hormona pituitaria. Panel
Código: GEN_000158
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa. Panel
Código: GEN_000164

Descripción: Déficit de 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa. Panel
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de adenosina deaminasa. Sec Gen: ADA
Código: GEN_000170
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de arginasa. Sec Gen: ARG1
Código: GEN_000172
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de ATP sintasa, nuclear 1. Sec Gen: ATPAF2
Código: GEN_000188
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de beta-cetotiolasa. Sec Gen: ACAT1
Código: GEN_000174
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de biotinidasa. Sec Gen: BTD
Código: GEN_000175
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Déficit de biotinidasa. Sec Gen: BTD
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de butiril-colinesterasa. Sec Gen: BCHE
Código: GEN_000176
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de carnitina-palmitoiltransferasa. Panel
Código: GEN_000177
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de citocromo C oxidasa. Sec Gen: SCO2
Código: GEN_000181
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de coenzima Q10. Sec Gen: APTX
Código: GEN_000183
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de fumarasa. Sec Gen: FH
Código: GEN_000184
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de glipoproteína VI. Sec Gen: GP6
Código: GEN_000156
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de glutamina sintetasa. Sec Gen: GLUL
Código: GEN_000185
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de hormona de crecimiento. Sec Gen: GH1
Código: GEN_000189
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de hormona hipofisaria. Sec Gen: PROP1
Código: GEN_000187
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de malonil-CoA. Sec Gen: MLYCD
Código: GEN_000190
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de N-acetil glutamato sintasa. Sec Gen: NAGS
Código: GEN_000191
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Déficit de N-acetil glutamato sintasa. Sec Gen: NAGS
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de ornitina aminotransferasa. Sec Gen: OAT
Código: GEN_000192
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de ornitina transcarbamilasa. Sec Gen: OTC
Código: GEN_000193
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de pir.deshidrogenasa fosfatas. Sec Gen: PDP1
Código: GEN_000196
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de piruvato carboxilasa. Sec Gen: PC
Código: GEN_000194
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de piruvato descarboxilasa. Sec Gen: PDHA1
Código: GEN_000195
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de piruvato quinasa. Sec Gen: PKLR
Código: GEN_000197
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de plasminógeno tipo 1. Sec Gen: PLG
Código: GEN_000198
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de proteína D-bifuncional. Sec Gen: HSD17B4
Código: GEN_000199
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de purina nucleósido fosforilasa. Sec Gen: PNP
Código: GEN_000209
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de sacarasa isomaltasa: gen IS (NGS)
Código: SACAR_ISOM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de succinato-CoQ reductasa. Sec Gen: SDHA
Código: GEN_000202
Técnica:
Unidades:

Descripción: Déficit de succinato-CoQ reductasa. Sec Gen: SDHA
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de tetrahidrobiopterina. Panel
Código: GEN_000204
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit del complejo II mitocondrial. Sec Gen: SDHAF1
Código: GEN_000210
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit en alfa-1-antitripsina. Sec Gen: SERPINA1.
Código: GEN_000036
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit en colesterol7alfahidroxilas. Sec Gen: CYP7A1
Código: GEN_000212
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit en tirosin hidroxilasa. Sec Gen: TH
Código: GEN_000207
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit familiar de lipoproteinlipasa. Sec Gen: LPL
Código: GEN_000213
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit guanidino-acetato metiltransfe. Sec Gen: GAMT
Código: GEN_000186
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit inhibidor activador plasminógeno. SERPINE1. 4G/5G
Código: GEN_000159
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit intelectual lig X. Hipoplasia cerebelosa. Gen OPHN1
Código: GEN_000214
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit intelectual ligado al cr X Hedera. Sec Gen: ATP6AP2
Código: GEN_000215
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit intelectual. Panel
Código: GEN_000216
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Déficit intelectual. Panel
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit múltiple de carboxilasa. Sec Gen: HLCS
Código: GEN_000217
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit múltiple de sulfatasa. Sec Gen: SUMF1
Código: GEN_000218
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit primario de carnitina. Sec Gen: SLC22A5
Código: GEN_000219
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit primario de coenzima Q10. Panel
Código: GEN_000220
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit prot. E3binding pir. deshidrogen. Sec Gen: PDHX
Código: GEN_000201
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit succíninil-semialdehido-deshidrogen. Gen ALDH5A1
Código: GEN_000203
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit zinc neonatal transitoria. Sec Gen: SLC30A2
Código: GEN_000157
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficits combinados de la fosforilación oxidativa. Panel
Código: GEN_000221
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Deg. macular asociada a la edad: 6 polim. (sec. Sanger)
Código: DMAE_SNP
Técnica: SNPs
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Degeneración de la retina. Panel
Código: GEN_000222
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Degeneración macular asociada a la edad. Panel
Código: GEN_000223
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Degeneración macular asociada a la edad. Panel
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Degeneración macular asociada a la edad: >10 genes (NGS)
Código: DMAE
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Degeneración macular. Panel
Código: GEN_000224
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: DEHIDROEPIANDROSTERONA -S EN SALIVA
Código: DEHASSALI
Técnica: Téc. EIA (Enzimoinmunoanálisis)
Unidades: ng/mL
Plazo: 23 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: 1 ml de saliva. Toma de muestra a las 8 mañana.
Valores de referencia: (0.20 - 2.50) Mujer
(0.26 - 2.70) Hombre

Descripción: DEHIDROEPIANDROSTERONA, Suero
Código: DEHA
Técnica: Técnica EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero. Alternativa PLasma EDTA/. Refrigerado
Valores de referencia: (1.11 - 10.62) Hombre
(0.22 - 10.19) Mujer

Descripción: DEHIDROEPIANDROSTERONA-S
Código: DEHAS
Técnica: Téc. ICMA
Unidades: µg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: DEHIDROEPIANDROSTERONA-S

Comentario adicional:

Valores de referencia:
```
(0.61 - 4.94) Mujer 15 años - 19 años
(1.34 - 4.07) Mujer 20 años - 24 años
(0.96 - 5.11) Mujer 25 años - 34 años
(0.75 - 4.10) Mujer 35 años - 44 años
(0.56 - 2.83) Mujer 45 años - 54 años
(0.29 - 1.82) Mujer 55 años - 64 años
(0.34 - 0.79) Mujer 65 años - 70 años
(0.45 - 3.85) Hombre 15 años - 19 años
(2.38 - 5.39) Hombre 20 años - 24 años
(1.68 - 5.92) Hombre 25 años - 34 años
(1.39 - 4.84) Hombre 35 años - 44 años
(1.36 - 4.48) Hombre 45 años - 54 años
(0.49 - 3.62) Hombre 55 años - 64 años
(2.29 - 2.84) Hombre 65 años - 70 años
```

Descripción: Delec y Dupli MLPA gen MEFV. Fiebre mediterránea familiar

Código: FIEBRME_DE

Técnica: MLPA

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Delecio y dupli MLPA: gen CFTR, Fibrosis Quisitica y ACBVD

Código: CFTR_MLPA

Técnica: RCP-MLPA

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Delecion 1p/19q, CDKN2A, CDKN2B, CDKN2C, Mut IDH1,IDH2

Código: DEL_1P_19Q

Técnica: MLPa

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Tejido tumoral incluido en parafina, tejido tumoral fresco ROTULADO ONCO.

Valores de referencia:

Descripción: Deleciones gen TP53

Código: TP53_DELEC

Técnica:

Unidades:

Plazo: 10 días

Descripción: Deleciones gen TP53
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones o duplicaciones en los cromosomas 1p, 3, 6 y 8
Código: MELAN_MLPA
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones PDGFRA, EGFR, CDKN2A, PTEN, TP53 y det EGFRvIII
Código: EGFRVIII
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
Tejido tumoral
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones subteloméricas y síndr. de microdeleción por MLPA
Código: MLPA_RMENT
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y dupli 21-hidroxilasa, MLPA gen CYP21A2
Código: CYP21_MLPA
Técnica: PCR-MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y dupli MLPA gen GJB2, Cx 26. Hipoacusia heredi
Código: GJB2_MLPA
Técnica: MLPA

Descripción: Deleciones y dupli MLPA gen GJB2, Cx 26. Hipoacusia heredi
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y Duplicac MLPA gen TSC1.Esclerosis Tuberosa 1
Código: TSC1_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y Duplicac MLPA gen TSC2.Esclerosis Tuberosa 2
Código: TSC2_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y Duplicaciones MLPA gen NF1. Neurofibromatosis 1
Código: NF1_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y Duplicaciones MLPA gen USHA2. Síndrome Usher 2
Código: USHER2_MLP
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y Duplicaciones MLPA: Diabetes MODY tipos 1al 10
Código: MODY_MLPA
Técnica: MLPA

Descripción: Deleciones y Duplicaciones MLPA: Diabetes MODY tipos 1al 10
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Demencia de Pick: genes PSEN1 y MAPT (NGS)
Código: DEMEN_PICK
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Demencia frontotemporal. Panel
Código: GEN_000225
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Demencia Lewy-Boy: secuenciación genes GBA, SNCA y SNCB
Código: LEWY_BODY
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Demencia por cuerpos de Lewy. Sec Gen: SNCA
Código: GEN_000226
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Demencias. Panel
Código: GEN_000227
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Demencias. Panel
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: DENGUE AC. IGG
Código: DENGUEAC
Técnica: CLIA
Unidades: Índice
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: DENGUE AC. IGM
Código: DENGUEACM
Técnica: CLIA
Unidades: Índice
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: DENGUE VIRUS (SEROTIPOS 1-4 FLAVIVIRUS)PCR
Código: DENGUEPCR
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Plasma EDTA, Suero, Orina, Saliva. Refrigerada
Valores de referencia:

Descripción: Dent, enfermedad de. Panel
Código: GEN_000228
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Denys-Drash, Sd. Sec Gen: WT1
Código: GEN_000229
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Denys-Drash, Sd. Sec Gen: WT1
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: DEPORTPLUS
Descripción: Deporte +Nutrigenetica+Ancestros
Técnica:
Comentario adicional: Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DEPORGEN		T. genetico predisposicion rendimiento deportivo		
Prueba	NUTRIGEN		T. genetico nutricion y metabolismo		
Prueba	ANCESTROS		T. genetico origen ancestros		

Código: BIENESTAR
Descripción: Deporte+Nutrigenetica+Piel +Ancestros
Técnica:
Comentario adicional: Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra.Muestra de sangre en EDTA BM

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DEPORGEN		T. genetico predisposicion rendimiento deportivo		
Prueba	NUTRIGEN		T. genetico nutricion y metabolismo		
Prueba	DERMAGEN		T. genetico tratamiento facial y cosmetico		
Prueba	ANCESTROS		T. genetico origen ancestros		

Descripción: DERMATÁN HEPARÁN QUERATÁN CUANTIFICADOS ORINA
Código: DERMATAN
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL orina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.INDISPENSABLE enviar historia clínica
Valores de referencia:

Descripción: Desalquilflurazepam en suero
Código: DESFLURAZE
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero. Refrigerado.
Alternativamente 1 mL plasma EDTA TRIPOTÁSICO.
Valores de referencia: (10 - 150) Rango Terapéutico

Descripción:	DESMOGLEINA-1 (Dsg-1) AC. SUERO
Código:	DESMOGL1
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	DESMOGLEINA-3 (Dsg-3) AC. SUERO
Código:	DESMOGL3
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	Desoxicorticosterona a los 30 minutos
Código:	DESOXI30
Técnica:	Radioinmunoanálisis
Unidades:	ng/dL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero 30 minutos
Comentario adicional:	2 mL suero.
Valores de referencia:	

Descripción:	Desoxicorticosterona a los 60 minutos
Código:	DESOXI60
Técnica:	
Unidades:	ng/dL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero 60 Minutos
Comentario adicional:	2 mL suero.
Valores de referencia:	

Descripción:	Desoxicorticosterona en suero
Código:	DESOXICOR
Técnica:	Radioinmunoanálisis
Unidades:	ng/dL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero

Descripción: Desoxicorticosterona en suero

Valores de referencia:
(3.99 - 16.96) > 12 años
(6.99 - 51.91) Hombre < 1 año
(4.29 - 15.97) Hombre 1 año - 6 años
(1.99 - 12.97) Hombre 6 años - 12 años
(6.99 - 59.6) Mujer < 1 año
(3.99 - 48.92) Mujer 1 año - 6 años
(5.99 - 33.9) Mujer 6 años - 12 años
(Inf. 90.0) Tras ACTH

Descripción: Detección por PCR de 7 patógenos de transmisión sexual

Código: ETS7_PCR

Técnica: Real-time PCR

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Muestras de zona genital: torundas secas, tejido, orina y semen.

Valores de referencia:

Descripción: Detección por PCR de 8 patógenos de transmisión sexual

Código: ETS8_PCR

Técnica:

Unidades:

Plazo:

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Muestras de zona genital: torundas secas
Orina.
Tejido.

Valores de referencia:

Descripción: Determinación temprana del sexo fetal en sangre materna

Código: DETESEX

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Citrato especial (Sangre total)

Comentario adicional: 2 Tubos de citrato exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y dar a Citogenética. Anotar semanas de gestación.Traer consentimiento y hoja de datos.Pinchar de lunes a miércoles (antes de jueves mañana en

OJO: tener en cuenta los festivos.

Valores de referencia:

Descripción: DEXAMETASONA SUERO

Código: DEXAMETA

Técnica: Cromatografía Líquida de Alta Resolución

Unidades: ng/mL

Plazo: 17 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 2 mL suero

Valores de referencia: (5.0 - 50.0)

Descripción: Diabetes insípida nefrogénica ligada X. Sec Gen: AVPR2

Código: GEN_000232

Técnica:

Descripción: Diabetes insípida nefrogénica ligada X. Sec Gen: AVPR2
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes insípida nefrogénica. Panel
Código: GEN_000233
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes insípida. Sec Gen: AVP
Código: GEN_000231
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes Mellitus neonatal permanente (PNDM). Panel
Código: GEN_000234
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes Mellitus neonatal transitoria (TNDM). Panel
Código: GEN_000235
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY. Panel
Código: GEN_000236
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Diabetes MODY. Panel
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY1 a 6: >10 genes (NGS)
Código: MODY_1_6
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY1: gen HNF4A (NGS)
Código: MODY1_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY2: gen GCK (NGS)
Código: MODY2_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY3: gen HNF1A (NGS)
Código: MODY3_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY4: gen PDX1 (NGS)
Código: MODY4_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Descripción: Diabetes MODY4: gen PDX1 (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY5: TCF2 (NGS)
Código: MODY5_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY6: gen NEUROD1 (NGS)
Código: MODY6_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: DIAGNOST
Código: DIAGNOST1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: DAO
Descripción: DIAMINOOXIDASA
Técnica: Téc. Radioinmunoensayo (REA-3H)
Comentario adicional: 1 ml suero congelado

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DAO2.EXT		DAO 2	U/mL	(3.74 - 12.54) Moderada capacidad de degradacion de histamina (40-80 HDU) (Sup. 12.54) Alta capacidad de degradación de histamina (>80 HDU)

Descripción: Diarrea congénita por cloreto. Sec Gen: SLC26A3
Código: GEN_000237
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Diarrea congénita por cloreto. Sec Gen: SLC26A3
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: DIAZE
Descripción: DIAZEPAM (DIAZEPAM+NORDIAZEPAM) EN SUERO
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DIAZEPAM		PERFIL DIAZEPAM (DIAZEPAM)	mcg/mL	
Prueba	NORDIAZEPA		PERFIL DIAZEPAM (NORDIAZEPAM)	mcg/mL	
Prueba	DIAZESUMA		PERFIL DIAZEPAM (DIAZEPAM TOTAL)	mcg/mL	(0.20 - 2.50) Valores terapéuticos indicativos

---

Descripción: DIBUCAINA NUMERO SUERO
Código: DIBUCA
Técnica: Cinética
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Sup. 70)

Descripción: DIFTERIA AC IGG
Código: DIFTERIA
Técnica: Técnica EIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.01) Sin protección
(0.01 - 0.09) Protección no efectiva
(0.1 - 0.99) Protección efectiva
(Sup. 1) Protección efectiva larga duración

Descripción: DIGESTION DE PRINCIPIOS INMEDIATOS (HECES)
Código: DIGES
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Heces Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: DIGOXINA
Código: DIGO
Técnica: Inmunoensayo

Descripción: DIGOXINA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.8 - 2.2) Rango Terapéutico

Descripción: DIHIDROSTESTOSTERONA A 20 MINUTOS
Código: DIHIDROT20
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero 20 minutos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: DIHIDROTESTOSTERONA SUERO
Código: DIHIDROTES
Técnica: EIA
Unidades: ng/ml
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3mL de suero refrigerado.
Alternativa: Plasma de Heparina o citrato
Valores de referencia: (0.18 - 1.20) Hombre
(0.08 - 0.54) Mujer Premenopausia
(0.03 - 0.28) Mujer Postmenopausia

Descripción: DIMERO D PLASMA
Código: DIMEROD
Técnica: INMUNOTURBIDIMETRIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL plasma
Valores de referencia: (Inf. 500)

Descripción: Dis. ectodérmica anhidrótica,inmunodef. Osteopetrosis. IKBKG
Código: GEN_000258
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: DISBIOSIS INTESTINAL EN HECES (KyberKompakt)
Código: DISBIOSISH
Técnica:
Unidades:

Descripción: DISBIOSIS INTESTINAL EN HECES (KyberKompakt)
Plazo: 16 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: Heces recogidas en bote estéril.No congelar.
De lunes a martes fuera de Madrid.
De lunes a miercoles en Madrid.
Imprescindible rellenar formulario de microbiota intestinal
Valores de referencia:

Descripción: DISBIOSIS INTESTINAL ORINA (METABOLITOS ORGANICOS EN ORINA)
Código: DISBIOSIS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: Orina bote especial (PEDIR KIT ESPECIAL AL ALMACEN)
Recoger la primera orina de la mañana (preferentemente en ayunas) en un recipiente limpio.
Llenar el frasco con tapón amarillo con una parte de la orina obtenida. (El frasco contiene un conservante. Mantenerlo fuera del alcance de los niños)
Cerrar herméticamente el frasco e introducirlo en la bolsa de plástico adjunta y guardarlo en nevera hasta el envío.
Valores de referencia:

Descripción: Discapacidad intelectual con alfa-talasemia lig X. Gen ATRX
Código: GEN_000239
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Discinesia ciliar primaria. Kartagener, Sd. Panel
Código: GEN_000238
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Discinesia paroxística cinesiogénica fam: gen PRRT2 (NGS)
Código: PRRT2
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Discinesia paroxística. Panel
Código: GEN_000241

Descripción: Discinesia paroxística. Panel
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disfunción del metabolismo del surfactante pulmonar. Panel
Código: GEN_000242
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disgenesia gonadal completa 46,XY. Sec Gen: SRY
Código: GEN_000243
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disgenesia reticular. Sec Gen: AK2
Código: GEN_000245
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disgenesia, respuesta ovárica estimulac FSH. Gen: FSHR
Código: GEN_000244
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Dishormonogénesis tiroidea familiar 2A. Sec Gen: TPO
Código: GEN_000246
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Dishormonogénesis tiroidea familiar 2A. Sec Gen: TPO
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disostosis acrofacial de Weyers. Panel
Código: GEN_000247
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disostosis acrofacial, tipo Weyers. Sec Gen: EVC
Código: GEN_000248
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disostosis espondilocostal autosómico recesiva. Panel
Código: GEN_000249
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia acromesomélica Maroteaux. Sec Gen: NPR2
Código: GEN_000250
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia arritmogénica ventrículo derecho.: >10 genes (NGS)
Código: DAVD
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Displasia campomélica. Sec Gen: SOX9
Código: GEN_000251
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia cleidocraneal. Sec Gen: RUNX2
Código: GEN_000252
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia cráneo -metafisaria AD. Sec Gen: SOST
Código: GEN_000254
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia cráneo -metafisariaAD. Sec Gen: ANKH
Código: GEN_000253
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia craneofrontonasal. Sec Gen: EFNB1
Código: GEN_000692
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia de Schneckenbecken. Sec Gen: SLC35D1
Código: GEN_000255
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Displasia de Schneckenbecken. Sec Gen: SLC35D1
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia diastrófica. Sec Gen: SLC26A2
Código: GEN_000256
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectoderm. anhidrótica Inmunodefi celula T. NFKBIA
Código: GEN_000257
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hidrótica tipo 2. Sec Gen: GJB6.
Código: GEN_000260
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hidrótica2: gen GJB6 (sec. Sanger)
Código: EDA2_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al X. Gen: EDA
Código: GEN_000261
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hipohidrótica. Panel
Código: GEN_000262
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica. Panel
Código: GEN_000263
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia epifisaria múltiple: gen COMP (NGS)
Código: COMP
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Displasia epifiseal múltiple. Panel
Código: GEN_000264
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia epifisiaria-falángica forma de ángel. Gen: GDF5
Código: GEN_000265
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia espondiloepifisaria tardía cr. X. Gen: TRAPPC2
Código: GEN_000266
Técnica:
Unidades:

Descripción: Displasia espondiloepifisaria tardía cr. X. Gen: TRAPPC2
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia espondiloepimetafisaria anauxética. Gen: RMRP
Código: GEN_000267
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia esquelét platiespondilítica letal,Torrance. COL2A1
Código: GEN_000269
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia esquelética de Eiken. Sec Gen: PTH1R
Código: GEN_000268
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia esquelética. Sec Gen: CHST3
Código: GEN_000270
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia inmuno ósea de Schimke. Sec Gen: SMARCAL1
Código: GEN_000271
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia mandibuloacral con lipoDistr. tip A (MADA). Panel
Código: GEN_000272
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia oculodentodigital. Sec Gen: GJA1
Código: GEN_000273
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ósea esclerosante. Sec Gen: SOST
Código: GEN_000274
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia osteoglofónica. Sec Gen: FGFR1
Código: GEN_000275
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia septo-óptica. Sec Gen: HESX1
Código: GEN_000276
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ventricular arritmogénica aislada derecho. JUP
Código: GEN_000277
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Displasia ventricular arritmogénica aislada derecho. JUP
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ventricular arritmogénica aislada derecho: TGFB3
Código: GEN_000278
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasias esqueléticas: >10 genes
Código: DISPLA_ESQ
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disqueratosis congénita AD tipo 1. Sec Gen: TERC
Código: GEN_000279
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disqueratosis congénita XL - Zinsser-Cole-Engman. Gen: DKC1
Código: GEN_000280
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disqueratosis congénita. Panel
Código: GEN_000281
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: DISTOMATOSIS AC. SUERO (FASCIOLA HEPATICA)
Código: FASCIOLAAC
Técnica: Hemaglutinación
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero refrigerado,
Alternativo: 1mL plasma de EDTA
Valores de referencia: =<1/160 Negativo
=1/160 - 1/320 Indeterminado
=> 1/320 Positivo

Descripción: Distonía de torsión DYT1: gen TOR1A (NGS)
Código: DYT1_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distonía de torsión DYT5: gen GCH1 (NGS)
Código: DYT5_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distonía de torsión DYT6: gen THAP1 (NGS)
Código: DYT6_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distonía hereditaria sensible a L-dopa secundaria. GCH1
Código: GEN_000282
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía mioclónica DYT11: gen SGCE (NGS)
Código: DYT11_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distonía mioclónica. Panel
Código: GEN_000283
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía primaria mioclónica. Sec Gen: DRD2
Código: GEN_000284
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía. Panel
Código: GEN_000288
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía-parkinsonismo hipermanganesemia. Gen: SLC30A10
Código: GEN_000285
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía-parkinsonismo inicio rápido. Sec Gen: ATP1A3
Código: GEN_000286
Técnica:
Unidades:

Descripción: Distonía-parkinsonismo inicio rápido. Sec Gen: ATP1A3
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía-parkinsonismo ligado al X. Sec Gen: TAF1
Código: GEN_000287
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. corneal congénita del estroma. Sec Gen: DCN
Código: GEN_000289
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. corneoretinal cristalina Bietti. Sec Gen: CYP4V2
Código: GEN_000292
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. coroidea areolar central tip 2. Sec Gen: PRPH2
Código: GEN_000293
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. facioescapulohumeral tipo 2. Sec Gen: SMCHD1
Código: GEN_000297
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. macular viteliforme de Best. Sec Gen: BEST1
Código: GEN_000299
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. muscular congénita Fukuyama. Sec Gen: FKTN
Código: GEN_000303
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. Sorsby fondo de ojo, pseudoinflamatoria. Gen: TIMP3
Código: GEN_000740
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrof. musc. Emery-Dreiffuss: genes EMD, FHL1 y LMNA (NGS)
Código: EMERY_DREI
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrof. muscular Emery-Dreifuss 1 ligada al X. Gen: EMD
Código: GEN_000307
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrof. muscular Emery-Dreifuss 6 ligada al X. Gen: FHL1
Código: GEN_000308
Técnica:
Unidades:

Descripción: Distrof. muscular Emery-Dreifuss 6 ligada al X. Gen: FHL1
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia corneal de Meesman: gen KRT12 (NGS)
Código: DISTRO_COR
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia corneal. Panel
Código: GEN_000290
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia corneana, microquística. Sec Gen: TGFBI
Código: GEN_000291
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia de conos y bastones. Sec Gen: AIPL1
Código: GEN_000294
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia de conos y bastones: >10 genes (NGS)
Código: DIS_CONBAS
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Distrofia de conos y bastones: >10 genes (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia de retina de Bothnia. Sec Gen: RLBP1
Código: GEN_000295
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia facio-escápulo-humeral
Código: DISTROFFEH
Técnica: PCR y Southern blotting
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: 10 mL sangre total EDTA. INDISPENSABLE enviar información clínica y antecedentes familiares.

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular corneal. Sec Gen: CHST6
Código: GEN_000298
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular juvenil de retina: gen ABCA4 (NGS)
Código: STARGARDT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular pseudovitel.: genes BEST1 y PRPH 2 (NGS)
Código: DIST_VITEL
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Distrofia macular pseudovitel.: genes BEST1 y PRPH 2 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular y/o de retina. Sec Gen: SIX6
Código: GEN_000300
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular. Panel
Código: GEN_000302
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular. Sec Gen: PRPH2
Código: GEN_000301
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia miotónica 1 (Steinert): gen DMPK secuencia (CTG)n
Código: DISTROFIAM
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia miotónica 2: gen CNBP secuencia (CCTG)n
Código: DISTROFI_2
Técnica: PCR y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.

Descripción: Distrofia miotónica 2: gen CNBP secuencia (CCTG)n
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia musc. oculofaríngea: gen PABPN1 secuencia (GCN)
Código: PABPN1_GCN
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular congénita tipo 1C. Sec Gen: FKRP
Código: GEN_000305
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular congénita. Sec Gen: LAMA2
Código: GEN_000304
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cintura 1B/CMT2B1: gen LMNA (NGS)
Código: LMNA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cinturas 2A: gen CAPN3 (NGS)
Código: CAPN3_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cinturas 2B: gen DYSF (NGS)
Código: DYSF
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cinturas: >10 genes (NGS)
Código: D_CINTURAS
Técnica: NGS con TSO Illumin
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de Duchenne-Becker. Sec Gen: DMD
Código: GEN_000306
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular Duchenne/Becker: del. y dup. gen DMD
Código: DUCHENNE
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular espinal tipo 1. Sec Gen: SEPN1
Código: GEN_000309
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular. Panel
Código: GEN_000310

Descripción: Distrofia muscular. Panel
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia retiniana. Panel
Código: GEN_000311
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia torácica asfixiante tipo 2. Sec Gen: IFT80
Código: GEN_000312
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: DIURETICOS EN ORINA
Código: DIURETICOS
Técnica: Cromatografía Líquida / Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml orina.Micción aislada.
Esta determinación detecta la presencia HIDROCLOROTIAZIDA, ACETETAZOLAMIDA, CLORTALIDONA, FUROSEMIDA, TRIAMTERENO, XIPAMIDA, INDAPAMIDA, TORASEMIDA,Y ESPIRONOLACTO
Valores de referencia:

Descripción: DMACRO
Código: DMACRO1
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: DMICRO
Código: DMICRO1
Técnica:
Unidades:
Plazo:

Descripción: DMICRO
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: DNA ASCARIS LUMBRICOIDES
Código: DNAASCARIS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Muestra: heces, orina...muestras focalizadas al punto de infección.
Valores de referencia:

Descripción: DNA libre circulante gen PIK3CA (E542K, E545K/Q, H1047R/L)
Código: CFDNA_PIK3
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 2 TUBOS STRECK
Rotular con ONCO
Tubo alternativo:2 tubos sangre EDTA
Valores de referencia:

Descripción: DNA NATIVO AC. (n-DNA)
Código: NDNAAC
Técnica: EIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 14.9) Negativo
(15 - 29.9) Indeterminado

Descripción: DNA NATIVO AC. (n-DNA) EN LCR
Código: NDNAACLCR
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 20)

Descripción: DNASA B anticuerpos en suero
Código: DNASABAC
Técnica: Nefelometría
Unidades: U/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: DNASA B anticuerpos en suero
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (Inf. 300) < 14 años
(Inf. 200) > 14 años

Descripción: DNP ANTICUERPOS (DESOXI-RIBONUCLEOPROTEÍNA)
Código: DNPAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Donnai-Barrow, Sd. Sec Gen: LRP2
Código: GEN_000313
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: DOPAMINA AC. ANTI RECEPTOR 2 (DR2) LCR
Código: DOPRACLCR
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (CELL BINDING ASSAY)
Unidades:
Plazo: 46 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia:

Descripción: DOPAMINA AC. ANTI RECEPTOR 2 (DR2) SUERO
Código: DOPRACSUE
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (CELL BINDING ASSAY)
Unidades:
Plazo: 46 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL SUERO (alt. Plasma CONGELADO)
Valores de referencia:

Código: DOXEPINA
Descripción: DOXEPINA (doxepina + desmetildoxepina), Suero
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional: 2 mL

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SUMADOX		(doxepina+desmetildoxepina)	ng/mL	
Prueba	DOXEPIN		Perfil Doxepina	ng/mL	

Componentes					
Prueba	DESDOXE		Perfil desmetildoxepina	ng/mL	

Descripción:	DPPX AC. (Dipeptidil Aminopeptidasa like Protein-6) SUERO
Código:	DPPXAC
Técnica:	INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:	Titulo
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero.
Valores de referencia:	= > 1:10 Niveles significativos

Descripción:	DPYD*2A (toxicidad a FU)
Código:	DPYD_2A
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Valores de referencia:	

Descripción:	Duane-Radial Ray, Sd. Sec Gen: SALL4
Código:	GEN_000314
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Duloxetina en suero
Código:	DULOXETINA
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.
Unidades:	µg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL Suero (Congelado)
Valores de referencia:	(30 - 120)

Descripción:	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS AC. IGE
Código:	ECHINOCIGE
Técnica:	Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	= Título < 1:100 Negativo = Título > o = 1:100 Positivo

Descripción:	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS AC. IGG
Código:	ECHINOCIGG
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Indice
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Negativo (0.80 - 1.09) Indeterminado (Sup. 1.10) Positivo

Descripción:	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS AC.TOTALES SUERO (HIDATIDOSIS)
Código:	HIDATIAC
Técnica:	CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.91 - 1.09) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	ECHINOCOCCUS spp IGG INMUNOBLOT
Código:	ECHINOBLOT
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	ECHOVIRUS AC. IgG EN LCR
Código:	ECHOVIIGGL
Técnica:	Tec. EIA
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	ECHOVIRUS AC. IGG EN SUERO
Código:	ECHOVIIGG
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	= Negativo <1/80 = Positivo > o = 1/80

Descripción: ECHOVIRUS AC. IgM EN LCR
Código: ECHOVIIGML
Técnica: Tec. EIA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: ECHOVIRUS AC. IGM EN SUERO
Código: ECHOVIIGM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo <1/20
= Positivo > o igual 1/20

Descripción: EDAD BIOLOGICA Y LONGEVIDAD
Código: EBLONGEVID
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: Ehlers-Danlos clásico: genes COL1A,1 COL5A1 y COL5A2 (NGS)
Código: EHLERSD1_2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Ehlers-Danlos hipermóvil: genes TNXB y COL3A1 (NGS)
Código: EHLERHIPER
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ehlers-Danlos tipo IV: gen COL5A1 (NGS)
Código: EHLERSD_5A

Descripción: Ehlers-Danlos tipo IV: gen COL5A1 (NGS)
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Ehlers-Danlos: >10 genes (NGS)
Código: EHLERSDTOT
Técnica: NGS con TSOE Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ehrlichia chaffeensis Ac. IgG
Código: EHRCHAACG
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: = Negativo < 1:64
= Positivo >1:64

Descripción: Ehrlichia chaffeensis Ac. IgM
Código: EHRCHAACM
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de Suero Refrigerado
Valores de referencia: = Negativo <1/64
= Positivo > 1/64

Descripción: EJ AC. SUERO
Código: EJAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: ELASTASA ANTICUERPOS.
Código: ELASTASAAC

Descripción: ELASTASA ANTICUERPOS.
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.99) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: ELASTASA PANCREATICA HECES
Código: ELASTASAHE
Técnica: CLIA
Unidades: mcg/gheces
Plazo: 5 días
Tubo: Heces No Microbiología
Comentario adicional: HECES REFRIGERADO.
No requiere que los pacientes ingieran una dieta especial o interrumpan la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas.
Valores de referencia: (Sup. 200) :Normal
(100 - 200) :Insuficiencia pancreática exocrina leva a moderada
(Inf. 100) :Insuficiencia pancreática exocrina severa

Descripción: ELASTASA PLASMA EDTA
Código: ELASTASAPL
Técnica: Inmunológica
Unidades: mcg/L
Plazo: 14 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL de plasma de EDTA. Se debe efectuar la separación del plasma lo antes posible, como máximo 2 h después de la extracción
Valores de referencia: (Inf. 64.9)

Código: ELP
Descripción: ELECTROFORESIS DE PROTEINAS SU
Técnica: Electroforesis
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ALB_P		ALBUMINA, PROTEINOGRAMA	%	(50 - 68)
Prueba	ALFA1		ALFA-1-GLOBULINAS	%	(1.4 - 4)
Prueba	ALFA2		ALFA-2-GLOBULINAS	%	(7 - 14)
Prueba	BETA		BETA GLOBULINAS	%	(8.7 - 13.9)
Prueba	GAMMA		GAMMA GLOBULINAS	%	(10.4 - 19.8)
Prueba	A_G		COCIENTE ALBUMINA/GLOBULINA		(1.1 - 2.1)
Prueba	SUMA2		SUMA PROTEINOGRAMA		(98 - 101)
Prueba	PT		PROTEINAS TOTALES SUERO	g/dL	(6 - 8.3)
Prueba	NOTAPROT		NOTA PROTEINOGRAMA		
Prueba	GRAFICO		Grafico Proteinograma		

Código: ELPLCR
Descripción: ELECTROFORESIS EN LCR
Técnica: Electroforesis
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LPT		PROTEINAS TOTALES EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	mg/dL	(15 - 45)
Prueba	LPREALB		PREALBUMINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(3 - 7)
Prueba	LALB		ALBUMINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(50 - 70)
Prueba	LALFA1		ALFA 1 GLOBULINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(3 - 7)
Prueba	LALFA2		ALFA 2 GLOBULINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(4 - 8)
Prueba	LBETA		BETA GLOBULINA EN LIQUIDO CELAFORRAQUIDEO	%	(8 - 12)
Prueba	LTAU		TAU GLOBULINA LCR (perfil electroforesis)	%	(3 - 8)
Prueba	LGAMMA		GAMMA GLOBULINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(3 - 10)
Prueba	LIQPTEL		PROTEINAS TOTALES (ELECTROFORESIS) EN LCR		

Descripción: Eliptocitosis: genes EPB41, SPTA1, SPTB y SLC4A1 (NGS)
Código: ELIPTOCITO
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: EMA (EOSIN 5 MALEIMIDE) RELACIONADO CON ESFEROCITOSIS HEREDI
Código: EMA
Técnica: citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA. 2 extensiones de sangre reciente sin teñir.IMPRESCINDIBLE: Adjuntar historia clínica y día de la extracción
Valores de referencia: (Sup. 0.86) Valores del test EMA inferiores a 0.86 se asocian a esferocitosis hereditaria

---

Descripción: ENA (ANTIGENOS NUCLEARES EXTRAIBLES) AC. SUERO
Código: ENA
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía atípica por glicina. Sec Gen: AMT
Código: GEN_000315
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía epiléptica infantil temprana. Panel NGS
Código: GEN_000316
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía epiléptica infantil. Panel Ampliado NGS
Código: GEN_000317
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía epiléptica precoz infantil. Sec Gen: ARX
Código: GEN_000318
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía epiléptica temprana: gen CDKL5 (NGS)
Código: CDKL5
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía infantil por glicina. Sec Gen: GCSH
Código: GEN_000319
Técnica:
Unidades:

Descripción: Encefalopatía infantil por glicina. Sec Gen: GCSH
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía neonatal grave. Sec Gen: MECP2
Código: GEN_000320
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía por glicina. Panel NGS
Código: GEN_000321
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ENDOMISIO AC. IGA
Código: ENDOMIACA
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo < 1/10
= Positivo >1/10

Descripción: ENDOMISIO AC. IGG
Código: ENDOMIACG
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo <1/10
= Positivo >1/10

Descripción: Enf, Alzheimer 3 y 6: gen PSEN1 (NGS)
Código: ALZH_PSEN1
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Enf, Alzheimer 3 y 6: gen PSEN1 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enf. Alzheimer 1: gen APP (NGS)
Código: ALZH_APP
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enf. Alzheimer 4: gen PSEN2 (NGS)
Código: ALZH_PSEN2
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enf. cerebral peq. vasos hemorragia. Sec Gen: COL4A1
Código: GEN_000322
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enf. de Gilbert: gen UGT1A1 (TA)n promotor (sec. Sanger)
Código: GILBERTGEN
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enf. de Pompe: gen GAA (NGS)
Código: GAA_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Enf. de Pompe: gen GAA (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enf. Osler-Weber-Rendu: genes ENG, ACVRL1, SMAD4, GDF2 (NGS)
Código: HHT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enf. Parkinson de aparición temprana (PDEO): <10 genes (NGS)
Código: PARKINS_EO
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enf. por cuerpos poliglucosanos adulto. Sec Gen: GBE1
Código: GEN_000339
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enferm. veno-oclusiva hepática inmunodeficiencia. Gen: SP110
Código: GEN_000341
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad celiaca: haplotipos HLADQ2 y HLADQ8
Código: HLACELIACA
Técnica: PCR e hibridación con sondas
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Enfermedad celiaca: haplotipos HLADQ2 y HLADQ8
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas:Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Alzheimer: <10 genes (NGS)
Código: ALZHEIMER
Técnica: NGS con TSOE y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sec Gen: PRNP
Código: GEN_000326
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Devic: gen AQP4 (NGS)
Código: DEVIC
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Fabry, Alfa Galactosidasa A, sangre seca
Código: GALACTSECA
Técnica: Fluorimetrica
Unidades: mcmol/Lxhora
Plazo: 32 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Sangre seca recogida en papel de filtro especial. Pedir instrucciones. Indispensable informe clinico y antecedentes familiares
Valores de referencia: (4.7 - 18.8)

Descripción: Enfermedad de Fabry, biomarcador Lyso-Gb3, plamsa
Código: FABRYLYSO
Técnica: MS/MS
Unidades: nmol/L
Plazo: 35 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado

Descripción: Enfermedad de Fabry, biomarcador Lyso-Gb3, plamsa
Comentario adicional: 3 mL Plasma EDTA (1 alícuota específica para este análisis). Centrifugar y congelar rápidamente. Enviar de LUNES A MIERCOLES.
Es necesario rellenar documento con información clínica del paciente (solicitar al laboratorio)
Valores de referencia: (Inf. 0.5)

Descripción: Enfermedad de Fabry: gen GLA (NGS)
Código: FABRY
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Gaucher: gen GBA (NGS)
Código: GAUCHERDNA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Hirschsprung. Sec Gen: RET
Código: GEN_000329
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Huntington: gen HTT secuencia (CAG)n
Código: HUNTINGTON
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Panel
Código: GEN_000330
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Panel
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Menkes: gen ATP7A (NGS)
Código: MENKES_MUT
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de multiminicore. Panel
Código: GEN_000332
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de músculo-ojo-cerebro. Sec Gen: POMGNT1
Código: GEN_000333
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Norrie: gen NDP (NGS)
Código: NORRIE
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson 1: gen SNCA (NGS)
Código: PARKINSON1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.

Descripción: Enfermedad de Parkinson 1: gen SNCA (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson 2: gen PARK2 (NGS)
Código: PARKINSON2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson 8: gen LRRK2 (NGS)
Código: PARKINSON8
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson AD: genes SNCA, LRRK2 y VPS35 (NGS)
Código: PARKINS_AD
Técnica: Secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson AR: <10 genes (NGS)
Código: PARKINS_AR
Técnica: Secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson: >10 genes (NGS)
Código: PARKINSON
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Descripción: Enfermedad de Parkinson: >10 genes (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Tay Sachs: gen HEXA (NGS)
Código: TAY_SACHS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Von Hippel-Lindau: gen VHL (NGS)
Código: VHL_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Wilson: gen ATP7B (NGS)
Código: WILSON
Técnica: PCR, Secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad del núcleo central. Sec Gen: RYR1
Código: GEN_000334
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad granulomatosa crónica. Panel NGS
Código: GEN_000335
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad granulomatosa crónica: gen CYBB (NGS)
Código: CYBB
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad hepática poliquística. Sec Gen: PRKCSH
Código: GEN_000336
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Panel NGS
Código: GEN_000337
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad medular quística renal: genes UMOD y MUC1 (NGS)
Código: UROMO_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad renal poliquística AD. Sec Gen: PKD1
Código: GEN_000340
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad renal quística medular 2AD. Sec Gen: UMOD
Código: GEN_000568
Técnica:

Descripción: Enfermedad renal quística medular 2AD. Sec Gen: UMOD
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad von Willebrand: gen VWF (NGS)
Código: WILLEB_SEC
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades autoinflamatorias. Panel
Código: GEN_000342
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades lisosomales. Panel NGS
Código: GEN_000343
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades mitocondriales. Panel NGS
Código: GEN_000344
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades priónicas: gen PRNP (NGS)
Código: PRION_ENF
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular

Descripción: Enfermedades priónicas: gen PRNP (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato y muestra de tejido.
Valores de referencia:

Descripción: ENOLASA ALFA AC. SUERO
Código: ENOLASAAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL SUERO.
Valores de referencia: (Sup. 1.00) POSITIVO

Descripción: ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA SUERO
Código: NSE
Técnica: Electroquimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Evitar muestra de Plasma.
La hemólisis interfiere esta determinación. Se recomienda centrifugar la muestra en menos de 1 hora
Valores de referencia: (Inf. 16.3)

Descripción: ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA LCR
Código: NSELCR
Técnica: Enzimoinmunoanalisis
Unidades: ng/ml
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml. Evitar la hemolisis
Valores de referencia: (Inf. 16.3)

Descripción: ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA LIQ.PLEURAL
Código: NSEPLEURAL
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml de Líquido Pleural.
Valores de referencia: = Valores inferiores a 13.0 ng/ml son compatibles con Pleuritis benignas

---

Descripción: ENTAMOEBA HISTOLYTICA MUESTRA PCR
Código: ENTAMOEPCR
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Heces frescas. suero y heces congeladas

Descripción: ENTAMOEBA HISTOLYTICA MUESTRA PCR
Valores de referencia:

Descripción: ENTAMOEBA HISTOLYTICA AC (AMEBIASIS)
Código: AMEBAAC
Técnica: Hemaglutinación
Unidades: Titulo
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
= Negativo: <1/80
= Indeterminado: titulos entre 1/80 y 1/160
= Valores significativos : = o > 1/320

Descripción: ENTAMOEBA HISTOLYTICA AC. Ig M (AMEBIASIS)
Código: AMEBAACM
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: = Negativo <1/10

Descripción: ENTEROBACTERIAS PORTADORAS DE CARBAPENEMASAS
Código: EPC
Técnica: Cultivo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ENTEROCITOS (ANTI YEYUNO) AC. IgA SUERO
Código: ENTEROAC
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta.
Unidades:
Plazo: 47 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: =1:10

Descripción: ENTEROVIRUS ANTICUERPOS IgG SUERO
Código: ENTEROIGG
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero

Descripción:	ENTEROVIRUS ANTICUERPOS IgG SUERO
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Negativo (0.80 - 1.09) Indeterminado (Sup. 1.10) Positivo

Descripción:	ENTEROVIRUS ANTICUERPOS IgM SUERO
Código:	ENTEROIGM
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL suero refrigerado
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Negativo (0.80 - 1.09) Indeterminado (Sup. 1.10) Positivo

Descripción:	ENTEROVIRUS EN HECES
Código:	ENTEROVHEC
Técnica:	INMUNOCROMATOGRAFÍA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	Heces.
Valores de referencia:	=NEGATIVO

Descripción:	Enterovirus RNA RT-PCR Cualitativa
Código:	ENTEROVIRU
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Muestras: suero, plasma, heces, LCR, etc.
Valores de referencia:	

Descripción:	ENVOPLAQUINA ANTICUERPOS SUERO
Código:	ENVOPLAQ
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Sup. 1) Positivo

Descripción:	ENZIMA CONVERTIDOR ANGIOTENSINA EN LCR
Código:	ECALCR
Técnica:	Cinética
Unidades:	U/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR. Se recomienda efectuar análisis simultáneo en suero y LCR

Descripción: ENZIMA CONVERTIDOR ANGIOTENSINA EN LCR
Valores de referencia: (Inf. 6.0)

Descripción: ENZIMA CONVERTIDOR DE LA ANGIOTENSINA SUERO (ECA)
Código: ECA
Técnica: Cinética
Unidades: U/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero. El plasma de EDTA interfiere en esta determinación
Valores de referencia:
(8 - 52) > 14 años
(5 - 83) < 3 años
(8 - 76) 3 años - 8 años
(6 - 89) 8 años - 14 años

Descripción: Enzima convertidora de angiotensina: polimorfirmos (Sanger)
Código: ECA_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Código: ENZLISOLEU
Descripción: ENZIMAS LISOSOMALES EN LEUCOCITOS
Técnica: Fluorimetría
Comentario adicional: 10 mL Sangre total (anticoagulante heparina). Refgigerada

Indispensable concertación previa si la preparación de leucocitos se ha de realizar en nuestro Centro. Si lo prefieren pueden enviar los leucocitos congelados en nieve carbónica preparados según se describe en el Anexo (Consultar comentario).

Se debe adjuntar un preparado de leucocitos control de un individuo no emparentado.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BGLUCURO		BETA-GLUCURONIDASA- Leucocitos	nmol/h/mg prot	(147 - 1148)
Prueba	PALMIPROTI		PALMITOIL PROTEÍNA TIOESTERASA- Leucocitos	nmol/h/mg prot	(12.7 - 26.0)
Prueba	TRIPEPT		TRIPEPTIDIL PEPTIDASA I - Leucocitos	nmol/h/mg prot	(173 - 318)
Prueba	COMENZLISO		COMENTARIO ENZIMAS LISOSOMALES LEUCOCITOS		

Descripción: EPIDERMIS AC. (ANTI MEMBRANA BASAL/ SUSTANCIA INTERCELULAR)
Código: EPIDERAC
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: EPIDERMIS AC. (ANTI MEMBRANA BASAL/ SUSTANCIA INTERCELULAR)
Valores de referencia: =Título < 1:20 NEGATIVO Título < 1:20

Descripción: Epidermolisis ampollosa simple, AR 1, Dowling-Meara. Panel
Código: GEN_000347
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa con atresia pilórica. Panel NGS
Código: GEN_000348
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa distrófica: gen COL7A1 (NGS)
Código: EPIDERMOLI
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa juntural estenosis pilóric. Gen: ITGA6
Código: GEN_000349
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa simple, AR, tipo1. Gen: KRT14
Código: GEN_000350
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa simple. Sec Gen: KRT5
Código: GEN_000351

Descripción: Epidermolisis bullosa simple. Sec Gen: KRT5
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa. Panel NGS
Código: GEN_000352
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia AD con afectación auditiva. Sec Gen: LGI1
Código: GEN_000353
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia con Displasia. Panel NGS
Código: GEN_000354
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia de ausencias juveniles 1. Sec Gen: EFHC1
Código: GEN_000355
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia dependiente de piridoxina. Sec Gen: ALDH7A1
Código: GEN_000358
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Epilepsia dependiente de piridoxina. Sec Gen: ALDH7A1
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia femenina retraso mental: gen PCDH19 (NGS)
Código: PCDH19
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia mioclónica progr. Lafora: secu. EPM2A y NHLRC1
Código: LAFORA_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia mioclónica progresiva. Panel NGS
Código: GEN_000356
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia nocturna dominante del lóbulo frontal. Panel NGS
Código: GEN_000357
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia relacionada con piridoxina. Panel NGS
Código: GEN_000359
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia Síndrome de Dravet: gen SCN1A (NGS)
Código: SCN1A
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia: >10 genes (NGS)
Código: EPILEPSIA
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: EPSTEIN BARR AC. VCA IGA
Código: EPSBARRACA
Técnica: inmunofluorescencia
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero refrigerado.
Valores de referencia: = Negativo <20
= Positivo >20

Descripción: EPSTEIN BARR AC. VCA IGG
Código: EPSBARRACG
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.74) Negativo
(0.75 - 0.99) Indeterminado
(Sup. 1.00) Positivo

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. EARLY ANTIGEN IGG
Código: EBEARLAC
Técnica: CLIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Alternativo 1 mL plasma de EDTA.
ALTERNATIVA: plasma citrato, plasma heparina
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. VCA IGG EN LCR
Código:	EPSBARGLC
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.Se recomienda efectuar análisis simultáneo en suero y LCR
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. VCA IGM EN LCR
Código:	EPSBARMLC
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR. Se recomienda efectuar análisis simultáneo en suero y LCR
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. VCA IGM
Código:	EPSBARRACM
Técnica:	CMIA
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.49) Negativo (0.50 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1.0) Positivo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. EARLY ANTIGEN IGA
Código:	EBEARLAIGA
Técnica:	Inmunofluorescencia
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero
Valores de referencia:	(Inf. 20) Negativo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. EARLY ANTIGEN IGM
Código:	EBEARLAIGM
Técnica:	Enzimoinmunoanalisis
Unidades:	Indice
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero. Alternativa Plasma (EDTA o Heparina)

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. EARLY ANTIGEN IGM
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.2) Indeterminado
(Sup. 1.2) Positivo

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. NUCLEAR ANTIGEN (EBNA) IGG
Código: EBNUCACG
Técnica: Quimioluminiscencia
Unidades: Índice
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero/PLasma EDTA
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.91 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.11) Positivo

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. NUCLEAR ANTIGEN (EBNA) IGM
Código: EBNUCACM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Alternativa: palsma de EDTA, citrato o heparina.
Valores de referencia: (Inf. 1.0) Negativo
(1.0 - 1.2) Indeterminado
(Sup. 1.2) Positivo

Descripción: Epstein-Barr DNA PCR Cualitativa
Código: DNAEPSBA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Muestras: suero, plasma, LCR, torunda seca, heces, orina, etc.
Valores de referencia:

Descripción: Epstein-Barr DNA PCR Cuantitativa
Código: EBVCUAN
Técnica: PCR cuantitativa
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Eritrocitosis. Sec Gen: EPOR
Código: GEN_000361
Técnica:
Unidades:

Descripción: Eritrocitosis. Sec Gen: EPOR
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Eritrodermia ictiosiforme congénita no bullosa. Panel NGS
Código: GEN_000362
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Eritromelalgia hereditaria. Sec Gen: SCN9A
Código: GEN_000363
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ERITROPOYETINA
Código: ERITROPO
Técnica: ICMA
Unidades: mU/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Evitar plasma de EDTA.
Valores de referencia: (4.3 - 29.0)

Descripción: ERITROPOYETINA ANTICUERPOS
Código: ERITROANTI
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (Sup. 1.00) Positivo

Descripción: Escherichia coli K1 PCR en LCR
Código: ECOLIK1PCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 1 ml de LCR, puede usarse tambien sangre total
Valores de referencia:

Descripción: Escitalopram en suero
Código: ESCITALO
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: (15 - 80)

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica 1 (ELA1): gen SOD1 (NGS)
Código: SOD1_MUT
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica fam. frontotemporal. C9orf72
Código: GEN_000365
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica familiar. Panel NGS
Código: GEN_000366
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica juvenil: gen ALS2 (NGS)
Código: ALS2
Técnica: NGS con TSOE Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica. Panel NGS
Código: GEN_000364
Técnica:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica. Panel NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica: expansión C9orf72
Código: C9ORF72
Técnica: PCR / TP-PCR
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis tuberosa. Sec Gen: TSC1
Código: GEN_000367
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis tuberosa. Sec Gen: TSC2
Código: GEN_000368
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis tuberosa: genes TSC1 y TSC2 (NGS)
Código: ESCLER_TUB
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 60 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: ESCOPOLAMINA EN ORINA
Código: ESCOPOLAMI
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días

Descripción: ESCOPOLAMINA EN ORINA
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional: 10 mL de orina
Valores de referencia:

Descripción: Esferocitosis hereditaria. Sec Gen: EPB42
Código: GEN_000370
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esferocitosis hereditaria. Sec Gen: SPTB
Código: GEN_000369
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esferocitosis: <10 genes (NGS)
Código: ESFER_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ESLICARBAZEPINA
Código: ESLICARBA
Técnica: Cromatografía Líquida - Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades: µg/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (10.0 - 35.0)

Descripción: ESPERMATOZOIDES ANTICUERPOS SUERO
Código: ESPERMAAC
Técnica: ELISA
Unidades: RU/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma (Refrigerado)

Descripción: ESPERMATOZOIDES ANTICUERPOS SUERO
Valores de referencia: (Inf. 55.00) Negativo

Código: SEMIN
Descripción: ESPERMIOGRAMA
Técnica:
Comentario adicional: Centros de fuera de Madrid, solo se realiza control postvasectomia

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COLOR		ESPERMIOGRAMA: COLOR		
Prueba	VISCOS		ESPERMIOGRAMA: VISCOSIDAD		
Prueba	VOLUM		ESPERMIOGRAMA: VOLUMEN	mL	
Prueba	PHESPER		ESPERMIOGRAMA: PH		
Prueba	NESPER		ESPERMIOGRAMA: NUMERO DE ESPERMATOZOIDES	millones/mL	
Prueba	NCELGER		ESPERMIOGRAMA: NUMERO CELULAS GERMINALES	Células germina	
Prueba	NLEUCO		ESPERMIOGRAMA: NUMERO DE LEUCOCITOS	Leucocitos/mL	
Prueba	NCELRED		CELULAS REDONDAS EN SEMEN	células redonda	
Prueba	MOTITOT		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD PROGRESIVA	%	
Prueba	MOTPRO		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD PROGRESIVA	%	
Prueba	MOTNOPRO		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD NO PROGRESIVA	%	
Prueba	INMOVI		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD: INMOVILES	%	
Prueba	MORNOR		ESPERMIOGRAMA: MORFOLOGIA NORMAL	%	
Prueba	MORANOR		ESPERMIOGRAMA: MORFOLOGIA ANORMALES	% morfologicame	
Prueba	CABEZA		ESPERMIOGRAMA: MALFOR. CABEZA	% malformacione	
Prueba	PINTERME		ESPERMIOGRAMA: MALFOR. P. INTERMEDIA	% malformacione	
Prueba	COLA		ESPERMIOGRAMA: MALFOR. COLA	% malformacione	
Prueba	POLINU		ESPERMIOGRAMA: POLINUCLEARES	% polinucleares	
Prueba	LINFOCI		ESPERMIOGRAMA: LINFOCITOS	%	
Prueba	ESPERTOTAL		ESPERMIOGRAMA: CANTIDAD TOTAL DE ESPERMATOZOIDES EN EYACULAD		
Prueba	OPACIDAD		ESPERMIOGRAMA: OPACIDAD		
Prueba	NOTASEMI		NOTA SEMINOGRAMA		

Descripción: Espondilolistesis Ehlers-Danlos. Sec Gen: SLC39A13
Código: GEN_000371
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esquizencefalia. Sec Gen: EMX2
Código: GEN_000372
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ESTAÑO EN ORINA
Código: ESTAÑO2
Técnica: ICP-MS. Hasta 29-05-2006 téc. AA/cámara de grafito
Unidades: mcg/g creatin.
Plazo: 17 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 50)

Descripción: ESTAÑO EN SANGRE
Código: ESTAÑO
Técnica: ICP-MS. Hasta 29-05-2006 AAS/cámara de grafito.
Unidades: mcg/L
Plazo: 11 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 ml sangre total (EDTA)
Valores de referencia: (Inf. 50) No exposición

Descripción: Estenosis supravalvular aórtica. Sec Gen: ELN
Código: GEN_000373
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ESTIRENO EN SANGRE TOTAL
Código: ESTIR
Técnica: Cromatografía de gases-Espectrometría de masas
Unidades: mg/L
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total al final de la jornada laboral
Valores de referencia: (Inf. 0.20) Final de jornada (exposición a ESTIRENO)

Descripción: ESTRADIOL
Código: E2
Técnica: Técnica CMIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días

Descripción: ESTRADIOL
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(Inf. 44) Hombre > 14 años
(24 - 251) Mujer > 14 años F. Folicular
(38 - 649) Mujer > 14 años Ovulación
(24 - 312) Mujer > 14 años F. Luteínica
(Inf. 28) Mujer > 14 años Post-menopausia sin tratamiento hormonal sustitutivo
(Inf. 144) Mujer > 14 años Post-menopausia con tratamiento hormonal sustitutivo

---

Descripción: Estriol libre (embarazo) en suero
Código: ESTRIOLLIB
Técnica: Inmunoquimioluminiscencia
Unidades: µg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
1ml suero (Refrigerar)
Alt. 1 mL Plasma(Refrigerar)
Valores de referencia:
(2.31 - 6.34) Mujer - 27 semanas gest.
(2.31 - 6.92) Mujer - 28 semanas gest.
(2.31 - 7.78) Mujer - 29 semanas gest.
(2.31 - 8.65) Mujer - 30 semanas gest.
(2.59 - 9.80) Mujer - 31 semanas gest.
(Sup. 2.88) Mujer - 32 semanas gest.
(Sup. 2.88) Mujer - 33 semanas gest.
(Sup. 3.17) Mujer - 34 semanas gest.
(Sup. 4.03) Mujer - 35 semanas gest.
(Sup. 4.61) Mujer - 36 semanas gest.
(Sup. 5.48) Mujer - 37 semanas gest.
(Sup. 6.63) Mujer - 38 semanas gest.
(Sup. 7.20) Mujer - 39 semanas gest.
(Sup. 7.49) - 40 semanas gest.

Descripción: ESTRIOL SUERO
Código: ESTRIOL
Técnica: EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Suero.
Alternativa: Plasma humano.
Valores de referencia:
(10 - 27) Embarazo 17 semanas
(27 - 53) 20 semanas
(28 - 75) 24 semanas
(38 - 127) 28 semanas
(46 - 175) 32 semanas
(74 - 210) 36 semanas
(60 - 325) 40 semanas

Descripción: ESTRONA SUERO
Código: ESTRONA
Técnica: EIA

Descripción: ESTRONA SUERO
Unidades: pg/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero. Refrigerado.

Alt. 1 mL Plasma EDTA Tripotásico, 1mL Plasma Heparina.
Valores de referencia: (15.6 - 77) Hombre
(15.5 - 220.2) Mujer Premenopausia
(11.0 - 54.5) Mujer Postmenopausia

Descripción: Estroncio en sangre
Código: SR
Técnica: Plasma acoplado inductivamente con detector de masas.
Unidades: µg/L
Plazo: 12 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 mL Sangre total EDTA Tripotásico (2-8 ºC - Refrigerar)
Alt. 5 mL Sangre total Heparina litio (2-8 ºC - Refrigerar)
Alt. 5 mL Sangre total Heparina sódica (2-8 ºC - Refrigerar)
Valores de referencia: (15.00 - 60.00)

Código: BLOQUEONCO
Descripción: Estudio bloque muestra parafinada ONCO/AP
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EXTRACCADN		Extraccion ADN en bloque tumoral parafinado		
Prueba	CUANTIFADN		Cuantificación ADN en bloque tumoral parafinado		
Prueba	MACRODISEC		AP: MACRODISECCION (MUESTRAS GENETICA)		
Prueba	ENRIQ_MUES		Enriqueciemiento de la muestra		
Prueba	PORCEN_ADN		Porcentaje ADN tumoral en bloque original		

Descripción: Estudio de cualquier gen por NGS
Código: SEC_UNGEN
Técnica: TP-PCR, y análisis de framgentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO DE E. COLI ENTEROHEMORRÁGICO
Código: ECEH
Técnica: Cultivo
Unidades:

Descripción: ESTUDIO DE E. COLI ENTEROHEMORRÁGICO
Plazo:
Tubo: Heces Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Estudio de una expansión
Código: UNA_EXPANS
Técnica: TP-PCR, y análisis de framgentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Código: ESTEROLES
Descripción: ESTUDIO DEL METABOLISMO DE LOS ESTEROLES EN SUERO
Técnica: Cromatografía de gases - Ionización de llama.
Comentario adicional: 2 ml de suero. Congelar y enviar congelado. Proteger de la luz con papel de aluminio.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DHCOL		Perfil Esteroles en suero 7-Dehidrocolesterol	µmol/L	(Inf. 8)
Prueba	COLESTENOL		Perfil Esteroles en suero 8(9)-Colestenol	µmol/L	(Inf. 2.0)
Prueba	DEHIDROCOL		Perfil Esteroles en suero 8-Dehidrocol	µmol/L	(Inf. 2.0)
Prueba	BCOL		Perfil Esteroles en suero Beta-Colestanol	µmol/L	(2.2 - 12.6)
Prueba	CAMPESTERO		Perfil Esteroles en suero Campesterol	µmol/L	(Inf. 10)
Prueba	COL		Perfil Esteroles en suero Colesterol	mmol/L	(1.7 - 6.6)
Prueba	DESMOS		Perfil Esteroles en suero Desmosterol	µmol/L	(Inf. 2.0)
Prueba	SITOSTEROL		Perfil Esteroles en suero Sitosterol	µmol/L	(Inf. 10.0)
Prueba	COMESTEROL		COMENTARIO ESTUDIO METABOLISMO DE LOS ESTEROLES EN SUERO		

Descripción: Estudio genético de cardiopatías
Código: CARDIO_GEN
Técnica: NGS con TSO de Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Código: NUTRINCOD
Descripción: ESTUDIO GENÉTICO DE OBESIDAD Y ENF. CARDIOVASCULARES ASOCIAD
Técnica: arrays
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NUTRIPMF		POLIMORFISMOS (NUTRIINCODE)		
Prueba	NUTRIRIESG		EVALUACIÓN DEL RIESGO (NUTRIINCODE)		

Descripción: Estudio genético de respuesta a 75 fármacos
Código: FARMAGEN75
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: 3 ml desangre en EDTA o saliva.
Rotular el tubo con BM
Valores de referencia:

Descripción: Estudio genómico del complemento: gen C3 (NGS)
Código: C3_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO PRENATAL DE ESTEROLES EN LIQ. AMNIOTICO
Código: ESTERAMNIO
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 5 mL líquido amniótico. Indicar edad gestacional. Indispensable historia clínica y antecedentes familiares
Valores de referencia:

Descripción: ETANERCEPT Y ANTICUERPOS SUERO
Código: ETANERCEPT
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la próxima dosis.
Valores de referencia:

Descripción: Etosuximida en suero
Código: ETOSU
Técnica: Cromatografia líquida de alta eficacia- Espectrometría de masas.
Unidades: mg/L
Plazo: 8 días

Descripción: Etosuximida en suero
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero. Refrigerado. Alternativa 1 mL plasma EDTA Tripotásico.
Valores de referencia: (40.00 - 100.00) Niveles Terapeúticos
(Sup. 150) Niveles Tóxicos

Descripción: ETV6/RUNX1 gen de fusión: detección y cuantificación (EMR)
Código: ETV6_RUNX1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

Muestra: sangre periférica o médula ósea

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción: Evaluacion del microbioma endometrial
Código: DISBIENDOM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional: Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra.
Valores de referencia:

Descripción: EVERLI COMPLETO (ANEUPLOIDIAS, DELECCIONES Y DUPLICACIONES)
Código: EVERLICOMP
Técnica: NGS (Next Generation Sequencing)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: EVERLI TEST AVANZADO (T21, T18, T13 CrX, CrY)
Código: EVERLIAVAN
Técnica: NGS (Next Generation Sequencing)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: EVERLI TEST BASICO (CROMOSOMAS T21, T18, T13)
Código: EVERLIBASI
Técnica: NGS (Next Generation Sequencing)
Unidades:
Plazo: 6 días

Descripción: EVERLI TEST BASICO (CROMOSOMAS T21, T18, T13)
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: EVERLI TEST COMPLETO MAS 9 SINDROMES DE MICRODELECCION
Código: EVERLIPLUS
Técnica: NGS (Next Generation Sequencing)
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: EVEROLIMUS SANGRE TOTAL
Código: EVEROLIMUS
Técnica: Cromatografía líquida / Tándem masas
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia: (3.0 - 8.0) Margen teapéutico recomendado

---

Descripción: EXAMEN DE GOTA GRUESA
Código: GOTAGRUE
Técnica: Examen microscópico
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: Exoma clínico (NGS)
Código: EXOMA_TSO
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Exoma clínico madre, padre e hijo (NGS)
Código: EXOMA_TRIO
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Descripción: Exoma clínico madre, padre e hijo (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo (NGS)
Código: EXOMA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo: archivos FASTQ
Código: EXOMA_RAW
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo: archivos VCF
Código: EXOMA_VCF
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Extraccion ADN en bloque tumoral parafinado
Código: EXTRACCADN
Técnica: Extraccion de ADN
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: F76 ALFA-LACTOALBUMINA ANTICUERPOS IGG
Código: ALFLACTIGG
Técnica: FLUOROINMUNOANÁLISIS
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia:

Descripción: F77 BETA-LACTOGLOBULINA ANTICUERPOS IGG
Código: BETLACIGG
Técnica: FLUOROINMUNOANÁLISIS
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia:

Descripción: F78 CASEINA ANTICUERPOS IGG
Código: CASEINAIGG
Técnica: FLUOROINMUNOANÁLISIS
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia:

Descripción: F-ACTINA AC. IGG SUERO
Código: ACACTINAF
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Sup. 1) Positivo

Descripción: FACTOR 23 DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS C-TERMINAL PLASMA
Código: FACTOR23
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: RU/ml
Plazo: 23 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL de PLASMA (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia: (Inf. 900) Menos de 3 meses
(Inf. 230) 3 meses - 17 años
(Inf. 180) Mas de 18 años

Descripción: FACTOR A DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF-A)
Código: VEGFA
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 23 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma EDTA.
CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (Inf. 128.9)

Descripción: FACTOR D DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF-D)
Código: VEGFD

Descripción:	FACTOR D DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF-D)
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma EDTA. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(Inf. 437.0)

Descripción:	FACTOR DE CRECIMIENTO PLACENTARIO (PIGF)
Código:	PIGF
Técnica:	Técnica ECLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero refrigerado 48h, sino, suero congelado
Valores de referencia:	(28.8 - 122) Mujer 10-14 sem.gestación (66.2 - 289) Mujer 15-19 sem.gestación (119 - 605) Mujer 20-23 sem.gestación (169 - 1117) Mujer 24-28 sem.gestación (114 - 1297) Mujer 29-33 sem.gestación (78 - 984) Mujer 34-36 sem.gestación (54.4 - 862) Mujer 37 sem.gestación-parto

Descripción:	Factor de Necrosis Tumoral Alfa
Código:	TNF
Técnica:	ELISA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml suero. Separar el suero lo antes posible y CONGELAR. ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(4.60 - 12.40)

Descripción:	Factor Fletcher (Precalicreina) en plasma
Código:	FACTFELT
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	18 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 ml Plasma citrato sódico Congelar la muestra inmediatamente
Valores de referencia:	(50 - 150)

Descripción:	FACTOR H COMPLEMENTO SUERO ANTICUERPOS
Código:	FHCOMPLAC
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Volumen y condiciones de la muestra: 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Adjuntar historial clínico. INDISPENSABLE enviar alícuota separada del resto de determinaciones.

Descripción: FACTOR H COMPLEMENTO SUERO ANTICUERPOS
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo

Descripción: FACTOR H DEL COMPLEMENTO
Código: FACTORH
Técnica: Inmunodifusión Radial
Unidades: mg/dL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 mL se suero. Congelar y enviar congelado. Adjuntar historial clínico con fecha de nacimiento.
Valores de referencia: (36 - 68)

Descripción: FACTOR II PLASMA
Código: FACTORII
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (70 - 120)

Descripción: FACTOR INTRINSECO AC
Código: FACTORINAC
Técnica: Técnica EIA
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción: FACTOR IX EN PLASMA
Código: FACTORIX
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (60 - 150)

Descripción: Factor liberador de Corticotropina (CRF)
Código: CRF
Técnica: Radioinmunoanálisis.
Unidades: pg/mL
Plazo: 22 días
Tubo: Plasma trasylol/aprotinina

Descripción: Factor liberador de Corticotropina (CRF)
Comentario adicional: 1 mL Plasma EDTA Tripotásico Trasylol (Congelado)

Recoger 5 mL de sangre total en un tubo vacutainer frío de EDTA K3 con 250 KIU de Trasylol (Aprotinina).
Enfriar el tubo con la sangre recien extraída en un baño de hielo durante 10 minutos.
Separar el plasma por centrifugación a 4ºC.
El plasma debe congelarse en un plazo máximo de 1 hora y conservarse congelado hasta que sea analizado.

Valores de referencia: (12.4 - 64.0)

Descripción: FACTOR NEFRITICO C3
Código: FACNEFRITI
Técnica: Inmunofijación
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL de suero CONGELADO
Valores de referencia: = Valores de referencia indicativos:
= Complemento C3: 85-180 mg/dL
= Standard IFCC/BCR/CAP-CRM 470

Descripción: FACTOR Rh
Código: RH
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 ml sangre total Heparina litio (Refrigerado). Se requiere información clínica
Valores de referencia:

Descripción: FACTOR RH ESTUDIO DU
Código: RHDU
Técnica: Microtipaje en columnas
Unidades:
Plazo:
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FACTOR V EN PLASMA
Código: FACTORV
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (70 - 120)

Descripción: FACTOR VII EN PLASMA
Código: FACTORVII
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %

Descripción:	FACTOR VII EN PLASMA
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(55 - 170)

Descripción:	FACTOR VIII ANTIGENICO
Código:	FVIIIANTIG
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	%
Plazo:	18 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. Tubo aparte
Valores de referencia:	(63 - 199)

Descripción:	FACTOR VIII EN PLASMA
Código:	FACTORVIII
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(50 - 150)

Descripción:	FACTOR VON WILLEBRAND ACTIVIDAD (COFACTOR DE LA RISTOCETINA)
Código:	RISTOCETIN
Técnica:	Método turbidimétrico basado en la agregación de plaquetas
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Sup. 50)

Descripción:	FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENO PLASMA
Código:	WILLEBRAND
Técnica:	Técnica inmunoturbidimétrica
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	Plasma citrato
Valores de referencia:	(50 - 160)

Descripción:	FACTOR X EN PLASMA
Código:	FACTORX
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(70 - 120)

Descripción: FACTOR XI
Código: FACTORXI
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (60 - 150)

Descripción: FACTOR XII EN PLASMA
Código: FACTORXII
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (60 - 150)

Descripción: FACTOR XIII EN PLASMA
Código: FACTORXIII
Técnica: Método Inmunoturbidimétrico
Unidades: %
Plazo: 7 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL de plasma citrato refrigerado
Valores de referencia: (59 - 181)

Descripción: Fallo espermático tipo 8. Sec Gen: NR5A1
Código: GEN_000374
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fallo ovárico precoz. Sec Gen: BMP15
Código: GEN_000375
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fanconi-Bickel, Sd. Sec Gen: SLC2A2
Código: GEN_000376
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Fanconi-Bickel, Sd. Sec Gen: SLC2A2
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Farmacogenética del Clopidogrel: genotipos CYP2C19
Código: CLOPIDOGRE
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Farmacogenética del tamoxifeno: genotipos CYP2D6
Código: TAMOXIFENO
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Farmacogenética. Estudio de la respuesta a 75 fármacos
Código: GEN_000790
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Feingold, Sd. Sec Gen: MYCN
Código: GEN_000377
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: FENIL MERCAPTURICO EN ORINA
Código: FENILMERCA
Técnica: Cromatografía de gases-Espectrometría de masas
Unidades: mcg/g creatin.
Plazo: 9 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 mL orina final de jornada

Descripción:	FENIL MERCAPTURICO EN ORINA
Valores de referencia:	(Inf. 45) Final jornada laboral (exposición BENCENO)

Descripción:	Fenilalanina
Código:	FENILALA
Técnica:	Cromatografia líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	13 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL Suero CONGELADO. Indicar información clínica.
Valores de referencia:	(28 - 80) < 2 años (30 - 95) 2 años - 18 años (35 - 80) > 18 años

Descripción:	FENILALANINA ORINA
Código:	FENILALA2
Técnica:	Técnica Cromatografia Liquida/Tandem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mcmol/g crea.
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada).
Valores de referencia:	(58 - 268) < 14 años (39 - 81) > 14 años

Descripción:	Fenilcetonuria. Sec Gen: PAH
Código:	GEN_000378
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	FENITOINA LIBRE (DIFENILHIDANTOINA LIBRE)
Código:	FENITOLI
Técnica:	Técnica Ultrafiltración-Inmunoluminiscencia (Hasta el 19-03-2012 Tec. Ultracentrifugación/EIA)
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL
Valores de referencia:	(1.0 - 2.0)

Descripción:	FENITOINA TOTAL (DIFENILHIDANTOÍNA TOTAL)
Código:	FENITO
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	µg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	

Descripción: FENITOINA TOTAL (DIFENILHIDANTOÍNA TOTAL)
Valores de referencia: (10 - 20) Rango Terapeútico

Descripción: FENOBARBITAL
Código: FENOBAR
Técnica: Inmunoensayo
Unidades: µg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (15 - 40) Rango Terapeútico

Descripción: FENOLES LIBRES EN ORINA
Código: FENOLESLIB
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 6 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 20) Persona no expuesta
(Inf. 40) Exposición (B.E.I.)

Descripción: FENOLES TOTALES ORINA
Código: FENOLES
Técnica: Téc. Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 9 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: Muestra de Orina Final de Jornada.
10 mL Orina (Refrigerado) Toma muestra:Final de la jornada laboral.
Valores de referencia: (Inf. 120) VLB-INSHT. Final jornada laboral (Fenol)

Descripción: FENOTIPO ERITROCITARIO
Código: FENOERITRO
Técnica: Microtipaje en columnas
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 mL EDTA
Valores de referencia:

Descripción: FENOTIPO Rh
Código: FENORH
Técnica: Microtipaje en columnas
Unidades:
Plazo:
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FERRITINA
Código: FERRI
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero
Valores de referencia: (21.81 - 274.66) Hombre > 15 años
(10 - 204.00) Mujer > 15 años
(200 - 600) 1 semana - 4 semanas
(50 - 200) 4 semanas - 5 meses
(7 - 140) 5 meses - 15 años

Descripción: FERRITINA GLUCOSILADA
Código: FERRIGLUCO
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL de suero. Evitar plasma (EDTA). La ferritina debe ser superior a 100 ng/mL
Valores de referencia:

Descripción: FIBRILARINA AC. SUERO
Código: FIBRILARAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: = Negativo
= Positivo

Descripción: FIBRINOGENO
Código: FIBRI
Técnica: Método coagulométrico de Claus
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: Plasma citrato.
(solución de citrato trisódico 0,109 M: 1 vol. de citrato por 9 vol. de sangre.)
Valores de referencia: (200 - 400)

Descripción: FIBRINOGENO (PROTEÍNA)
Código: FIBRIPRO
Técnica: Nefelometría
Unidades: g/L
Plazo: 6 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL plasma

Descripción: FIBRINOGENO (PROTEÍNA)
Valores de referencia: (2 - 4.5)

Descripción: Fibrodisplasia osificante progresiva. Sec Gen: ACVR1
Código: GEN_000379
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fibromialgia: mutación V185M gen COMT (sec. Sanger)
Código: COMT_V185M
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Fibronectina en plasma
Código: FIBRONEC
Técnica: Inmuno Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 12 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: Alt. plasma EDTA
Valores de referencia: (20 - 35)

Descripción: Fibrosis cong. músculos extraoculares: <10 genes (NGS)
Código: FIB_MUSOCU
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Fibrosis congénit músculos extraocul. Sec Gen: KIF21A
Código: GEN_000380
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fibrosis congénit músculos extraocul. Sec Gen: TUBB2B
Código: GEN_000381
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fibrosis Quística: 62 mutaciones gen CFTR
Código: FIBROPCR
Técnica: PCR-RLB
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Fibrosis quística: gen CFTR (NGS)
Código: FIBRO_SEC
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: FIEBRE AMARILLA AC IGG
Código: FAMARILIGG
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: = Positivo título >1:100

Descripción: FIEBRE AMARILLA AC IGM
Código: FAMARILIGM
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: = Positivo título>1:10

Descripción: Fiebre mediterránea familiar: gen MEFV (NGS)
Código: FIEBRE_MED
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Descripción: Fiebre mediterránea familiar: gen MEFV (NGS)
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Filarias DNA PCR
Código: FILARIAPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA) para filariasis linfáticas (Wuchereria bancrofti) y subcutáneas (Loa loa).
Exudado de lesiones cutáneas para Onchocerca volvulus
Valores de referencia:

Descripción: FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO (CKD-EPI CREATININA)
Código: FILTRACKD
Técnica: Fórmula
Unidades: mL/min/1.73m^2
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional: Asociado a realización de creatinina sérica
Valores de referencia: (Sup. 60)

Descripción: FISH 5 SONDAS (ESPERMATOZOIDES)
Código: FISH5ESPER
Técnica: Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Conservar en nevera
Valores de referencia:

Descripción: FISH 7 SONDAS (ESPERMATOZOIDES)
Código: FISH7ESPER
Técnica: Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Semen
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH 9 SONDAS (ESPERMATOZOIDES)
Código: FISH9ESPER
Técnica: Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Unidades:
Plazo: 21 días

Descripción: FISH 9 SONDAS (ESPERMATOZOIDES)
Tubo: Semen
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH deleción P53 (región: 17p13, región control: Cen17)
Código: MDFISHP53
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH deleción región 13q14 (región control: 13q36)
Código: MDFISHDE13
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH deleción región 5q31;5q33 (control región: 5p15)
Código: MDFISHDE5Q
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH deleción región 7q22;7q36 (región control: Cen7)
Código: MDFISHDE7Q
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH ganacia gen SRD (región: 1p36, región control: Cen1)
Código: MDFISHSRD
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH gen de fusión BCR/ABL [translocación: t(9:22)]
Código: MDFISHT922
Técnica:
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH reordenamiento gen IGH (región: 14q32)
Código: MDFISHIGH
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH reordenamiento gen NTKR1
Código: MDFISHNTK1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH sonda centromérica (por centrómero analizado)
Código: MDFISHCEN
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: FLAVIVIIGG
Descripción: FLAVIVIRUS MOSAICO 1 IGG
Técnica: IFI
Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TBEIGG		VIRUS TBE (PERFIL FLAVIVIRUS) IGG		
Prueba	VFAIGG		FLAVIVIRUS FIEBRE A (PERFIL FLAVIVIRUS) IGG		
Prueba	NILOOCIIGG		VIRUS NILO OCCIDENTAL (PERFIL FLAVIVIRUS) IGG		
Prueba	ENJAPONIGG		VIRUS ENCEFALITIS JAPONESA (PERFIL FLAVOVIRUS) IGG		

Descripción: Flecainida
Código: FLECAINIDA
Técnica: Téc. HPLC/Espectrometría de masas
Unidades: mg/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.3 - 1.0) rango terapéuticos 0.3-1.0 mg/L

Descripción: FLUNITRAZEPAM ORINA (ROHIPNOL)
Código: FLUNITRAZE
Técnica: Cromatografía líquida/tándem masas
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL de orina (micción aislada)
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: FLUOR SUERO
Código: FLUORSUERO
Técnica: Electrodo selectivo
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 5 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 19) Valores de referencia indicativos
(Inf. 76) Valores máximos recomendados
(Inf. 950) Límite máximo aceptado tras medicación

Descripción: FLUORURO ORINA
Código: FLUORURO
Técnica: Electrodo selectivo
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 25 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral(Refrigerado).
Valores de referencia: (Inf. 2.0) Inicio de jornada laboral
(Inf. 3.0) Final de jornada laboral

Código: FLUOXETINA
Descripción: FLUOXETINA (FLUOXETINA+NORFLUOXETINA) EN SUERO
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FLUOXE		PERFIL FLUOXETINA (FLUOXETINA)	ng/mL	
Prueba	NORFLUOXE		PERFIL FLUOXETINA (NORFLUOXETINA)	ng/mL	

Componentes					
Prueba	FLUOXSUMA		PERFIL FLUOXETINA (FLUOXETINA TOTAL)	ng/mL	(200 - 1100) Valores terapéuticos indicativos (Sup. 2000) Niveles tóxicos

Descripción:	Flurazepam en suero
Código:	FLURAZEPAM
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero. Refrigerado. Alternativamente 1 mL plasma EDTA TRIPOTÁSICO.
Valores de referencia:	(5 - 10) Rango Terapéutico

Descripción:	FLUVOXAMINA SUERO
Código:	FLUVOXAMIN
Técnica:	CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA/TÁNDEM MASAS (LC-MS/MS)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL suero.
Valores de referencia:	(50 - 900)

Descripción:	FOSFATASA ACIDA PLASMA SEMINAL
Código:	FACSEMEN
Técnica:	Cinética
Unidades:	kU/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(280 - 994)

Descripción:	FOSFATASA ACIDA PROSTATICA
Código:	FACP
Técnica:	ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 4)

Descripción:	FOSFATASA ACIDA TARTRATO RESISTENTE
Código:	FACTARRESI
Técnica:	cinética
Unidades:	U/L (37ºC)
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Congelado

Descripción: FOSFATASA ACIDA TARTRATO RESISTENTE
Comentario adicional: 1 mL suero. Congelar y enviar CONGELADO.
Valores de referencia: (Inf. 6.5)

Descripción: FOSFATASA ACIDA TOTAL
Código: FACT
Técnica: Cinética
Unidades: U/L a 37 ºC
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1ml de suero. Congelar si no se envía en el día.
Valores de referencia: (Inf. 6.0)

Descripción: FOSFATASA ALCALINA
Código: ALP
Técnica:
Unidades: U/L a 37ºC
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (38 - 126) > 15 años
(Inf. 373) Hombre < 15 años
(Inf. 360) Mujer < 15 años

Descripción: FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMA OSEA
Código: ALPISOEN
Técnica: CLIA
Unidades: mcg/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero, evitar plasma EDTA
Valores de referencia: (25 - 221) Hombre < 2 años
(27 - 148) Hombre 2 años - 9 años
(35 - 169) Hombre 9 años - 13 años
(13 - 111) Hombre 13 años - 17 años
(Inf. 20) Hombre > 17 años
(28 - 187) Mujer < 2 años
(31 - 152) Mujer 2 años - 9 años
(29 - 177) Mujer 9 años - 13 años
(7 - 41) Mujer 13 años - 17 años
(Inf. 14) Mujer > 17 años Premenopausia
(Inf. 22) Mujer > 17 años Postmenopausia

Descripción: FOSFATASAS ALCALINAS GRANULOCITICAS
Código: FAGRANULO
Técnica: Técnica Citoquímica
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 2 mL de sangre total (heparina), ademas de 4 extensiones en porta, sin fijar, sangre nativa o con heparina. El EDTA interfiere en esta determinación.
Valores de referencia: (25 - 180)

Descripción:	FOSFATIDILETANOLAMINA AC IgG SUERO
Código:	FOSETANOLA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	FOSFATIDILINOSITOL AC Ig G SUERO
Código:	FOSFINOACG
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	FOSFATIDILINOSITOL AC Ig M SUERO
Código:	FOSFINOACM
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	FOSFATIDILSERINA /PROTROMBINA AC. Ig G SUERO
Código:	FOSFPROACG
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo (0.8 - 1.2) Indeterminado

Descripción:	FOSFATIDILSERINA /PROTROMBINA AC. Ig M SUERO
Código:	FOSFPROACM
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL. Suero.
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo (0.8 - 1.2) Indeterminado

Descripción:	FOSFATIDILSERINA AC. Ig G SUERO
Código:	FOSFAACG
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero Refrigerado
Valores de referencia:	(Inf. 10.00) Negativo (10.0 - 15.0) Indeterminado (Sup. 15.0) Positivo

Descripción:	FOSFATIDILSERINA AC. Ig M SUERO
Código:	FOSFAACM
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero Refrigerado
Valores de referencia:	(Inf. 10.0) Negativo (10.0 - 15.0) Indeterminado (Sup. 15.0) Positivo

Descripción:	FOSFOETANOLAMINA ORINA
Código:	FOSFOETANO
Técnica:	Cromatografía líquida-Tándem masas
Unidades:	mcmol/g creatin
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 150) < 14 años (Inf. 70) > 14 años

Descripción:	Fosfohexosaisomerasa (PHI) en suero
Código:	PHI
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular
Unidades:	U/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(26 - 110)

Descripción:	FOSFOLIPASA A2 RECEPTOR (PLA2R) ANTICUERPOS
Código:	PLA2R
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Indice
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ML SUERO

Descripción: FOSFOLIPASA A2 RECEPTOR (PLA2R) ANTICUERPOS
Valores de referencia: (Inf. 0.69) Ausencia de niveles detectables de anticuerpos
(0.70 - 0.99) Zona límite o dudoso
(Sup. 1.00) Presencia de anticuerpos

Descripción: FOSFOLIPIDOS
Código: FOSFO
Técnica: Espectrofotometría Enzimática
Unidades: mg/dL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (150 - 250)

Descripción: FOSFORO
Código: P
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (3.5 - 6.5) < 14 años
(2.5 - 5) 14 años - 70 años
(1.8 - 4.6) > 70 años

Descripción: FOSFORO ORINA
Código: P2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: g/24h
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 3)

Descripción: Fragmentación espermática cad. simple + cad. doble (COMET)
Código: FRAGM_SIMP
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Dpto. citogenética

Eyaculado tras 3, 4 días de abstinencia en tubo estéril sin ningún medio. Envío de la muestra CONGELADA. Contactar con logistica@megalab.es y genetica@megalab.es

Valores de referencia:

Descripción: Fragmentación espermática total (SCD)
Código: FRAGM_TOT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Semen

Descripción: Fragmentación espermática total (SCD)
Comentario adicional: Dpto. citogenética

Guardar en nevera (NO congelar). enviar de lunes a miércoles.
Valores de referencia:

Descripción: Fragmentación espermática total (SCD) + cadena doble (COMET)
Código: FRAGM_DC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Dpto. citogenética

Eyaculado tras 3, 4 días de abstinencia en tubo estéril sin ningún medio. Envío de la muestra CONGELADA. Contactar con logística@megalab.es y genetica@megalab.es

Valores de referencia:

Descripción: FRANCISELLA TULARENSIS AC. IGG SUERO (TULAREMIA)
Código: TULAREMACG
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: U/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(10 - 15) Indeterminado

Descripción: FRANCISELLA TULARENSIS AC. IGM SUERO (TULAREMIA)
Código: TULAREMACM
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: U/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(10 - 15) Indeterminado

Descripción: FRANCISELLA TULARENSIS AC. SUERO (TULAREMIA)
Código: TULAREMIAC
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: Francisella Tularensis DNA PCR Cualitativa
Código: FRANCISDNA
Técnica: PCR

Descripción: Francisella Tularensis DNA PCR Cualitativa
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. También válidas otros tipos de muestras.
Valores de referencia:

Descripción: Fraser, Sd. Sec Gen: FREM2
Código: GEN_000382
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Freeman-Sheldon, Sd. Sec Gen: MYH3
Código: GEN_000383
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: FROTIS DE SANGRE PERIFERICA
Código: FROTIS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FRUCTOSA PLASMA SEMINAL
Código: FRUTOSASE
Técnica: Enzimática-Espectrofotometría ultravioleta
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: SEMEN CONGELADO
Comentario adicional: 1 mL de Plasma Seminal. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (150 - 500)

Descripción: FRUCTOSAMINA
Código: FRUC
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: µmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero

Descripción: FRUCTOSAMINA
Valores de referencia: (180 - 285)

Descripción: FSH
Código: FSH
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: mU/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(3.03 - 8.08) Mujer > 14 años F. Folicular
(2.55 - 16.69) Mujer > 14 años Ovulacion
(1.38 - 5.47) Mujer > 14 años F. Luteinica
(26.72 - 133.41) Mujer > 14 años Post-menopausia
(0.95 - 11.95) Hombre > 14 años

Descripción: FTA
Código: FTA
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Suero.
Alternativa: plasma de EDTA
Valores de referencia: =Negativo

Descripción: Fucosidosis. Sec Gen: FUCA1
Código: GEN_000384
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fundus albipunctatus. Panel NGS
Código: GEN_000385
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fundus flavimaculatus. Sec Gen: ABCA4
Código: GEN_000386
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción:	Fundus flavimaculatus. Sec Gen: ABCA4
Valores de referencia:	

Descripción:	FUROSEMIDA SUERO
Código:	FUROSEMIDA
Técnica:	Cromatografía Líquida/ Tándem Masas (LC-MS/MS). Hasta la fecha 1 de Febrero se hacía por HPLC.
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 4) DESPUES DOSIS 40 mg

Descripción:	GABA A (Subunid GABA-A) AC.antireceptor, LCR
Código:	GABARALCR
Técnica:	Técn. Inmunohistoquímica
Unidades:	
Plazo:	16 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.
Valores de referencia:	

Descripción:	GABA A (Subunid GABA-A) AC.antireceptor, SUERO
Código:	GABARASUE
Técnica:	Técn. Inmunohistoquímica
Unidades:	
Plazo:	16 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	GABA B (Subunid GABARB1/B2) AC.antireceptor, LCR
Código:	GABARBLCR
Técnica:	Técn. IFI
Unidades:	
Plazo:	16 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	= Valores de referencia indicativos: se consideran niveles significativos a partir de título 1:2

Descripción:	GABA B (Subunid GABARB1/B2) AC.antireceptor, Suero
Código:	ANTIGABA
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	

Descripción:	GABAPENTINA EN SUERO
Código:	GABAPENTI
Técnica:	Cromatografía Líquida Tándem Masas (LC-MS/MS).
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(2.00 - 10.00)

Descripción:	GAD/65K AC. SUERO
Código:	GAD_64KAC
Técnica:	ELISA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero/alt. plasma EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo

Descripción:	GALACTOSA 1 FOSFATO, Eritrocitos
Código:	G1FOSFATO
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	5 mL sangre total (EDTA). Envio inmediato. Evitar envio viernes y vísperas de festivo. Enviar informe clínico(debe incluir edad, si toma lactosa, si presenta clínica hepática y/o cataratas).
Valores de referencia:	

Descripción:	GALACTOSA EN ORINA
Código:	GALACTORI
Técnica:	Espectrofotometria de Absorción molecular
Unidades:	mg/L
Plazo:	13 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	Orina aislada 1 ml refrigerada
Valores de referencia:	(Inf. 150.91) Lactantes (Inf. 14.55) No lactantes

Descripción:	GALACTOSA EN SANGRE
Código:	GALACTOSA
Técnica:	Enzimática
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma de EDTA. Enviar informe clínico (debe incluir edad, si toma lactosa,si presenta clinica hepática y/o cataratas. Envio inmediato, evitar envios viernes y visperas de festivos
Valores de referencia:	(Inf. 300)

Descripción:	GALACTOSA-1-FOSFATO URIDIL TRANSFERASA EN SANGRE
Código:	GALAC1FURI
Técnica:	Téc. Cromatografia liquida/Tánden masas (LC-MS/MS)

Descripción: GALACTOSA-1-FOSFATO URIDIL TRANSFERASA EN SANGRE
Unidades: mmol/h/g Hb
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 ml sangre total EDTA.
Envio inmediato (no viernes ni festivos) Se requiere información clínica (edad, si toma lactosa, si daño hepatico, catarata)
Valores de referencia: (18 - 28)

Descripción: Galactosemia 3 Déficit UDP-galactosa-4epimeras. Gen: GALE
Código: GEN_000387
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Galactosemia tipo 2. Sec Gen: GALK1
Código: GEN_000389
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Galactosemia. Panel NGS
Código: GEN_000388
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Galactosemia: gen GALT (NGS)
Código: GALT_MUTS
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GAN AC. IGG
Código: GANGQGDGG
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días

Descripción: GAN AC. IGG
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: GAN AC. IGM
Código: GANGQGDGM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: GANGLIÓNICO ACETILCOLINA RECEPALFA 3 AC. SUERO
Código: GANGALFA3
Técnica: Radioisotópica
Unidades: pmol/L
Plazo: 35 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero
Indispensable nombre completo y fecha de nacimiento
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(10 - 14.9) Línea límite
(Sup. 15) Positivo

Descripción: GANGLIOSIDOS MAS SULFATIDOS AC. IGM
Código: GANGIGM
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia:

Descripción: GANGLIOSIDOS MAS SULFATIDOS AC. IGG
Código: GANGIGG
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia:

Descripción: GANGLIOSIDOS PERFIL AC. IgG + IgM
Código: GMAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: GANGLIOSIDOS PERFIL AC. IgG + IgM
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: GANGLIOSIDOS PERFIL AC. IgG LCR
Código: GANGLCR
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: GANGLIOSIDOS PERFIL AC. IgM LCR
Código: GANMLCR
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Gangliosidosis tipo 1 (GM1): gen GLB1 (NGS)
Código: GM1_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Gangliosidosis. Panel NGS
Código: GEN_000390
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación.
Tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Gardner, Sd. Sec Gen: APC
Código: GEN_000391
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Gardner, Sd. Sec Gen: APC

Valores de referencia:

Código: GASOMEARTE

Descripción: GASOMETRIA ARTERIAL

Técnica: Electrodo de estado sólido

Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PH_GASES		PH, GASOMETRIA ARTERIAL		(7.35 - 7.45)
Prueba	PCO2		PCO2, GASOMETRIA ARTERIAL	mm Hg	(35 - 45)
Prueba	PO2		PO2, GASOMETRIA ARTERIAL	mm Hg	(73 - 105)
Prueba	HCO3		BICARBONATO ACTUAL, GASOMETRIA ARTERIAL	mEq/L	(22 - 26)
Prueba	TCO2		CO2 TOTAL, GASOMETRIA ARTERIAL	mEq/L	(23 - 27)
Prueba	BEB		EXCESO DE BASES CELULARES, GASOMETRIA ARTERIAL	mEq/L	(-5 - 5)
Prueba	SO2C		SATURACION DE O2, GASOMETRIA ARTERIAL	%	(95 - 100)

Código: GASOCORD

Descripción: GASOMETRÍA SANGRE CORDÓN

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PHCORD		PH SANGRE DE CORDON		(7.18 - 7.45)
Prueba	PCO2CORD		PCO2 SANGRE DE CORDÓN		(32.4 - 56)
Prueba	PO2CORD		PO2 SANGRE DE CORDÓN		(5.6 - 30.4)
Prueba	HCO3CORD		HCO3 SANGRE CORDÓN		(17.3 - 27.3)
Prueba	EBCORD		EXCESO DE BASES SANGREN DE CORDÓN		(-6 - +2)

Código: GASOMEVENO

Descripción: GASOMETRIA VENOSA

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PH_GASV		PH, GASOMETRIA VENOSA		(7.30 - 7.42)
Prueba	PCO2V		PCO2, GASOMETRIA VENOSA	mm Hg	(41 - 45)
Prueba	PO2V		PO2, SANGRE VENOSA	mm Hg	(25 - 40)
Prueba	HCO3V		BICARBONATO ACTUAL, GASOMETRIA VENOSA	mEq/L	(24 - 28)
Prueba	TCO2V		CO2 TOTAL, GASOMETRIA VENOSA	mEq/L	(25 - 29)

Descripción:	GASTRINA SUERO
Código:	GASTRINA
Técnica:	ICMA-Inmunoensayo quimioluminiscente
Unidades:	pg/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero. Separar el suero lo antes posible, congelar y enviar congelado. El paciente no debe tomar café y o té durante el ayuno. El paciente no debe tomar antiácidos durante las 24 horas previas al análisis. El paciente no debe fumar durante las 24 horas prev
Valores de referencia:	(Inf. 21)

Descripción:	Gaucher, enfermedad de. Sec Gen: GBA
Código:	GEN_000392
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	GAXILOSA EN ORINA (ACTIVIDAD LACTASAS INTESTINALES)
Código:	GAXILOSA
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	g
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	Congelar la orina si va a pasar 24 horas hasta analisis. Anotar la diuresis
Valores de referencia:	(Sup. 37.87) (Inf. 37.87) Hipolactasia

Descripción:	GD1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GD1B)
Código:	GANGGD1B
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	21 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR Se recomienda realizar analisis simultaneo en suero y LCR
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	Gen KRAS exones 2, 3 y 4 (sec. Sanger)
Código:	KRAS_MUTS
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestras: tejido incluido en parafina o EDTA Una vez hechos los cortes que se necestian para el estudio, devolvemos el bloque al paciente / médico. Rotular ONCO.

Descripción: Gen KRAS exones 2, 3 y 4 (sec. Sanger)
Valores de referencia:

Descripción: Gen MYD88
Código: MYD88_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:

Descripción: Gen NRAS exones 2, 3 y 4 (sec. Sanger)
Código: NRAS_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado.Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Gen SCN5A (NGS)
Código: SCN5A
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Gen SHOX (NGS)
Código: SHOX
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Gen SHOX. Deleciones y Duplicaciones (MLPA) Talla Baja
Código: SHOX_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Genes COL6A1, COL6A2 y COL6A3 (NGS)
Código: COLAG_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen añadir 1 gen
Código: GENEXTRAGS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Prueba creada para añadir el análisis de un gen a un estudio de GeneScreen hecho anteriormente.
Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Easy:300 gen Compatibilidad genetica/portadores
Código: COMPATEASY
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Expanded:925 gen Compatibilidad geneti/portadores
Código: COMPATPREM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Plus:550 gen Compatibilidad genetica/portadores
Código: COMPATPLUS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Genoma completo: secuenciación
Código: GENOMA

Descripción: Genoma completo: secuenciación
Técnica:
Unidades:
Plazo: 60 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Genoma madre, padre e hijo (NGS)
Código: GENOMA_TRI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 60 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GENOSPORT CARDIO COMPLET: GENES ASOCIADOS A CARDIOPATIAS
Código: GENSPORTCA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: GENOSPORT ENTRENAMIENTO COMPLET: GENES ASOCIADOS A EFICIENCI
Código: GENSPORENT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: GENOSPORT LESIONES COMPLET: GENES ASOCIADOS A LESIONES
Código: GENSPORLES
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: GENOTIPO ABO (GRUPO SANGUINEO) POR PCR-SSP
Código: GENOTIPABO
Técnica: PCR-SSP
Unidades:

Descripción: GENOTIPO ABO (GRUPO SANGUINEO) POR PCR-SSP
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: Genotipo alfa-1 antitripsina
Código: PIGENOTIPO
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Genotipo apolipoproteína E (sec. Sanger)
Código: APOE_PCR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Herparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Genotipo de receptores KIR en sangre
Código: GENOKIR
Técnica: Tipaje mediante el uso de sondas especificas SSO (Sequence Specific Oligonucleotide) unidas a microesferas Luminex (Lifecodes, Inmucor).
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: GENTAMICINA
Código: GENTA
Técnica: Inmunoensayo
Unidades: mcg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (6 - 10) Pico
(Sup. 12) Tóxico - Pico
(0.5 - 2) Valle
(Sup. 2) Tóxico - Valle

Descripción: Gerstmann-Straussler, Sd. Sec Gen: PRNP
Código: GEN_000395

Descripción: Gerstmann-Straussler, Sd. Sec Gen: PRNP
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GGT
Código: GGT
Técnica:
Unidades: U/L a 37 ºC
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (12 - 64) Hombre
(9 - 36) Mujer

Descripción: GHRELINA EN SUERO
Código: GHRELINA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml de suero congelado.
Valores de referencia: = Peso normal (sujetos control): 520-700 pg/mL

Descripción: GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) en plasma
Código: GHRH
Técnica: Radioinmunoensayo
Unidades: ng/L
Plazo: 33 días
Tubo: Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional: 2mL plasma-EDTA con aprotinina (TRASYLOL). CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. Envío tubo independiente del resto de pruebas.
Valores de referencia: (Inf. 60)

Descripción: GIARDIA LAMBLIA AC
Código: LAMBLIAAC
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: = Negativo <1:32
= Positivo >1:32

Descripción: GIARDIA LAMBLIA EN HECES PCR
Código: GIARDIAPCR
Técnica: PCR
Unidades:

Descripción: GIARDIA LAMBLIA EN HECES PCR
Plazo: 12 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 10 g heces(REFRIGERADO)
Valores de referencia:

Descripción: GIARDIA LAMBLIA TEST RAPIDO
Código: GIARDIAAG
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Heces Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Gilbert, Sd. Sec Gen: UGT1A1
Código: GEN_000396
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Gilles de la Tourette, Sd. Sec Gen: SLITRK1
Código: GEN_000699
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GLANDULA PARATIROIDES AC.
Código: AC.GLAN.PA
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia:

Descripción: GLANDULA SALIVAR ANTICUERPOS
Código: GLANDUSAAC
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)

Descripción: GLANDULA SALIVAR ANTICUERPOS
Valores de referencia: = Negativo <1/5
= Positivo >1/5

Descripción: Glaucoma congénito. Sec Gen: CYP1B1
Código: GEN_000397
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma congénito. Sec Gen: MYOC
Código: GEN_000398
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma congénito. Sec Gen: OPTN
Código: GEN_000399
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma exfoliativo: gen LOXL1 polimorfismos (sec. Sanger)
Código: GLAUCO_EXF
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma por pseudoexfoliación. Sec Gen: LOXL1
Código: GEN_000400
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	GLIADINA AC. IGA SUERO
Código:	GLIADIACA
Técnica:	Téc. EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	GLIADINA AC. IGG SUERO
Código:	GLIADIACG
Técnica:	Téc. EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	GLIADINA NO DEAMINADA AC. IGA SUERO
Código:	GLIADACAND
Técnica:	INMUNOANÁLISIS
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(0.9 - 1.1) Zona límite

Descripción:	GLIADINA NO DEAMINADA AC. IGG SUERO
Código:	GLIADACGND
Técnica:	INMUNOANÁLISIS
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 1.0) Negativo (Sup. 1.0) ó = 1 Positivo

Descripción:	GLICEROL SUERO
Código:	GLICEROL
Técnica:	Fotometría
Unidades:	µmol/L
Plazo:	13 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2mL de suero refrigerado
Valores de referencia:	(20 - 250)

Descripción:	GLICINA ANTICUERPOS RECEPTORES NEURONALES
Código:	GLICINAACN

Descripción: GLICINA ANTICUERPOS RECEPTORES NEURONALES
Técnica: Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL suero refrigerado
Valores de referencia:

Descripción: GLICOPROTEINAS DE MEMBRANA PLAQUETAR SANGRE TOTAL
Código: GLICOPLAQ
Técnica: CITOMETRÍA DE FLUJO
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 10 mL sangre total (EDTA). Envío inmediato a temperatura ambiente. Indispensable información clínica
Valores de referencia:

Descripción: Glioblastoma: metilación del promotor del gen MGMT
Código: MGMT
Técnica: MLPA metilación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra en tejido parafinado marcada como muestra onco u oncogenetica.
Valores de referencia:

Descripción: Gliomas PAN 1 (IDH1,IDH2,CDKN2A/2B/2C, met MGMT,Cnv1p/19q)
Código: GLI1_MUTS
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: GLIOMAS Panel 2. Somático. Mutaciones y CNVs
Código: NGS_GLI2S
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Glomeruloesclero focal y segmentaria / Sd.nefrótico. Panel
Código: GEN_000401
Técnica:
Unidades:

Descripción: Glomeruloesclero focal y segmentaria / Sd.nefrótico. Panel
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GLUCAGON PLASMA
Código: GLUCAGON
Técnica: Técnica RIA
Unidades: ng/L
Plazo: 15 días
Tubo: Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional: Tubo especial con aprotinina (TRASYLOL). 2 mL plasma EDTA con Aprotinina, separar y congelar inmediatamente.
Valores de referencia: (Inf. 209)

Descripción: Glucogenosis de corazón, letal. Sec Gen: PRKAG2
Código: GEN_000402
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glucogenosis tipo III: gen AGL (NGS)
Código: AGL_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glucogenosis tipo V: mutaciones R49X, G204S y W797R gen PYGM
Código: MCARDLE
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Glucogenosis. Enf. almace.glucógeno lisosómico. Gen: LAMP2
Código: GEN_000338
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Glucogenosis. Enf. almace.glucógeno lisosómico. Gen: LAMP2
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glucogenosis. Enferm.del almacenamiento de glucógeno. Panel
Código: GEN_000324
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GLUCOSA
Código: GLU
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (60 - 110)

Descripción: GLUCOSA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: LIQLCGLU
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Líquido Bioquímica
Comentario adicional:
Valores de referencia: (50 - 80)

Descripción: GLUCOSA EN ORINA
Código: GLUCOSA
Técnica:
Unidades: g/L
Plazo: 3 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: GLUCOSA ORINA (GLUCOSURIA)
Código: GLU2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: g/L
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción:	GLUCOSA POSTPRANDIAL 1 HORA SUERO
Código:	GLUPOST1H
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero 60 Minutos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 180)

Descripción:	GLUCOSA POSTPRANDIAL 2 HORAS SUERO
Código:	GLUPOST2H
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero 120 minutos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 140)

Descripción:	GLUCOSA TRAS INGESTA DE 50 G. DE GLUCOSA
Código:	GLUINGESTA
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero 60 Minutos
Comentario adicional:	1h. tras ingesta de 50 g. de glucosa
Valores de referencia:	(Inf. 140) Raza blanca (Inf. 130) Raza negra (Inf. 145) Filipinas (Inf. 150) Asiáticas

Descripción:	Glucosa-6-P-Deshidrogenasa
Código:	G6PDB
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular.
Unidades:	mU/10^9 eritr.
Plazo:	3 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 mL sangre total EDTA. Alt. 1 mL Sangre total Heparina litio (Refrigerado) Alt. 1 mL Sangre total Citrato sódico (Refrigerado)
Valores de referencia:	(221.0 - 570.0)

Descripción:	Glutamato Deshidrogenasa (GLDH)
Código:	GLDH
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular
Unidades:	U/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero o plasma heparina
Valores de referencia:	(Inf. 4) Hombre (Inf. 3) Mujer

Descripción: GLUTATION PEROXIDASA ERITROCITARIA
Código: GLUTATION
Técnica: Téc. espectrofotometría ultravioleta
Unidades: U/g Hb
Plazo: 18 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 1 mL sangre total heparina
Valores de referencia: (27.5 - 73.6)

Descripción: Glutation Reductasa/Hemoglobina
Código: GLUTAREDUC
Técnica: Espectrometría de Absorción Molecular
Unidades: U/L
Plazo: 14 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero. Congelar inmediatamente
Valores de referencia: (42 - 80)

Descripción: GM1 AC. IgM LCR (GANGLIOSIDO M1)
Código: GM1ACLCR
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: GM1 AC.IgM SUERO (GANGLIOSIDOS M1)
Código: GM1AC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: GOBLET CELLS ANTICUERPOS IGG EN SUERO
Código: GOBLETACG
Técnica: Técnica IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 45 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo Título < 1:10

Descripción: GONOCOCO ANTIGENO MUESTRA GENITAL (TEST RAPIDO)
Código: GONOCOCO
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 1 días

Descripción: GONOCOCO ANTIGENO MUESTRA GENITAL (TEST RAPIDO)
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional: Exclusivamente muestras genitales: uretral, cervical y vaginal, obtenidas con la misma TORUNDA ESPECIAL que Chlamydia (de rayón o tacron). No admite torunda de algodón.
Valores de referencia:

Descripción: GPT (VITROS)
Código: GPTV
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 ºC
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Alternativa sangre total Heparina de litio
Valores de referencia: (0 - 50) Hombre
(0 - 35) Mujer

Descripción: GQ1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GQ1B)
Código: GANGGQ1B
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: Se recomienda realizar análisis simultaneo en suero y LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: GRASA TOTAL EN HECES
Código: GRASAHEC
Técnica: Técnica colorimétrica
Unidades: g/24h
Plazo: 11 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 1 g Heces 72h. (alícuota).Congelar.
Paciente:Tres días antes y durante la toma de muestra, seguir una dieta con 100 g de grasa al día.
Evitar que la toma de muestra coincida con la administración de algún contraste para exploración radiológica.Toma muestra:Durante la recolección mantener refrigerado.
Congelar la muestra inmediatamente.Petición:Se requiere el peso de la muestra.
Valores de referencia: (Inf. 2) < 6 años
(Inf. 7) > 6 años

Descripción: Greig, Sd. Sec Gen: GLI3
Código: GEN_000405
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GRIPE A/H1N1 AC. SUERO
Código: GRIPEAAC
Técnica: Hemaglutinación.

Descripción: GRIPE A/H1N1 AC. SUERO
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia:

Descripción: Griscelli, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000406
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GRUPO SANGUINEO
Código: GS
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 ml sangre total Heparina litio (Refrigerado). Se requiere información clínica
Valores de referencia:

Descripción: GRUPO SERICO
Código: GSSERICO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: GUANIDINOACETATO
Código: ACGUANIAC
Técnica: HPLC-Espectrometría de masas
Unidades: mmol/mol creat.
Plazo: 20 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 15 ml de Orina CONGELADA
Se requiere Fecha de nacimiento e información clínica
Valores de referencia: (13.0 - 124.0) < 6 años
(8.0 - 94.0) 7 años - 16 años
(11.0 - 84.0) > 17 años

Descripción: H1N1 RNA RT-PCR Cualitativa
Código: GRIPEAH1N1
Técnica: RT-PCR
Unidades:

Descripción: H1N1 RNA RT-PCR Cualitativa
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: torunda especial para virus RNA.
Valores de referencia:

Descripción: HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO b AC.IGG SUERO
Código: HAEMOBIGG
Técnica: EIA
Unidades: mcg/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Sup. 1) Niveles protectores

Descripción: Haemophylus ducreyi DNA PCR muestra
Código: HAEMDUCPCR
Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR (PCR) A TIEMPO REAL
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Muestra cervical, uretral, vaginal, anal, esperma. Refrigerado
Utilizar escobillon con medio de transporte para PCR, pedir a Almacen

Muestra faríngea. Refrigerado
Valores de referencia:

Descripción: Haloperidol en suero
Código: HALOPERI
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma (Refrigerado)
Valores de referencia: (5.0 - 17)

Descripción: HAPTOGLOBINA
Código: HAPTO
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero.
NOTA TECNICA ABBOTT (21-5-2019) NO SE PUEDE UTLIZAR EDTA Alternativa plasma heparina.
Valores de referencia: (30 - 200)

Descripción: HARMONY MÁS DELECCIÓN 22q11.2
Código: HARMON22Q
Técnica: Microarray
Unidades:

Descripción: HARMONY MÁS DELECCIÓN 22q11.2
Plazo: 9 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: HARMONY TEST PRENATAL (T21, T18, T13)
Código: HARMOBASIC
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: HARMONY TEST PRENATAL CON ANEUPLIODIAS SEXUALES
Código: HARMONANEU
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo:
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: HARMONY TEST PRENATAL CON MONOSOMÍA X
Código: HARMONMONX
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo:
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: HARMONY TEST PRENATAL CON SEXO FETAL
Código: HARMONSEXO
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo:
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: Hay-Wells; Sd.AEC, Sd. Sec Gen: TP63
Código: GEN_000407
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HBV DNA PCR Cualitativa (hepatitis B)
Código: HBDNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: HBV DNA PCR Cualitativa en PBMCs (hepatitis B)
Código: HBVPBMC
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: HBV DNA PCR Cuantitativa (hepatitis B)
Código: DNAHBHIB
Técnica: PCR cuantitativa
Unidades: copias HBV/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: HBV DNA PCR mutaciones en HbsAg (hepatitis B)
Código: HBSAGMUT
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: HBV DNA PCR mutaciones en Precore (hepatitis B)
Código: HBVMUTPC
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: HBV DNA PCR mutaciones gen HBpol (hepatitis B)
Código: HBVMUT
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:

Descripción: HBV DNA PCR mutaciones gen HBpol (hepatitis B)
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: HBV DNA Semen PCR Cualitativa (hepatitis B)
Código: DNABSEME
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Semen fresco y lavado o solo fresco
Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales.
Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia:

Descripción: HBV DNA Semen Urgente (hepatitis B)
Código: DNABSEMEUR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo:
Tubo: Semen
Comentario adicional: Semen fresco y lavado o solo fresco
Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales.
Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia:

Descripción: HCG POR VIDAS (GONADOTROFINA CORIONICA)
Código: HCG
Técnica: Técnica ELFA
Unidades: mU/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 4) Mujer
(1500 - 23000) Mujer 4- 5 semanas
(3400 - 135300) Mujer 5-6 semanas
(10500 - 161000) Mujer 6- 7 semanas
(18000 - 209000) Mujer 7- 8 semanas
(37500 - 219000) Mujer 8- 9 semanas
(42800 - 218000) Mujer 9- 10 semanas
(33700 - 218700) Mujer 10-11 semanas
(21800 - 193200) Mujer 11- 12 semanas
(20300 - 166100) Mujer 12-13 semanas
(15400 - 190000) Mujer 13-14 semanas
(2800 - 176100) Mujer 2º trimestre (14-26)
(2800 - 144400) Mujer 3º trimestre (26-39)

Descripción: HCG-BETA LIBRE SUERO
Código: BETAHCGL
Técnica: ICMA

Descripción: HCG-BETA LIBRE SUERO
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. No hay muestra alternativa.
Valores de referencia:
= 55.13 ng/ml -Embarazo - 8 semanas
= 72.55 ng/ml -Embarazo - 9 semanas
= 60.67 ng/ml-Embarazo - 10 semanas
= 44.54 ng/ml -Embarazo - 11 semanas
= 34.33 ng/ml-Embarazo - 12 semanas
= 28.82 ng/ml-Embarazo - 13 semanas

Descripción: HCG-BETA SUERO (GONADOTROFINA CORIONICA)
Código: BHCG.1
Técnica: ICMA
Unidades: mIU/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(Inf. 5) Mujer
(0 - 50) Mujer 0- 1 sem.gest.
(40 - 300) Mujer 1- 2 sem.gest.
(100 - 1000) Mujer 2- 3 sem.gest.
(500 - 6000) Mujer 3- 4 sem.gest.
(5000 - 20000) Mujer 1- 2 mes.gest.

Descripción: HCV RNA RT-PCR Cualitativa (hepatitis C)
Código: HCRNA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, si pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: HCV RNA RT-PCR Cualitativa en PBMCs (hepatitis C)
Código: HCVPBMC
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: HCV RNA RT-PCR Cualitativa por ultracentrifugacion
Código: HCRNAULTRA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Descripción: HCV RNA RT-PCR Cualitativa por ultracentrifugacion
Valores de referencia:

Descripción: HCV RNA RT-PCR Cuantitativa (hepatitis C)
Código: RNACCUAN
Técnica: RT-PCR cuantitativa
Unidades: UI HCV RNA/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: HCV RNA RT-PCR Genotipo (hepatitis C)
Código: VHC
Técnica: RTPCR y nested PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: HCV RNA Semen RT-PCR Cualitativa (hepatitis C)
Código: RNACSEME
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Semen fresco y lavado o solo fresco
Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales.
Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia:

Descripción: HCV RNA Semen Urgente (hepatitis C)
Código: RNACSEMEUR
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo:
Tubo: Semen
Comentario adicional: Semen fresco y lavado o solo fresco
Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales.
Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia:

Descripción: HCV: gen NS3 mutación Q80K (sec. Sanger)
Código: Q80K_NS3
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Descripción: HCV: gen NS3 mutación Q80K (sec. Sanger)
Valores de referencia:

Descripción: HDL COLESTEROL
Código: HDL
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Sup. 40)

Descripción: HDL2/HDL3 COLESTEROL SUERO
Código: HDL2_HDL3
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo:
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(35 - 55) Hombre COLESTEROL HDL
(5 - 15) Hombre COLESTEROL HDL2
(30 - 40) Hombre COLESTEROL HDL3
(42 - 68) Mujer COLESTEROL HDL
(11 - 25) Mujer COLESTEROL HDL2
(31 - 43) Mujer COLESTEROL HDL3

Descripción: HDV RNA RT-PCR Cualitativa + Genotipo (hepatitis delta)
Código: RNADELTA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: HDV RNA RT-PCR Cuantitativa (hepatitis delta)
Código: DELTACUAN
Técnica: RT-PCR cuantitativa
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: HE4 (PROTEINA EPIDIDIMAL HUMANA)
Código: HE4
Técnica: ICMA
Unidades: pmol/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL

Descripción: HE4 (PROTEINA EPIDIDIMAL HUMANA)
Valores de referencia: (Inf. 92) Mujer > 14 años Premenopausia
(Inf. 121) Mujer > 14 años Postmenopausia

Descripción: HELICOBACTER PYLORI AC. IGA SUERO
Código: CAMPYLOACA
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero o plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 15) Negativo
(15 - 20) Indeterminado

Descripción: HELICOBACTER PYLORI AC. IGG SUERO
Código: CAMPYLOACG
Técnica: ICMA
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.0) Negativo
(Sup. 1.0) Positivo

Descripción: HELICOBACTER PYLORI AC. IGM SUERO
Código: CAMPYLOACM
Técnica: EIA
Unidades: .
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.0) Negativo
(1.0 - 1.2) Indeterminado
(Sup. 1.2) Positivo

Descripción: Helicobacter pylori DNA PCR Cualitativa
Código: HELIPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: muestra sin pasar por ningún aparato, y rotulada con BM.
Muestra: heces, tejido.
Valores de referencia:

Descripción: Helicobacter pylori, Test de aire aspirado
Código: CAMPYALI
Técnica: Espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento

Descripción: Helicobacter pylori, Test de aire aspirado
Comentario adicional: Hacer a partir de 5 años , antes no hay estudios que valoren los resultados
Valores de referencia:

Descripción: HEMATIES EN EXUDADO
Código: LIQEXUHEM
Técnica: Microscopía óptica
Unidades: /µL
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HEMATIES EN LIQUIDO ASCITICO
Código: LIQASCHEM
Técnica: Microscopía óptica
Unidades: /µL
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HEMATIES EN LIQUIDO PLEURAL
Código: LIQPLHEM
Técnica: Microscopía óptica
Unidades: /µL
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Hemidisplasia congénita eritrodermia. Sec Gen: NSDHL
Código: GEN_000408
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hemiplejia alternante de la infancia. Sec Gen: ATP1A3
Código: GEN_000409
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis 3 (HFE3): gen TFR2 (NGS)
Código: HFE3

Descripción: Hemocromatosis 3 (HFE3): gen TFR2 (NGS)
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis hereditaria: gen HFE (NGS)
Código: HFE_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis hereditaria: mutaciones C282Y, H63D, S65C HFE
Código: PCRHEMO
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario de EDTA sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis juvenil 2A (HFE2A): gen HFE2 (NGS)
Código: HFE2A
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis juvenil 2B (HFE2B): gen HAMP (NGS)
Código: HFE2B
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis: <10 genes (NGS)
Código: HEMOCROMAT
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hemofilia A: gen F8 (NGS e inversión)
Código: HEMOFILIAA
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hemofilia B: gen F9 (NGS)
Código: HEMOFILIAB
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hemofilia. Panel NGS
Código: GEN_000410
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HEMOGLOBINA A2
Código: HBA2
Técnica: HPLC
Unidades: %
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (2.0 - 3.5)

Descripción: HEMOGLOBINA EN ORINA POR ELECTROFORESIS
Código: HEMOGLURIA

Descripción:	HEMOGLOBINA EN ORINA POR ELECTROFORESIS
Técnica:	Electroforesis
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	HEMOGLOBINA FETAL
Código:	HBFETAL
Técnica:	HPLC
Unidades:	%
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL EDTA/Heparina Li. Proteger de la Luz.
Valores de referencia:	(Inf. 92) 0-2 meses (Inf. 90) 2-3 meses (Inf. 42) 3-6 meses (Inf. 17) 6-9 meses (Inf. 10) 9-12 meses (Inf. 6.3) 1-2 años (Inf. 1.0) > 2 años

Descripción:	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)
Código:	HBA1C
Técnica:	
Unidades:	%
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 5.6) Normal

Descripción:	HEMOGLOBINA LIBRE
Código:	HGBLIBRE
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular.
Unidades:	g/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	2ml de plasma citrato
Valores de referencia:	(Inf. 0.04)

Descripción:	HEMOGLOBINA SANGRE
Código:	HGB
Técnica:	
Unidades:	g/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(13.5 - 18) Hombre (12 - 16) Mujer

Descripción: HEMOGLOBINAS ELECTROFORESIS SANGRE
Código: HBELEC
Técnica: Electroforesis
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: HPN
Descripción: HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA
Técnica: Citometría de flujo
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CD59		CD59 (HEMATIES)	%	
Prueba	CD24GRA		CD24 (GRANULOCITOS)	%	
Prueba	FLAERGRA		FLAER (GRANULOCITOS)	%	
Prueba	CD14MON		CD14 (MONOCITOS)	%	
Prueba	FLAERMON		FLAER (MONOCITOS)	%	

Descripción: HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA SCREENING
Código: HPNSCREEN
Técnica: Microtipaje en columnas de gel
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 10 mL Sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: Hemoglobinuria paroxística nocturna. Sec Gen: PIGA
Código: GEN_000411
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hemopexina en suero
Código: HEMOPEXINA
Técnica: Inmuno Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 14 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: También se realiza en líquidos biológicos.

Descripción: Hemopexina en suero
Valores de referencia: (50 - 115)

Descripción: HEMORRAGIAS OCULTAS
Código: HEMOC
Técnica: Inmunoensayo
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: FOB
Comentario adicional: Mantener refrigerado tubo recolector de heces del kit, máximo 5 días.
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: HEMOSIDERINA ORINA
Código: HEMOSI2
Técnica: Tinción de Perls
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HEPATITIS A AC. IGG SUERO
Código: HAACG
Técnica: Técnica CMIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HEPATITIS A AC. IGM
Código: HAACM
Técnica: Técnica ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.2) Indeterminado

Descripción: HEPATITIS B AC. SUPERFICIE
Código: HBACS
Técnica: Téc. ICMA
Unidades: mUI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Sup. 10) Niveles de Ac. protectores en personas vacunadas

---

Descripción: HEPATITIS B AC.ANTI CORE IGM
Código: HBACCM

Descripción: HEPATITIS B AC.ANTI CORE IGM
Técnica: ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.99) Negativo

Descripción: HEPATITIS B AC.ANTI-CORE
Código: AHBACC
Técnica: Técnica ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo

Descripción: HEPATITIS B ANTICUERPOS ANTI-E
Código: HBACE
Técnica: Técnica ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE
Código: HBAGS
Técnica: Técnica ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.99) Negativo

Descripción: HEPATITIS B ANTIGENO E
Código: HBAGE
Técnica: Técnica ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.99) Negativo
(1.00 - 1.19) Indeterminado

Descripción: HEPATITIS B CONFIRMACION DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE
Código: HBSCONF
Técnica: CMIA con neutralización con anticuerpos específicos
Unidades:
Plazo: 5 días

Descripción: HEPATITIS B CONFIRMACION DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero o plasma (Edta, litio, heparina)
Valores de referencia:

Descripción: Hepatitis B Delta Ac. Suero
Código: HBDELTAACG
Técnica: Técnica EIA
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HEPATITIS B DELTA AC. IGM
Código: HBDELTAACM
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: Indice
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: Hepatitis B Delta Antígeno , Suero
Código: HBDAG
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HEPATITIS C ANTICUERPOS IgG
Código: HCACG
Técnica: Técnica ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo
(0.90 - 1.10) Indeterminado

Descripción: HEPATITIS C CONFIRMACION E IDENTIFICACION ANTICUERPOS
Código: HCCONF
Técnica: (Téc. inmunoblot 3ª generación)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: HEPATITIS C CONFIRMACION E IDENTIFICACION ANTICUERPOS
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: HEPATITIS E AC. IGG SUERO
Código: HEACG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades: Indice
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa plasma.
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción: HEPATITIS E ANTICUERPOS IGM
Código: HEACM
Técnica: Técnica CLIA
Unidades: Indice
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa plasma.
Valores de referencia: (0.4 - 0.5) Indeterminado
(Inf. 0.4) Negativo

Descripción: Hepatitis E virus RNA PCR Cualitativa
Código: VHEPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2mL de suero.
Alternativo: Plasma de EDTA, Sangre Total, Heces.
Valores de referencia:

Descripción: HEPCIDINA (25-BIOACTIVA) SUERO
Código: HEPCIDINA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis.
Unidades: ng/mL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (1.49 - 41.46)

Descripción: Hermansky-Pudlak, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000412
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Hermansky-Pudlak, Sd. Panel NGS
Valores de referencia:

Descripción: Herpes 1 y 2 PCR Cualitativa + Genotipo
Código: HSVPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Muestras: suero, plasma, LCR, torunda seca, heces, orina, etc.
Valores de referencia:

Descripción: Herpes 6 DNA PCR Cualitativa
Código: DNAHERP6
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Muestra: suero, plasma, sangre, LCR, orina, torunda seca, tejido, etc.
Valores de referencia:

Descripción: Herpes 7 DNA PCR
Código: DNAHERP7
Técnica: Hibridación Molecular (PCR) a Tiempo Real
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Sangre y derivados (minimo 1mL) Refrigerado.
500 µL LCR, médula osea.
Valores de referencia:

Descripción: Herpes 8 DNA PCR Cualitativa
Código: DNAHERP8
Técnica: Hibridación Molecular (PCR) a Tiempo Real
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Sangre total(EDTA), suero o plasma, LCR. Refrigerado.
Biopsia de lesion tumoral o cutanéa.
Las muestras recogidas con escobillon tienen que llevar medio de transporte para virus, solicitar a Almacen
Valores de referencia:

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO I AC. IGG SUERO (HOMINIS)
Código: HERPES1ACG
Técnica: Téc. ECLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa: Plasma (heparina, edta)

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO I AC. IGG SUERO (HOMINIS)
Valores de referencia: (Inf. 0.59) Negativo
(0.60 - 0.99) Indeterminado
(Sup. 1.0) Positivo

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO I AC. IGM SUERO (HOMINIS)
Código: HERPES1ACM
Técnica: Téc. EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO I AG. EN LESION
Código: HERPES1LES
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional: Torunda especial (amarilla), sin medio, (no algodón)
Valores de referencia:

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO I ANTICUERPOS IGG EN LCR
Código: HERP1GLC
Técnica: Téc. EIA
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO I ANTICUERPOS IGM EN LCR
Código: HERP1MLC
Técnica: Téc. EIA
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO II AC. IGG SUERO (HOMINIS)
Código: HERPES2ACG
Técnica: Téc. CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Muestra alternativa: Plasma (heparina, edta).

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO II AC. IGG SUERO (HOMINIS)
Valores de referencia:	(Inf. 0.50) Negativo (0.51 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1) Positivo

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO II AC. IGM SUERO (HOMINIS)
Código:	HERPES2ACM
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO II ANTICUERPOS IGG EN LCR
Código:	HERP2GLC
Técnica:	Téc. EIA
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO II ANTICUERPOS IGM EN LCR
Código:	HERP2MLC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	HERPES SIMPLEX TIPO II AG. EN LESION
Código:	HERPES2LES
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Microbiología
Comentario adicional:	Torunda específica (amarilla)
Valores de referencia:	

Descripción:	HERPES VIRUS 1/2 ANTICUERPOS IgM
Código:	HERPES1_2M
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: HERPES VIRUS 1/2 ANTICUERPOS IgM
Comentario adicional: El ensayo se puede efectuar en muestras de suero o plasma humano. Se pueden utilizar anticoagulantes como el citrato, el EDTA y la heparina
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 6 AC. IGG
Código: HERPES6ACG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.80) Negativo
(0.81 - 1.00) Indeterninado
(Sup. 1.01) Positivo

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 6 AC. IGM
Código: HERPES6ACM
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo < 20
= Positivo > 20

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 6 ANTICUERPOS IGG EN LCR
Código: HERP6GLC
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR,se recomienda efectuar análisis simultaneo en suero y LCR
Valores de referencia: = Positivo título >1:1

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 6 ANTICUERPOS IGM EN LCR
Código: HERP6MLC
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml de LCR , se recomienda efectuar análisis simultaneo en suero y LCR
Valores de referencia: = Positivo titulo >1:1

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 7 AC. IGG
Código: HERPES7ACG
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 7 AC. IGG
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: =<1:20 Título<1:20 Negativo
=>1:20 Título>o=1:20 Positivo

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 7 AC. IGM
Código: HERPES7ACM
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: =<1:20 Título<1:20 Negativo
=>1:20 Título>o=1:20 Positivo

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 8 AC. IGG
Código: HERPES8ACG
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: =<1:64 Negativo <1:64
=>1:64 Positivo >1:64

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 8 AC. IGM
Código: HERPES8ACM
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: =<1:20 Negativo <1:20
=>1:20 Positivo >1:20

Descripción: HERPESVIRUS 1/2 ANTICUERPOS IgG
Código: HERPES1_2G
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: El ensayo se puede efectuar en muestras de suero o plasma humano. Se pueden utilizar anticoagulantes como el citrato, el EDTA y la heparina
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.10) Indeterminado

Descripción: Heteroplasia progresiva ósea. Sec Gen: GNAS
Código: GEN_000413
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Heteroplasia progresiva ósea. Sec Gen: GNAS
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Heterotopia periventricular ligada al X. Panel NGS
Código: GEN_000414
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Heterotopía periventricular ligada al X. Sec Gen: WAS
Código: GEN_000415
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HEXANODIONA 2,5 ORINA
Código: HEXANODION
Técnica: Cromatografía de gases. Ionización de llama
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral.
Valores de referencia: (Inf. 0.4) Final de jornada (exposición a Hexano o Metil-N-butilcetona)

Descripción: HGV RNA RT-PCR Cualitativa
Código: HGRNA
Técnica: RTPCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, si pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: HGV RNA RT-PCR Cuantitativa
Código: RNAGCUAN
Técnica: RTPCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Hialuronidasa anticuerpos
Código: HIALUROAC
Técnica: Hemaglutinación
Unidades: U/mL
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 300)

Descripción: Hibridación en arrays CGH180K: deleci. y ganancias de ADN
Código: ARRAY180K
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Sangre total en EDTA
Valores de referencia:

Descripción: Hibridación en arrays CGH400K: deleci. y ganancias de ADN
Código: ARRAY400K
Técnica: ARRAY CGH
Unidades:
Plazo: 35 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre total en EDTA
Valores de referencia:

Descripción: Hibridación en arrays: deleciones y ganancias de ADN
Código: CGHARRAY
Técnica: aCGH
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: tubo de EDTA sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Hidrocefalia ligada al X. Sec Gen: L1CAM
Código: GEN_000416
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hidropesía fetal no autoinmune. Sec Gen: EPHB4
Código: GEN_000417
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Hidropesía fetal no autoinmune. Sec Gen: EPHB4
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hidroxibutirato Beta en suero
Código: BETAOHBUTI
Técnica: Espectrometría de absorción molecular
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero congelado
Valores de referencia: (Inf. 3.1) < 14 años
(Inf. 4.4) > 14 años

Descripción: HIDROXIBUTIRATO BETA EN ORINA
Código: BETAOHBUTO
Técnica: Enzimática-Espectrofotometría ultravioleta
Unidades: mg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10)

Descripción: Hidroxipireno (Exposicion al Alquitran), Orina
Código: HIDROPIREN
Técnica: H.P.L.C.
Unidades: mcg/g creatin.
Plazo: 16 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 20ml orina
Final de la jornada laboral
Valores de referencia: (Inf. 2) Final jornada laboral

Descripción: HIDROXIPROGESTERONA 17 ALFA
Código: OHPRO17
Técnica: CLIA
Unidades: ng/ml
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL suero. En recién nacidos es indispensable efectuar técnica de extracción, (distinta de la habitual),por lo que se debe indicar la edad del paciente. Hablar con envios externos
Valores de referencia: (0.0 - 16.8) 1 dia - 1 mes
(1.9 - 9.8) 1 mes - 2 meses
(0.1 - 4.0) 2 meses - 3 meses
(0.07 - 1.7) 3 años - 14 años
(0.5 - 2.1) Hombre > 14 años
(0.1 - 0.8) Mujer > 14 años Fase folicular
(0.6 - 2.3) Mujer > 14 años Fase lutea
(0.3 - 1.4) Mujer > 14 años Ovulación
(2.0 - 12.0) Mujer > 14 años Tercer trimestre
(0.13 - 0.51) Mujer > 14 años Postmenopáusica

Descripción: HIDROXIPROGESTERONA 17-ALFA 60 MINUTOS
Código: OHPRO17.60
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero 60 Minutos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HIDROXIPROLINA (NORDIN) MG/G CREATININA
Código: OHPROMG
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/g Creatinina
Plazo: 8 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (19 - 36)

Descripción: HIDROXIPROLINA EN ORINA (MG/24 HORAS)
Código: OHPRO.MG.H
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficiencia
Unidades: mg/24h
Plazo: 8 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 42.0)

Descripción: HIDROXITRIPTOFANO-5 ORINA
Código: HIDROXITRI
Técnica: H.P.L.C.-Fluorimetría
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 12 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 150)

Descripción: HIERRO
Código: FE
Técnica:
Unidades: µg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (59 - 160) Hombre
(37 - 160) Mujer

Descripción: HIERRO ORINA
Código: FE2
Técnica: Espectrofotometía de absoción atómica
Unidades: mcg/24 h.

Descripción: HIERRO ORINA
Plazo: 9 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 150)

Descripción: Hígado graso no alcohólico, enf. de. Gen: PNPLA3
Código: GEN_000418
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperaldosteronismo familiar 1. Sec Gen: CYP11B2
Código: GEN_000420
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperaldosteronismo familiar. Sec Gen: CYP11B1
Código: GEN_000421
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperaldosteronismo primario: gen de fusión Cyp11b1-Cyp11b2
Código: CYP11B2
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipercalcemia hipocalciúrica familiar: gen CASR (NGS)
Código: HIPERCALC
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Hipercalcemia hipocalciúrica familiar: gen CASR (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: HiperCKemia asintomática: gen ANO5 (NGS)
Código: ANO5
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar. Panel NGS
Código: GEN_000423
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar: >10 genes (NGS)
Código: HIPERCOLES
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar: gen LDLR (NGS)
Código: LDLR
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar: gen LDLRAP1 (NGS)
Código: LDLRAP1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Hipercolesterolemia familiar: gen LDLRAP1 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar: gen PCSK9 (NGS)
Código: PCSK9
Técnica: PCR y seucenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hiperekplexia hereditaria. Sec Gen: SLC6A5
Código: GEN_000424
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperferritinemia con cataratas congénitas: gen FTL (NGS)
Código: FTL
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM.
Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperinsulinismo congénito (CHI). Panel NGS
Código: GEN_000425
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperinsulinismo-hiperamonemia, Sd. Sec Gen: GLUD1
Código: GEN_000426
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Hiperinsulinismo-hiperamonemia, Sd. Sec Gen: GLUD1
Valores de referencia:

Descripción: Hiperlipemias: >10 genes (NGS)
Código: HIPERLIPEM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hiperlipoproteinemia 1 y 5: déficit lipoproteína lipasa. LPL
Código: GEN_000427
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperlipoproteinemia tipo 1: genes LPL y APOC2 (NGS)
Código: LPL_APOC2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipermetioninemia. Sec Gen: MAT1A
Código: GEN_000428
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperoxaluria primaria. Panel NGS
Código: GEN_000429
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperparatiroidismo 2 (HRPT2): gen CDC73 (NGS)
Código: CDC73
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hiperparatiroidismo familiar. Panel NGS
Código: GEN_000430
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperplasia suprarren. congénita 2: gen HSD3B2 (NGS)
Código: HSD3B2
Técnica: NGS con TSO de Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperplasia suprarrenal def. 17-alfa-hidroxilasa. CYP17A1
Código: GEN_000431
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperprolinemia. Panel NGS
Código: GEN_000432
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipertensión pulmonar primaria. Sec Gen: BMPR2
Código: GEN_000433
Técnica:

Descripción: Hipertensión pulmonar primaria. Sec Gen: BMPR2
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipertermia maligna muscular. Sec Gen: RYR1
Código: GEN_000434
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipertermia maligna: <10 genes (NGS)
Código: HIPERT_MAL
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipertrofia muscular asociada a miostatina. Sec Gen: MSTN
Código: GEN_000435
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia acueducto vestibular dilatado, AR. SLC26A4
Código: GEN_000437
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia asociada a OTOF: gen OTOF (NGS)
Código: OTOF
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Hipoacusia asociada a OTOF: gen OTOF (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita ligada a X. Sec Gen: POU3F4
Código: GEN_000438
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita no sindrómica. Screening
Código: GEN_000443
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita. Panel
Código: GEN_000436
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita. Sec Gen: GJB2. Mutación 35delG
Código: GEN_000439
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita. Sec Gen: GJB3
Código: GEN_000441
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000444
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria: >10 genes (NGS)
Código: HIPOACUHER
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria: gen GJB2 (NGS)
Código: GJB2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria: gen GJB6 (NGS)
Código: GJB6
Técnica: NGS con TSO Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia neurosensorial no sind. mtADN. MTRNR1. Mut A1555G
Código: GEN_000445
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia y sordera no sindr. mitocondrial: sec gen MT-RNR1
Código: MT_RNR1

Descripción: Hipoacusia y sordera no sindr. mitocondrial: sec gen MT-RNR1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipobetalipoproteinemia: genes APOB y ANGPTL3 (NGS)
Código: HIPOBETALI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipocondrogénesis. Panel
Código: GEN_000446
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipocondroplasia estudio ampliado: genes FGFR2, FGFR3 y SHOX
Código: HIPOCONAMP
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipocondroplasia: secuenciación gen FGFR3
Código: HIPOCONDRO
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: HIPOFISIS AC. SUERO
Código: HIPOFIAC
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta

Descripción: HIPOFISIS AC. SUERO
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = < 1/10 Negativo

Descripción: Hipofosfatasia: secuenciación gen ALPL
Código: ALPL
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipoglucemia >10 genes (NGS)
Código: HIPOGLUCEM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA marcado con BM, sin manipular
Valores de referencia:

Descripción: Hipogonadis. hipogonadotr.: genes LEP, LEPR y PCSK1 (NGS)
Código: HIPOGONADI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipogonadismo congénito. Panel NGS
Código: GEN_000448
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipogonadismo hipogonadotrófico 3 con o sin anosmia.PROKR2
Código: GEN_000449
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Hipogonadismo hipogonadotrófico 3 con o sin anosmia.PROKR2
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipogonadismo hipogonadotrófico. Sec Gen: LHB
Código: GEN_000450
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipomagnesemia renal tipo 1. Sec Gen: TRPM6
Código: GEN_000451
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipomielinización y catarata congénita. Sec Gen: FAM126A
Código: GEN_000452
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoparatiroidismo. Panel NGS
Código: GEN_000453
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia adrenal congénita. Sec Gen: NROB1
Código: GEN_000454
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia células de Leydig por resistencia a LH. LHCGR
Código: GEN_000456
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia cerebelosa. Sec Gen: VLDLR
Código: GEN_000455
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia dérmica focal. Sec Gen: PORCN
Código: GEN_000457
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia pontocerebelar. Panel NGS
Código: GEN_000458
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia suprarrenal congénita ligada al X. Gen: NR0B1
Código: GEN_000460
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipotiroidismo congénito. Sec Gen: TRHR
Código: GEN_000461
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Hipotiroidismo congénito. Sec Gen: TRHR
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HIPROCRETINA-1 (OREXINA-A) EN LCR
Código: HIPOCRETIN
Técnica: Radioinmunoensayo
Unidades: pg/ml
Plazo: 20 días
Tubo: Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional: 1 ml LCR CONGELADO.
Se requiere información clínica
Valores de referencia: (Sup. 200)

Descripción: Hirschsprung, enfermedad de. Panel Ampliado NGS
Código: GEN_000328
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hirschsprung, enfermedad de. Panel NGS
Código: GEN_000462
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HISTAMINA ORINA
Código: HISTAMI2
Técnica: Radioinmunoensayo
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 8 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL orina de 24h (alicuota) (Congelada). Indicar volumen, se requiere la diuresis. TEMPERATURA CONGELADA.
Valores de referencia: (Inf. 61)

Descripción: HISTAMINA PLASMA
Código: HISTAMINA
Técnica: EIA
Unidades: ng/ml
Plazo: 6 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL Plasma EDTA CONGELADO,
Valores de referencia: (Inf. 1.0)

Descripción: HISTAMINA SANGRE TOTAL HEPARINA
Código: HISTAMSANG
Técnica: Radioinmunoensayo
Unidades: mcg/dl
Plazo: 9 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 1 ml sangre total heparina, evitar sangre EDTA
Valores de referencia: (2 - 20)

Descripción: Histidinemia. Sec Gen: HAL
Código: GEN_000463
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HISTONAS AC. IGG SUERO
Código: HISTONASAC
Técnica: Técnica ELISA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero alternativo plasma de EDTA o plasma citrato
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Histoplasma capsulatum PCR cualitativa
Código: HISTOP_PCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HISTOPLASMOSIS AC. SUERO (HISTOPLASMA CAPSULATUM)
Código: HISTOPLAAC
Técnica: Aglutinación de partículas latex
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL suero. Alt. 1mL plasma EDTA tripotásico
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: HLA ANTICUERPOS SUERO
Código: HLAAC
Técnica: Tecnica bead array, luminex

Descripción: HLA ANTICUERPOS SUERO
Unidades:
Plazo: 33 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =Negativo Negativo

Descripción: HLA CW*06 relacionado con psoriasis por PCR
Código: HLACW06
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL de sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA DQ (DQB1/DQA1) TIPAJE SANGRE TOTAL
Código: HLADQT
Técnica: PCR - SSO
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL de sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: HLA DQA1/DQB1 Diabetes mellitus
Código: HLADIABE
Técnica: PCR e hibricación
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir y marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: HLA DR2 SANGRE
Código: HLADR2
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA DR3 EN SANGRE
Código: HLADR3
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 14 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia

Descripción: HLA DR3 EN SANGRE
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA DR4 EN SANGRE
Código: HLADR4
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 14 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA DR5 SANGRE
Código: HLADR5
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA DRB1 artritis reumatoide
Código: HLADRB1
Técnica: PCR e hibridación
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: HLA PGT Aneuploidias
Código: HLAPGTA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HLA PGT Monogenicas
Código: HLAPGTM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HLA-A TIPAJE DNA POR HIBRIDACIÓN MOLECULAR
Código: HLAAPCR
Técnica: Hibidación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL de sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA-A29 EN SANGRE
Código: HLAA29
Técnica: Test de citotoxicidad
Unidades: %
Plazo: 4 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 10 mL de sangre total Heparina litio.Envío a temperatura ambiente. Evitar envío los jueves y viernes.
Alt. EDTA
Valores de referencia: (Inf. 50) Negativo
(Sup. 50) Positivo

Descripción: HLA-B TIPAJE DNA POR HIBRIDACION MOLECULAR
Código: HLABLOCUS
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLAB*5701 relacionado con hipersensibilidad a Abacavir
Código: HLAB5701
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA-B14 EN SANGRE
Código: HLAB14
Técnica: Test de citotoxicidad
Unidades: %
Plazo: 4 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 10 mL de sangre total Heparina litio. Envío a temperatura ambiente. Evitar envío los jueves y viernes.
Valores de referencia: (Inf. 50) Negativo
(Sup. 50) Positivo

Descripción: HLAB27 antígeno de histocompatibilidad por CF
Código: HLAB27

Descripción: HLAB27 antígeno de histocompatibilidad por CF
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: HLAB27 antígeno de histocompatibilidad por PCR
Código: HLAB27_GEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código: HLAB5
Técnica: PCR-SSO (PCR SIngle Specific Oligonucleotid)
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA-B7 EN SANGRE
Código: HLAB7
Técnica: Test de citotoxicidad
Unidades: %
Plazo: 4 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 10 mL de sangre total Heparina litio.Envío a temperatura ambiente. Evitar envío los jueves y viernes.
Valores de referencia: (Inf. 50) Negativo
(Sup. 50) Positivo

Descripción: HLA-B8 EN SANGRE
Código: HLAB8
Técnica: Test de citotoxicidad
Unidades: %
Plazo: 4 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 10 mL de sangre total Heparina litio.Envío a temperatura ambiente. Evitar envío los jueves y viernes.
Valores de referencia: (Inf. 50) Negativo
(Sup. 50) Positivo

Descripción: HLA-C TIPAJE EN SANGRE
Código: HLACPCR

Descripción: HLA-C TIPAJE EN SANGRE
Técnica: Tipaje mediante el uso de sondas especificas SSO (Sequence Specific Oligonucleotide) unidas a microesferas Luminex (Lifecodes, Inmucor).
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: HLA-DQ2 EN SANGRE
Código: HLADQ2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA-DQ8 EN SANGRE
Código: HLADQ8
Técnica: DQ3
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HLA-DR TIPAJE DNA POR HIBRIDACIÓN MOLECULAR
Código: HLADRT
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 14 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL de Sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA-DR1 EN SANGRE
Código: HLADR1
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 14 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL Sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: HLA-DRB1-1501, HLA-DQA1-0102, y HLA-DQB1-0602
Código: NARCOLEPSI
Técnica: PCR e hibridación con sondas
Unidades:

Descripción: HLA-DRB1-1501, HLA-DQA1-0102, y HLA-DQB1-0602
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: HMGCR ANTICUERPOS SUERO (CoA reductasa)
Código: HMGCRAC
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 19 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL suero (REFRIGERADO)
Valores de referencia: (Inf. 20.00) Negativo

Descripción: Holoprosencefalia no sindrómica. Panel NGS
Código: GEN_000464
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Holotranscobalamina
Código: HOLOTRANSC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: pmol/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Sup. 60.00) Estado óptimo de Vit.B12

Descripción: Holt-Oram, Sd. Sec Gen: TBX5
Código: GEN_000465
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HOMOCISTEINA TOTAL EN SUERO
Código: HOMOCISTE
Técnica: Inmunoensayo turbidimétrico
Unidades: mcmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: HOMOCISTEINA TOTAL EN SUERO
Comentario adicional: 1 ml suero.
1 mL plasma EDTA/HEPARINA Litio
Valores de referencia: (4.44 - 13.56) Mujer
(5.46 - 16.20) Hombre

Descripción: HOMOCISTINA ORINA
Código: HOMOCIST
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades: mcmol/g crea.
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10mL orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 2)

Descripción: Homocistinuria Ampliado Panel NGS
Código: GEN_000468
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Homocistinuria def. cistationina beta sintasa: gen CBS (NGS)
Código: CBS
Técnica: NGS con TSOE Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Homocistinuria por déficit de MTHFR. Sec Gen: MTHFR
Código: GEN_000467
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Homocistinuria. Panel NGS
Código: GEN_000469
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Homocistinuria. Panel NGS
Valores de referencia:

Descripción: HONGOS DERMATOFITOS DNA PCR Cualitativa
Código: HONGOSPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HORMONA ANTIMULLERIANA ROCHE
Código: MULLERIANA
Técnica: ECLIA
Unidades: ng/ml
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero o plasma heparina. Preferible enviar congelado.
No emplear plasma con EDTA
Conveniente indicar edad y sexo
Valores de referencia: (1.43 - 11.60) Hombre
(1.52 - 9.95) Mujer 20 años - 24 años
(1.20 - 9.05) Mujer 24 años - 29 años
(0.71 - 7.59) Mujer 29 años - 34 años
(0.41 - 6.96) Mujer 34 años - 39 años
(0.06 - 4.44) Mujer 39 años - 44 años
(0.01 - 1.79) Mujer 44 años - 50 años
= Mujer Ovario Poliquístico:
(2.41 - 17.1) Mujer
= Mujer Reserva ovárica estimada:
(Inf. 0.68) Mujer Baja reserva ovárico
(0.68 - 2.27) Mujer Suficiente reserva ovárica
(Sup. 2.27) Mujer Reserva ovárica normal

Descripción: HORMONA DE CRECIMIENTO SUERO (HGH)
Código: GH
Técnica: Técnica Quimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HORMONA ESTIMULADORA DE MELANOCITOS (ALFA-MSH)
Código: MSH
Técnica: Técnica RIA
Unidades: pmol/L
Plazo: 31 días
Tubo: Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional: 2 mL plasma EDTA con aprotinina, separar y congelar inmediatamente
Tubo especial con aprotinina (TRASYLOL).

Descripción: HORMONA ESTIMULADORA DE MELANOCITOS (ALFA-MSH)
Valores de referencia: (9.0 - 18.0)

Descripción: HPV DNA PCR Cualitativa + Genotipo en zona genital
Código: PAPIGENI
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: torunda sin medio y rotulada con BM.
Valores de referencia:

Descripción: HPV16, HPV18 y 12 HPVs de alto riesgo mediante COBAS 4800
Código: HPV_ROCHE
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: torunda sin medio y rotulada con BM, muestra de citología líquida.
Valores de referencia:

Descripción: HSV1, HSV2, Herpes 6, Varicela zoster, Eps.-Barr, y CMV PCR
Código: HERPESPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para este procedimiento: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Muestras: suero, plasma, LCR, torunda seca, heces, orina, etc.
Valores de referencia:

Descripción: HTLV I/II AC. INMUNOBLOT
Código: HTLVBLOT
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: HTLV-1 Y 2 AC. SUERO
Código: HTLV1AC
Técnica: Técnica Inmunoanálisis. Hasta fecha 21-09-2011 Enzimoinmunoanálisis.
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero
Alternativa: Plasma de EDTA, CITRATO, HEPARINA LITIO Y HEPARINA SODIO.
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Hu (ANNA-1) AC. LCR
Código: ACHU.LCR
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia:

Descripción: Huella genética (DNI genético)
Código: HUELLAGEN
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional: Previo contacto con el laboratorio
Valores de referencia:

Descripción: HUESO NASAL AUSENTE
Código: HUESONASAL
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Hurler o MPS1, Sd. Sec Gen: IDUA
Código: GEN_000470
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: IA2 AC. SUERO
Código: IA.2AC
Técnica: ICMA
Unidades: UI/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero sin hemolisis
Valores de referencia: (Inf. 28) Negativo
(28 - 33) Indeterminado

Descripción: Ictiosis arlequín. Sec Gen: ABCA12
Código: GEN_000471
Técnica:
Unidades:

Descripción: Ictiosis arlequín. Sec Gen: ABCA12
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis con hipotricosis, AR. Sec Gen: ST14
Código: GEN_000472
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis epidermolítica. Sec Gen: KRT10
Código: GEN_000474
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis epidermolítica: genes KRT1 y KRT10 (NGS)
Código: ICTIO_EPID
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis folicular-atriquia-fotofobia, Sd. Gen: MBTPS2
Código: GEN_000475
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis lamelar. Sec Gen: TGM1
Código: GEN_000476
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Ictiosis lamelar. Sec Gen: TGM1
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis ligada al cromosoma X. Sec Gen: STS
Código: GEN_000477
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis vulgar. Sec Gen: FLG
Código: GEN_000478
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis y erirtroderma ictiosiforme. Panel NGS
Código: GEN_000479
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis-colangitis esclerosante neonatal, Sd. Gen: CLDN1
Código: GEN_000480
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Identificación bacteriana veterinaria
Código: IDENBACVET
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Microbiología veterinaria
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES
Código: IRREGUAC

Descripción: IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES
Técnica: Columna gel
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Se requiere suero y sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: IFAP, Sd. Sec Gen: MBTPS2
Código: GEN_000481
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: IGA SECRETORA LAGRIMAS (INMUNOGLOBULINA IGA LAGRIMAS)
Código: IGALA
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 0.5 mL Lagrimas en frasco esteril
Valores de referencia: (3 - 30)

Descripción: IGA SECRETORA MOCO NASAL (INMUNOGLOBULINA IGA-S MOCO NASAL)
Código: IGAMOCO
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 7 días
Tubo:
Comentario adicional: Muestra de moco nasal.
Valores de referencia: (Sup. 3.0)

Descripción: IGA SECRETORA SALIVA (INMUNOGLOBULINA IGA SALIVA)
Código: IGASA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: mcg/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1mL Saliva en frasco esteril
Valores de referencia: (40 - 170)

Descripción: IGE ESPECIFICAS (PERFIL EN MICROARRAYS) ISAC
Código: ALERGISAC
Técnica: Microarrays.
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Suero Congelado

Descripción:	IGE ESPECIFICAS (PERFIL EN MICROARRAYS) ISAC
Comentario adicional:	Suero congelado.
Valores de referencia:	(Inf. 0.3) Indetectable (0.3 - 0.9) Bajo (1 - 14.9) Moderado/Alto (Sup. 15) Muy alto

Descripción:	IGE MOCO NASAL (INMUNOGLOBULINA IGE MOCO NASAL)
Código:	IGEMOCO
Técnica:	Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	kU/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	IGF-1 (SOMATOMEDINA C)
Código:	SOMATOC
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	

Descripción: IGF-1 (SOMATOMEDINA C)

Valores de referencia:
(15.0 - 129) Hombre 1 mes - 3 años
(22 - 208) Hombre 3 años - 6 años
(40.1 - 255) Hombre 6 años - 9 años
(68.7 - 316) Hombre 9 años - 11 años
(143 - 506) Hombre 11 años - 13 años
(177 - 507) Hombre 13 años - 15 años
(173 - 414) Hombre 15 años - 18 años
(18.2 - 172) Mujer 1 mes - 3 años
(35.4 - 232) Mujer 3 años - 6 años
(56.9 - 277) Mujer 6 años - 9 años
(118 - 448) Mujer 9 años - 11 años
(170 - 527) Mujer 11 años - 13 años
(191 - 496) Mujer 13 años - 15 años
(190 - 429) Mujer 15 años - 18 años
(117 - 323) 18 años - 21 años
(98.7 - 289) 21 años - 24 años
(83.6 - 259) 24 años - 29 años
(71.2 - 234) 29 años - 34 años
(63.4 - 223) 34 años - 39 años
(58.2 - 219) 39 años - 44 años
(53.3 - 215) 44 años - 49 años
(48.1 - 209) 49 años - 54 años
(44.7 - 210) 54 años - 59 años
(43.0 - 220) 59 años - 64 años
(40.2 - 225) 64 años - 69 años
(35.1 - 216) 69 años - 79 años
(30.6 - 208) 79 años - 90 años
(63.2 - 271) Hombre Estadio Tanner I
(114 - 411) Hombre Estadio Tanner II
(166 - 510) Hombre Estadio Tanner III
(170 - 456) Hombre Estadio Tanner IV
(161 - 384) Hombre Estadio Tanner V
(71.4 - 394) Mujer Estadio Tanner I
(122 - 508) Mujer Estadio Tanner II
(164 - 545) Mujer Estadio Tanner III
(174 - 480) Mujer Estadio Tanner IV
(169 - 400) Mujer Estadio Tanner V

Descripción: IGFBP-3 SUERO (IGF BINDING PROTEIN-3)

Código: IGFBP3

Técnica: Técnica Inmunoluminiscencia

Unidades: mcg/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero. Como alternativa 1 ml de plasma Heparina.

Valores de referencia:
(0.7 - 3.9) < 2 años
(0.9 - 5.6) 2 años - 6 años
(1.3 - 7.1) 6 años - 10 años
(2.1 - 10.0) 10 años - 14 años
(3.3 - 9.5) 14 años - 16 años
(3.0 - 7.8) > 16 años

Descripción: IGF-II

Código: IGFII

Técnica: EIA

Unidades: ng/mL

Descripción:	IGF-II
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(350 - 1000)

Descripción:	IGG A ASPERGILLUS NIGER
Código:	RM207IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG RAST A ANIMALES PERIQUITO (PLUMAS, EXCREMENTOS Y PROTEÍ
Código:	PERIQMEZIG
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG RAST A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE SUERO
Código:	D02IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG RAST A ACAROS DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS SUERO
Código:	D03IGG
Técnica:	CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG RAST A ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS SUERO
Código:	D01IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción: IGG RAST A ALIMENTOS BACALAO (PESCADO) SUERO
Código: F03IGG
Técnica: CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ALIMENTOS CLARA DE HUEVO SUERO
Código: F01IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ALIMENTOS GLUTEN (TRIGO) SUERO
Código: F79IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ALIMENTOS OVOALBUMINA
Código: F232IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ALIMENTOS OVOMUCOIDE
Código: F233IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ANIMALES CASPA DE GATO SUERO
Código: E01IGG
Técnica: CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG RAST A ANIMALES CASPA DE GATO SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ANIMALES CASPA DE PERRO SUERO
Código: E05IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ANIMALES EPITELIO DE CONEJO SUERO
Código: E82IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ANIMALES EXCREMENTO DE CANARIO
Código: E200IGG
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ANIMALES EXCREMENTOS DE PERIQUITO SUERO
Código: E77IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ANIMALES LORO (plumas, excrems y prots en suero)
Código: GE92IGG
Técnica: Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL SUERO. Refrigerar si se envía hasta 24 h después de obtención. Congelar si se superan las 24 h.
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ANIMALES PALOMA (plumas, excrem y prots en suero)
Código: GE91IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ANIMALES PLUMAS DE CANARIO SUERO
Código: RE201IGG
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ANIMALES PLUMAS DE PERIQUITO SUERO
Código: E78IGG
Técnica: CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ENTEROTOXINA A STAPHILOC.
Código: M80IGG
Técnica: Fluoroinmunoanalisis (Cap System)
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ENTEROTOXINA C STAPHILOC
Código: M223IGG
Técnica: Fluoroimnunoanalisis (Cap System)
Unidades: mg/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A ENTEROTOXINA TSST STAPHILOC.
Código: M226IGG
Técnica: Fluroinmunoanálisis (Cap System)
Unidades: mg/L
Plazo: 17 días

Descripción: IGG RAST A ENTEROTOXINA TSST STAPHILOC.
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A INSECTOS APIS MELLIFERA (VENENO DE ABEJA) SUERO
Código: I01IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A INSECTOS BLATELLA GERMANICA (CUCARACHA) SUERO
Código: I06IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A INSECTOS POLISTES DOMINULUS/ VENENO AVISPA
Código: I77IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A INSECTOS POLISTES SPP. (VENENO DE AVISPA) SUERO
Código: I04IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A INSECTOS VESPULA SPP (VENENO DE AVISPA) SUERO
Código: I03IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A MICROPOLYSPORA FAENI
Código: GM22IGG
Técnica: CAO SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A MOHOS Y HONGOS ALTERNARIA ALTERNATA (A. TENUIS) S
Código: M06IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS SUERO
Código: M03IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A MOHOS Y HONGOS CANDIDA ALBICANS SUERO
Código: M05IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmuinoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A MOHOS Y HONGOS FUSARIUM MONILIFORME SUERO
Código: M09IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A MOHOS Y HONGOS MUCOR RACEMOSUS SUERO
Código: M04IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG RAST A MOHOS Y HONGOS MUCOR RACEMOSUS SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A MOHOS Y HONGOS PENICILLIUM NOTATUM SUERO
Código: M01IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A PLUMAS DE PALOMA
Código: E215IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE ARBOLES CORYLUS AVELLANA (AVELLANO) SU
Código: T04IGG
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE ARBOLES CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRES
Código: T23IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE ARBOLES FRAXINUS AMERICANA (FRESNO AME
Código: T15IGG
Técnica: CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción:	IGG RAST A POLENES DE ARBOLES OLEA EUROPAEA (OLIVO) SUERO
Código:	T09IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG RAST A POLENES DE ARBOLES PINUS STROBUS (PINO) SUERO
Código:	T16IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG RAST A POLENES DE ARBOLES PLATANUS ACERIFOLIA (POLEN DE
Código:	T11IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG RAST A POLENES DE ARBOLES QUERCUS ALBA (ROBLE, ENCINA) S
Código:	T07IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG RAST A POLENES DE ARBOLES SALIX CAPREA (SAUCE) SUERO
Código:	T12IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG RAST A POLENES DE ARBOLES ULMUS AMERICANA (OLMO) SUERO
Código:	T08IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días

Descripción: IGG RAST A POLENES DE ARBOLES ULMUS AMERICANA (OLMO) SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE GRAMINEAS ANTHOXANTHUM ODORATUM
Código: G01IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis.
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE GRAMINEAS CYNODON DACTYLON (GRAMA MAYO
Código: G02IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE GRAMINEAS DACTYLIS GLOMERATA (GRAMA, C
Código: G03IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE GRAMINEAS FESTUCA ELATIOR (CAÑUELA, FE
Código: G04IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE GRAMINEAS LOLIUM PERENNE (BALLICO) SUE
Código: G05IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE GRAMINEAS PHLEUM PRATENSE (HIERBA TIM
Código: G06IGG
Técnica: CAP-SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE GRAMINEAS POA PRATENSIS (ESPIGUILLA) S
Código: G08IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE GRAMINEAS SECALE CEREALE (CENTENO) (PO
Código: G12IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE HERBACEAS CHENOPODIUM ALBUM (CEÑIGO) S
Código: W10IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE HERBACEAS PARIETARIA JUDAICA (PARIETAR
Código: W21IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE HERBACEAS PARIETARIA OFFICINALIS (PARI
Código: W19IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG RAST A POLENES DE HERBACEAS PARIETARIA OFFICINALIS (PARI
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE HERBACEAS PLANTAGO LANCEOLATA (LLANTEN
Código: W09IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE HERBACEAS SALSOLA KALI (PESTIFER) (SAL
Código: W11IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLENES DE HERBACEAS URTICA DIOICA (ORTIGA) SUERO
Código: W20IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST A POLVOS DE CASA (HOLLISTER STIER)
Código: H02IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST MOHOS Y HONGOS CLADOSPORIUM HERBARUM (HORMODENDRUM)
Código: M02IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG RAST POLENES DE HERBACEAS ARTEMISIA VULGARIS (ARTEMISA)
Código: W06IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A A ALIMENTOS LECHE DE CABRA SUERO
Código: F300IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ACAROS ACARUS SIRO SUERO
Código: D70IGG4
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE SUERO
Código: D02IGG4
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS SUERO
Código: D01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ACAROS LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR SUERO
Código: D71IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG4 RAST A ACAROS LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ALIMENTOS ALFA-LACTOALBUMINA (LECHE DE VACA) SUE
Código: F76IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ALIMENTOS BETA-LACTOGLOBULINA (LECHE DE VACA) SU
Código: F77IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ALIMENTOS CACAHUETE SUERO
Código: F13IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ALIMENTOS CASEINA (LECHE DE VACA) SUERO
Código: F78IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ALIMENTOS CLARA DE HUEVO SUERO
Código: F01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ALIMENTOS OVOALBUMINA SUERO
Código: RF232IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ALIMENTOS OVOMUCOIDE SUERO
Código: RF233IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ALIMENTOS TRIGO
Código: F04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ALIMENTOS TRIGO (ALIMENTO) SUERO
Código: S04IGG4
Técnica: FPIA
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Alternativa: plasma edta
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ALIMENTOS YEMA DE HUEVO SUERO
Código: F75IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ANIMALES CASPA DE GATO SUERO
Código: E01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG4 RAST A ANIMALES CASPA DE GATO SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ANIMALES CASPA DE PERRO SUERO
Código: E05IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ANIMALES EPITELIO DE CONEJO SUERO
Código: E82IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ENTEROTOXINA B STAPHILOC.
Código: M81IGG4
Técnica: Fluorinmunoanálisis (Cap System)
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ENTEROTOXINA C STAPHILOC
Código: M223IGG4
Técnica: Fluoroanalisis (Cap System)
Unidades: mg/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A ENTEROTOXINA TSST STAPHILOC.
Código: M226IGG4
Técnica: Fluoroinmunoanálisis (Cap System)
Unidades: mg/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A INSECTOS AEDES COMMUNIS (MOSQUITO COMUN)
Código: I71IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A INSECTOS APIS MELLIFERA (VENENO DE ABEJA) SUERO
Código: I01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A INSECTOS POLISTES DOMINULUS(VENENO AVISPA)
Código: I77IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A INSECTOS POLISTES SPP. (VENENO DE AVISPA) SUERO
Código: I04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A INSECTOS VESPULA SPP (VENENO DE AVISPA) SUERO
Código: I03IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A MOHOS Y HONGOS ALTERNARIA ALTERNATA (A. TENUIS)
Código: M06IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG4 RAST A MOHOS Y HONGOS ALTERNARIA ALTERNATA (A. TENUIS)
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS
Código: M03IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A MOHOS Y HONGOS CANDIDA ALBICANS SUERO
Código: M05IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A MOHOS Y HONGOS CLADOSPORIUM HERBARUM (HORMODENDR
Código: M02IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A MOHOS Y HONGOS FUSARIUM MONILIFORME SUERO
Código: M09IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A MOHOS Y HONGOS MUCOR RACEMOSUS SUERO
Código: M04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A MOHOS Y HONGOS PENICILLIUM NOTATUM SUERO
Código: M01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE ARBOLES CORYLUS AVELLANA (AVELLANO) S
Código: T04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE ARBOLES CUPRESSUS ARIZONICA
Código: T222IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE ARBOLES CUPRESSUS SEMPERVIRENS
Código: T23IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE ARBOLES FRAXINUS AMERICANA (FRESNO AM
Código: T15IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE ARBOLES OLEA EUROPAEA (OLIVO) SUERO
Código: T09IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE ARBOLES OLEA EUROPAEA (OLIVO) SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE ARBOLES PINUS STROBUS (PINO) SUERO
Código: T16IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE ARBOLES QUERCUS ALBA (ROBLE,ENCINA) S
Código: T07IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE ARBOLES SALIX CAPREA (SAUCE) SUERO
Código: T12IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE ARBOLES ULMUS AMERICANA (OLMO) SUERO
Código: T08IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE GRAMINEAS CYNODON DACTYLON (GRAMA MAY
Código: G02IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE GRAMINEAS DACTYLIS GLOMERATA (GRAMA,C
Código: G03IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE GRAMINEAS FESTUCA ELATIOR (CAÑUELA,FE
Código: G04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE GRAMINEAS LOLIUM PERENNE (BALLICO) SU
Código: G05IGG4
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE GRAMINEAS PHLEUM PRATENSE (HIERBA TIM
Código: G06IGG4
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE GRAMINEAS POA PRATENSIS (ESPIGUILLA)
Código: G08IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE GRAMINEAS SECALE CEREALE (CENTENO) (P
Código: G12IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE GRAMINEAS SECALE CEREALE (CENTENO) (P
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE HERBACEAS ARTEMISIA VULGARIS (ARTEMIS
Código: W06IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE HERBACEAS CHENOPODIUM ALBUM (CEÑIGO)
Código: W10IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE HERBACEAS PARIETARIA JUDAICA (PARIETA
Código: W21IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE HERBACEAS PARIETARIA OFFICINALIS (PAR
Código: W19IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE HERBACEAS PLANTAGO LANCEOLATA (LLANTE
Código: W09IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RAST A POLENES DE HERBACEAS SALSOLA KALI (PESTIFER) (SA
Código: W11IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 RASTA ALIMENTOS LECHE DE OVEJA
Código: F325IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGLON5 ANTICUERPOS SUERO
Código: IGLON5
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Título < 1:10 Negativo
= Título > 1:10 Positivo

Descripción: IL28B rs8099917 SNP ligado a respuesta a peg-INF/RBV
Código: IL28B_SNP
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Código: IMIPRA
Descripción: IMIPRAMINA MAS DESIPRAMINA
Técnica: Cromatografía líquida /tanden masas (LC-MS/MS)
Comentario adicional: 2 mL suero

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DESIPRA		DESIPRAMINA (Perfil)	ng/mL	
Prueba	IMIDESI		IMIPRAMINA (Perfil)	ng/mL	(150 - 250) Suma (Sup. 500) Tóxico - Suma

Descripción:	INDICE ANDROGENICO LIBRE (TESTOSTERONA/SHBG)
Código:	IANDROGELI
Técnica:	Cálculo
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.7 - 8.7) Mujer 21 años - 49 años Premenopausia (0.5 - 4.7) Mujer > 50 años Postmenopausia (24.5 - 113.3) Hombre 21 años - 49 años (19.3 - 118.4) Hombre > 50 años

Descripción:	INDICE DE CALCIO/CREATININA EN ORINA
Código:	ICA2_CREA2
Técnica:	Fórmula
Unidades:	mg/mg
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.032 - 0.19)

Descripción:	INDICE DE EXCRECION DE CALCIO
Código:	IEXCRECA2
Técnica:	
Unidades:	mg/dL de F.G.
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.07 - 0.17)

Descripción:	INDICE DE QUICK
Código:	QUICK
Técnica:	
Unidades:	%
Plazo:	3 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(80 - 120)

Descripción:	INDICE DE RETICULOCITOS INMADUROS
Código:	IRF
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	5 ml sangre total EDTA. Rogamos envio inmediato, evitar extracción viernes.
Valores de referencia:	(Inf. 0.3) (Sup. 0.3) Reti. inmaduros

Descripción: INDICE DE RIESGO DEFECTOS ABIERTOS DEL TUBO NEURAL
Código: INEURAL
Técnica: Fórmula
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: INDICE RIESGO PRENATAL SEGUNDO TRIMESTRE
Valores de referencia:

Descripción: INDICE DE RIESGO PRIMER TRIMESTRE
Código: INDIRIES1
Técnica: Fórmula
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Edad gestacional menor de 14 semanas
Valores de referencia:

Código: IRIESGO1
Descripción: INDICE DE RIESGO PRIMER TRIMESTRE
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PAPP.A		PROTEINA PLASMATICA A ASOCIADA A LA GESTACION	mUI/mL	= 0.28 mUI/mL-Embarazo-8 semanas = 0.47 mUI/mL-Embarazo-9 semanas = 0.90 mUI/mL-Embarazo-10 semanas = 1.58 mUI/mL-Embarazo-11 semanas = 2.51 mUI/mL-Embarazo-12 semanas = 3.68 mUI/mL-Embarazo-13 semanas
Prueba	BETAHCGL		HCG-BETA LIBRE SUERO	ng/mL	= 55.13 ng/ml -Embarazo - 8 semanas = 72.55 ng/ml -Embarazo - 9 semanas = 60.67 ng/ml-Embarazo - 10 semanas = 44.54 ng/ml -Embarazo - 11 semanas = 34.33 ng/ml-Embarazo - 12 semanas = 28.82 ng/ml-Embarazo - 13 semanas
Prueba	INDIRIES1		INDICE DE RIESGO PRIMER TRIMESTRE		
Prueba	SEMGEST		SEMANAS DE GESTACION	sem.gestación	
Prueba	PESOCORPO		PESO CORPORAL	kg	
Prueba	ALTURA		ALTURA	cm	
Prueba	EMBARAZOTI		TIPO DE EMBARAZO		
Prueba	F.U.R.		FECHA ULTIMA REGLA		
Prueba	FUMADORA		FUMADORA		

Componentes					
Prueba	DIABETES		DIABETES EMBARAZADA		
Prueba	CRIBADOTIP		CRIBADO TIPO		
Prueba	FECHAECO		FECHA ECOGRAFIA SEMANA 12		
Prueba	CRL		CRL LONGITUD CRANEO CAUDAL	mm	
Prueba	TN		TRANSLUCENCIA NUCAL	mm	
Prueba	HUESONASAL		HUESO NASAL AUSENTE		
Prueba	RAZA		RAZA		
Prueba	NFETOS		NUMERO DE FETOS		

Código: PHIPROPSA
Descripción: Indice de salud prostatica- PHI (proPSA),Suero
Técnica:
Comentario adicional: El suero debe centrifugarse y separarse antes de 3 horas despues de la toma de la muestra.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PHIPSA		Perfil Indice de Salud Prostático PSA	µg/l	(Inf. 4)
Prueba	PHIPSALIBR		Perfil Indice de Salud Prostático PSA-Libre	µg/L	
Prueba	PHIPSAPRO		Perfil indice de salud prostático proPSA	ng/L	
Prueba	INDICEPHI		Perfil Indice de Salud Prostático resultado	Indice	(Inf. 20.99) Riesgo Bajo (21 - 40) Riesgo Moderado (Sup. 40) Riesgo Alto

Descripción: INDICE DE SATURACION DE TRANSFERRINA
Código: ISATUFE
Técnica: Cálculo
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Sup. 16)

Descripción: INDICE DE TIBBLING RESULTADO
Código: RESINTIBB
Técnica: Fórmula
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo:
Comentario adicional: 1 ml suero
1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 0.85)

Descripción: INDICE DE TIROXINA LIBRE
Código: ITIROXLIBR

Descripción: INDICE DE TIROXINA LIBRE
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (3.6 - 13.0)

Código: IRIESGO2
Descripción: INDICE RIESGO PRENATAL SEGUNDO TRIMESTRE
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SEMGEST		SEMANAS DE GESTACION	sem.gestación	
Prueba	BETAHCGL		HCG-BETA LIBRE SUERO	ng/mL	= 55.13 ng/ml -Embarazo - 8 semanas = 72.55 ng/ml -Embarazo - 9 semanas = 60.67 ng/ml-Embarazo - 10 semanas = 44.54 ng/ml -Embarazo - 11 semanas = 34.33 ng/ml-Embarazo - 12 semanas = 28.82 ng/ml-Embarazo - 13 semanas
Perfil	A1FETO		ALFA-1-FETOPROTEINA SUERO		
Perfil	NEURAL		INDICE DE RIESGO PARA DEFECTOS		
Prueba	RAZA		RAZA		
Prueba	PESOCORPO		PESO CORPORAL	kg	
Prueba	ALTURA		ALTURA	cm	
Prueba	NFETOS		NUMERO DE FETOS		
Prueba	EMBARAZOTI		TIPO DE EMBARAZO		
Prueba	F.U.R.		FECHA ULTIMA REGLA		
Prueba	FUMADORA		FUMADORA		
Prueba	DIABETES		DIABETES EMBARAZADA		
Prueba	CRIBADOTIP		CRIBADO TIPO		
Prueba	FECHAECO		FECHA ECOGRAFIA SEMANA 12		
Prueba	CRL		CRL LONGITUD CRANEO CAUDAL	mm	

Código: ROMA
Descripción: INDICE ROMA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes					
Prueba	CA125		CA 125 II SUERO	UI/mL	(Inf. 35)
Prueba	HE4		HE4 (PROTEINA EPIDIDIMAL HUMANA)	pmol/L	(Inf. 92) Mujer > 14 años Premenopausia (Inf. 121) Mujer > 14 años Postmenopausia
Prueba	ROMAPRE		INDICE ROMA PREMENOPAUSICA	%	(Inf. 7.4) Bajo Riesgo (Sup. 7.4) Alto Riesgo
Prueba	ROMAPOST		INDICE ROMA POSTMENOPAUSICA	%	(Inf. 25.3) Bajo Riesgo (Sup. 25.3) Alto Riesgo

Descripción: INDICE TESTOSTERONA/EPITESTOSTERONA EN ORINA
Código: EPITESTOS
Técnica: cromatografía de gases -espectrometría de masas
Unidades: Índice
Plazo: 23 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 20 mL orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 4) ;Observaciones: WADA Agosto 2004. Con la técnica utilizada se obtiene un resultado orientativo, sin validez legal.

Código: INFLIXIMAB
Descripción: INFLIXIMAB NIVELES SUERO Y AC. ANTI INFLIXIMAB
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS.
Comentario adicional: 2 mL Suero. Toma de muestra antes de la administración de la próxima dosis.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	INFLIANTIC		PERFIL INFLIXIMAB AC. SUERO		
Prueba	INFLINIVE		PERFIL INFLIXIMAB NIVELES SUERO	mcg/mL	

Descripción: INFLUENZA A ANTICUERPOS IGG
Código: INFLUAACG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo
(0.91 - 1.10) Indeterminado
(Sup. 1.11) Positivo

Descripción: INFLUENZA A ANTICUERPOS IGG EN LCR
Código: INFLUAALCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos

Descripción: INFLUENZA A ANTICUERPOS IGG EN LCR
Comentario adicional: 1 mL LCR. Se recomienda efectuar análisis simultáneo en suero y LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: INFLUENZA A ANTICUERPOS IGM
Código: INFLUAACM
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero. Alternativo 1 ml de plasma de citrato sódico, y de heparina Litio.
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo

Descripción: INFLUENZA B ANTICUERPOS IGG
Código: INFLUBACG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo
(0.91 - 1.10) Indetermiado
(Sup. 1.11) Positivo

Descripción: INFLUENZA B ANTICUERPOS IGM
Código: INFLUBACM
Técnica: Técnica EIA
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero. Alternativo 1 ml de plasma de citrato sódico, y de heparina Litio.
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo

Descripción: Informe compatibilidad genética (matching)
Código: INF_COMPAT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: INHIBIDOR ACTIVIDAD TISULAR DEL PLASMINOGENO (PAI)
Código: PLASMIINHI
Técnica: Coloiremitría
Unidades: U/mL
Plazo: 13 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato

Descripción:	INHIBIDOR ACTIVIDAD TISULAR DEL PLASMINOGENO (PAI)
Comentario adicional:	1 mL Plasma Citrato Sódico. Separar plasma y congelar inmediatamente.
Valores de referencia:	(1.0 - 7.0)

Descripción:	Inhibidores del Factor XII en plasma
Código:	INHIFXII
Técnica:	Téc. coagulométrico
Unidades:	U Bethesda
Plazo:	10 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL Plasma de Citrato Sódico (Congelado). Enviar congelado.
Valores de referencia:	= Negativo

Descripción:	INHIBIDORES ESPECIFICOS FRENTE AL FACTOR IX EN PLASMA
Código:	INHIFIX
Técnica:	Téc. coagulométrica
Unidades:	U Bethesda
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma citrato pobre en plaquetas (doble centrifugacion 2500g/15 min) y congelar
Valores de referencia:	(Inf. 0.5)

Descripción:	INHIBIDORES ESPECIFICOS FRENTE AL FACTOR VIII EN PLASMA
Código:	INHIFVIII
Técnica:	Coagulométrica
Unidades:	U. Bethesda
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	2 mL plasma citrato pobre en plaquetas (doble centrifugacion 2500g/15 min) y congelar
Valores de referencia:	

Descripción:	INHIBIDORES FRENTE AL FACTOR XI (PLASMA)
Código:	INHIFXI
Técnica:	Téc. coagulométrica
Unidades:	U Bethesda
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma citrato pobre en plaquetas (doble centrifugacion 2500g/15 min) y congelar
Valores de referencia:	(Inf. 0.5) Negativo

Descripción:	Inhibina A
Código:	INIBINAA
Técnica:	Inmunoquimioluminiscencia
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero

Descripción: Inhibina A

Valores de referencia:
(Inf. 2) Hombre
(3.50 - 31.70) Mujer Fase folicular
(3.90 - 87.70) Mujer Fase luteal
(16.90 - 91.80) Mujer Medio del ciclo
(Inf. 2.10) Mujer Menopausia

Descripción: INHIBINA B DIMERICA

Código: INHIBDIM

Técnica: EIA

Unidades: pg/mL

Plazo: 9 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:
(Inf. 352) Hombre < 12 años
(Inf. 83) Mujer < 12 años
(25 - 325) Hombre > 13 años
(Inf. 341) Mujer > 13 años
(Inf. 273) Mujer > 13 años 3er dia ciclo
(Inf. 4) Mujer > 13 años Menopausia

Descripción: INMUNOCOMPLEJOS CIRCULANTES SUERO

Código: INMUNOCOM

Técnica: EIA (modificado 24/10/2011)CIC-C1q

Unidades: mcg Eq/L

Plazo: 9 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1ml

Valores de referencia:
= Inferior a 4.4 Negativo
= 4.4 - 10.8 Indeterminado
= Superior a 10.8 Positivo

Descripción: Inmunodeficiencia combinada severa. Panel

Código: GEN_000484

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Inmunodeficiencia común variable. Panel NGS

Código: GEN_000485

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Inmunodeficiencia ligada X déficit magnesio neoplasia. MAGT1

Código: GEN_000486

Descripción: Inmunodeficiencia ligada X déficit magnesio neoplasia. MAGT1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Inmunodeficiencia. Panel NGS
Código: GEN_000487
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Inmunodeficiencias primarias. Panel NGS
Código: GEN_000488
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOELECTROFORESIS ORINA (INMUNOFIJACION)
Código: INMUNO2
Técnica: Inmunoelectroforesis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 25 mL orina 24 h
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOELECTROFORESIS SUERO (INMUNOFIJACION)
Código: INMUNO
Técnica: Inmunofijacion
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO LEUCOCITARIO EN MEDULA OSEA
Código: TIPALEUMO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Sangre EDTA

Descripción: INMUNOFENOTIPO LEUCOCITARIO EN MEDULA OSEA
Comentario adicional: Medula ósea recogida en tubo de EDTA
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFIJACION IgD SUERO
Código: IGDINMFIJ
Técnica: Inmunofijación
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml Suero.
Valores de referencia:

Descripción: Inmunoglobulina A (IgA) en Heces
Código: IGAHECES
Técnica:
Unidades: µg/g
Plazo: 9 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 2 g Heces (Congelado)
Valores de referencia: (510 - 2040)

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGA
Código: IGA
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
NO SE PUEDE UTLIZAR EDTA: Alternativa plasma heparina.
Valores de referencia: (1 - 34) < 3 meses
(8 - 91) 3 meses - 1 año
(21 - 291) Hombre 1 año - 12 años
(63 - 484) Hombre 12 años - 60 años
(101 - 645) Hombre > 60 años
(21 - 282) Mujer 1 año - 12 años
(65 - 421) Mujer 12 años - 60 años
(69 - 517) Mujer > 60 años

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGA EN LCR
Código: IGALCR
Técnica: Nefelometria
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 0.8)

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGA EN ORINA
Código: IGA2O
Técnica: Nefelometria-Turbidimetria

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGA EN ORINA
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 ML ORINA DE 24 HORAS
Valores de referencia:	(Inf. 2.50)

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGD
Código:	IGD
Técnica:	Turbidimetria
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero Alternativa: Plasma (EDTA o Heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 13.2)

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGE TOTAL
Código:	IGE
Técnica:	CAP - FEIA
Unidades:	kU/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero. Alternativa plasma de EDTA o heparina. Enviar muestra refrigerada hasta 7 días, sino, congelar inmediatamente.
Valores de referencia:	(Inf. 2.3) < 6 semanas (Inf. 4.1) 6 semanas - 3 meses (Inf. 7.3) 3 meses - 6 meses (Inf. 10) 6 meses - 9 meses (Inf. 13) 9 meses - 1 año (Inf. 23) 1 año - 2 años (Inf. 32) 2 años - 3 años (Inf. 40) 3 años - 4 años (Inf. 48) 4 años - 5 años (Inf. 56) 5 años - 6 años (Inf. 63) 6 años - 7 años (Inf. 71) 7 años - 8 años (Inf. 78) 8 años - 9 años (Inf. 85) 9 años - 10 años (Inf. 114) > 10 años

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGG
Código:	IGG
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero NO SE PUEDE UTLIZAR EDTA: Alternativa plasma heparina.

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGG

Valores de referencia:
(397 - 1765) Hombre < 1 mes
(205 - 948) Hombre 1 mes - 1 año
(475 - 1210) Hombre 1 año - 2 años
(540 - 1822) Hombre > 2 años
(391 - 1737) Mujer < 1 mes
(203 - 934) Mujer 1 mes - 1 año
(483 - 1226) Mujer 1 año - 2 años
(552 - 1631) Mujer > 2 años

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGG EN LCR

Código: IGGLCR

Técnica: Nefelometria, , Standard IFCC/BCR/CAP-CRM 470

Unidades: mg/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1ml

Valores de referencia: (2 - 4)

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGG EN ORINA

Código: IGG2O

Técnica: Nefelometria

Unidades: mg/L

Plazo: 5 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: 5 ML ORINA DE 24 HORAS

Valores de referencia: (Inf. 5.70)

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 4 SUERO

Código: IGG4

Técnica: Turbidimetria

Unidades: mg/dL

Plazo: 5 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Suero. Alternativa Plasma.

Valores de referencia:
(0.5 - 78.4) < 2 años
(1 - 53.7) 2 años - 4 años
(1.8 - 112.5) 4 años - 6 años
(0.4 - 99.2) 6 años - 8 años
(1.9 - 93.2) 8 años - 10 años
(1.6 - 115) 10 años - 12 años
(3.7 - 136.0) 12 años - 14 años
(11 - 157) 14 años - 18 años
(3.92 - 86.4) > 18 años

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGM

Código: IGM

Técnica: Turbidimetría

Unidades: mg/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGM
Comentario adicional: 0.5 mL suero
NO SE PUEDE UTLIZAR EDTA: Alternativa plasma heparina.
Valores de referencia: (6 - 21) < 3 meses
(17 - 143) Hombre 3 meses - 1 año
(41 - 183) Hombre 1 año - 12 años
(22 - 240) Hombre > 12 años
(17 - 150) Mujer 3 meses - 1 año
(47 - 240) Mujer 1 año - 12 años
(33 - 293) Mujer > 12 años

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGM EN LCR
Código: IGMLCR
Técnica: nefelometria
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1ml
Valores de referencia: (Inf. 0.8)

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGM EN ORINA
Código: IGM2O
Técnica: Nefelometria
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 ML ORINA DE 24 HORAS
Valores de referencia: (Inf. 2.50)

Descripción: INR TIEMPO PROTROMBINA
Código: INR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.9 - 1.1)

Descripción: INSULINA AC. SUERO
Código: INSULIAC
Técnica: ELISA
Unidades: U/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 5.0) Negativo
(5.0 - 10.0) Indeterminado
(Sup. 10.0) Positivo

Descripción: Insulina libre en suero
Código: INSULIBRE
Técnica: INMUNOLUMINISCENCIA

Descripción:	Insulina libre en suero
Unidades:	mcU/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(3.0 - 25.0)

Descripción:	INSULINA SUERO
Código:	INSULIN
Técnica:	Téc. ICMA
Unidades:	mcU/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero
Valores de referencia:	(2 - 15)

Descripción:	Int. a la lactosa: mutación C13910T gen LCT (sec. Sanger)
Código:	LACTASAMUT
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	INTERFERON ALFA AC. SUERO
Código:	INTERFERAC
Técnica:	EIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(Inf. 30) Negativo (Sup. 30) Positivo

Descripción:	INTERFERON GAMMA EN LIQUIDO PLEURAL
Código:	INTERFLPE
Técnica:	Enzimoinmunoanalisis
Unidades:	UI/ml
Plazo:	10 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml liquido pleural
Valores de referencia:	(Inf. 3.7)

Descripción:	INTERFERON GAMMA EN PLASMA
Código:	INTERFGAMM
Técnica:	ELISA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	17 días

Descripción:	INTERFERON GAMMA EN PLASMA
Tubo:	Plasma EDTA Refrigerado
Comentario adicional:	1 mL plasma EDTA.
Valores de referencia:	(Inf. 0.89)

Descripción:	INTERLEUCINA -8(IL-8)
Código:	IL8
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL de suero o plasma (EDTA) CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(Inf. 50)

Descripción:	INTERLEUCINA II RECEPTOR SOLUBLE (suero congelado)
Código:	INTERLII
Técnica:	Inmunoluminiscencia
Unidades:	U/mL
Plazo:	24 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1ml de suero. Congelar inmediatamente y enviar congelado. Evitar plasma de EDTA
Valores de referencia:	(158 - 623)

Descripción:	INTERLEUCINA-1(IL-1 beta)
Código:	IL1
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero o plasma (EDTA) CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(Inf. 13.6)

Descripción:	INTERLEUCINA-10 (IL-10)
Código:	IL10
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	pg/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL Suero. Separar el suero lo antes posible. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(Inf. 10.0)

Descripción:	INTERLEUCINA-2 (IL-2)
Código:	IL2
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero o plasma (EDTA). CONGELAR y ENVIAR CONGELADO

Descripción: INTERLEUCINA-2 (IL-2)
Valores de referencia: (Inf. 6.5)

Descripción: INTERLEUCINA-5
Código: IL5
Técnica: Enzimoinmunoanálisis.
Unidades: pg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero o plasma (EDTA). Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (Inf. 4.0)

Descripción: INTERLEUCINA-6 (IL-6)
Código: IL6
Técnica: inmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL de suero.Congelar y enviar congelado.
Alternativa: 1mL de plasma EDTA/Heparina.Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (Inf. 7)

Descripción: INTERLEUCINA-6 (IL-6) MUESTRA
Código: IL6MUESTRA
Técnica: INMUNOANÁLISIS
Unidades: pg/mL
Plazo: 5 días
Tubo:
Comentario adicional: Antes de enviar la muestra es necesario contactar con el laboratorio.
Valores de referencia:

Descripción: Intolerancia a la Fructosa: gen ALDOB (NGS)
Código: FRUCTOSMUT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Intolerancia a la lactosa de adulto: gen MCM6 (NGS)
Código: MCM6_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: IODO_MG (CONCENTRACIÓN EN ORINA)
Código: IODO_MG
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10mL de Orina reciente.
Valores de referencia: (26 - 705)

Descripción: ISLOTES DE LANGERHANS AC. SUERO (CELULAS BETA PANCREATICAS)
Código: ISLOTESAC
Técnica: ICMA
Unidades: UI/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ML de suero
Valores de referencia: (Inf. 30)

Código: ISOCIANATO
Descripción: ISOCIANATOS EN ORINA METABOLITOS
Técnica: Cromatografía de gases-Espectrometría de masas
Comentario adicional: 10 ml orina (micción aislada) recogida inmediatamente después de la exposición

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HDA		Perfil Isocianatos, 1,6-HEXAMETILEN DIAMINA	mcg/g creatin.	
Prueba	TDA24		Perfil Isocianatos, 2,4-TOLUENO DIAMINA	mcg/L	
Prueba	TDA26		Perfil Isocianatos, 2,6-TOLUENO DIAMINA	mcg/L	
Prueba	MDA		Perfil Isocianatos, 4,4-METILEN DIANILINA	mcg/L	

Código: LDHISO
Descripción: ISOENZIMAS DE LDH
Técnica: Electroforesis
Comentario adicional: 1 ML

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LDH1		LDH 1	%	(17 - 31)
Prueba	LDH2		LDH 2	%	(32 - 45)
Prueba	LDH3		LDH 3	%	(18 - 30)
Prueba	LDH4		LDH 4	%	(5 - 11)
Prueba	LDH5		LDH 5	%	(2.5 - 10)

Descripción: ISOENZIMAS FOSFATASA ALCALINA
Código: ALPFRAS

Descripción: ISOENZIMAS FOSFATASA ALCALINA
Técnica: Electroforesis
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL SUERO
Valores de referencia:

Descripción: ISOHEMAGLUTININAS IgG/IgM SUERO/SANGRE
Código: ISOHEMAGLU
Técnica: AGLUTINACIÓN
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 3 mL Suero y 5 mL Sangre Total EDTA.
Valores de referencia:

Descripción: ISONIAZIDA SUERO
Código: ISONIAZIDA
Técnica: Cromatografia líquida /Tanden masas (LC-MS/MS)
Unidades: mcg/mL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 ml suero
Valores de referencia:
(2 - 5) Valor terapéutico
(Sup. 20) Toxicidad
(2.6 - 3) Dosis 4mg/K Acetilador lento
(Sup. 3) Dosis 10mg/K Acetilador lento
(7.8 - 12) Dosis 15mg/K Acetilador lento
(Inf. 1.2) Dosis 4mg/K Acetilador rápido
(Inf. 2) Dosis 10mg/K Acetilador rápido
(2.5 - 4.9) Dosis 15mg/K Acetilador rápido

Descripción: Jo-1 AC. SUERO
Código: JO1AC
Técnica: Técnica Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: Johanson Blizzard, Sd. Sec Gen: UBR1
Código: GEN_000489
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Joubert /Nefronoptisis juvenil fam,Sd. Sec Gen: NPHP1
Código: GEN_000490
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Joubert, Sd. y patologías relacionadas. Panel NGS
Código: GEN_000491
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Kabuki, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000492
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Kallmann, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000493
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Kenny-Caffey, Sd. Sec Gen: TBCE
Código: GEN_000494
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: KETAMINA EN ORINA CONFIRMACION
Código: KETAMIN
Técnica: Cromatografia líquida - tándem masas LC-MS/MS
Unidades:
Plazo: 17 días

Descripción: KETAMINA EN ORINA CONFIRMACION
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL micción aislada
Valores de referencia:

Descripción: Kindler, Sd. Sec Gen: FERMT1
Código: GEN_000495
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Kingella kingae PCR Cualitativa
Código: TOXKINGELL
Técnica: Hibridación molecular con ampliación (PCR)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Sangre total refrigerada
LiquidO articular
Liquido de punción
Torunda de PCR
Valores de referencia:

Descripción: Klippel-Feil tipo 1, Sd. Sec Gen: GDF6
Código: GEN_000496
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Krabbe, enfermedad de. Sec Gen: GALC
Código: GEN_000497
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ku Ac. SUERO
Código: AC.KU
Técnica: tec. inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: Ku Ac. SUERO
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Lacosamida en suero
Código: LACOSAMIDA
Técnica: Cromatografía líquida / Tándem masas (LC-MS / MS)
Unidades: µg/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (1 - 10)

Descripción: LACTICO EN LCR
Código: LACTLCR
Técnica: Enzimatica
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1ml
Valores de referencia: (10.8 - 18.9)

Descripción: LACTOFERRINA AC. SUERO
Código: LACTOFEAC
Técnica: Enzimoinmuanálisis
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo
(Sup. 1.00) Positivo

Descripción: LACTOFERRINA EN HECES
Código: LACTOFEHEC
Técnica: INMUNOCROMATOGRÁFICA
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 5gr DE HECES, CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:

Descripción: Lactogeno placentario en suero
Código: HPL
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: µg/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia:

Descripción: Laminina 332, Anticuerpos, Suero
Código: LAMININ332
Técnica: Cell Binding Assay, IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 24 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero refrigerado
Valores de referencia: = Se consideran niveles significativos a partir de título 1:10

Descripción: LAMOTRIGINA SUERO
Código: LAMOTRIGIN
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1ml de suero congelado.
1 alicuota especifica para este análisis.
Valores de referencia: (3.0 - 14.0)

Descripción: Laron, Sd. Sec Gen: GHR
Código: GEN_000498
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LATEX-FACTOR REUMATOIDE EN LIQUIDO PLEURAL
Código: LIQPLATEX
Técnica: Inmunoturbidimetria
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 40)

Descripción: LATEX-FR (FACTOR REUMATOIDE)
Código: LATEXFR
Técnica: Inmunoturbidimetria
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 30)

Descripción: LDH
Código: LDH
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 ºC

Descripción: LDH
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL. También se realiza en líquidos biológicos.
Suero y plasma heparina
Valores de referencia: (125 - 220)

Descripción: LDH EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: LIQLCLDH
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: LDL-COLESTEROL
Código: LDL
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 130) Prevención primaria
(Inf. 100) Prevención secundaria

Descripción: LEFLUNOMIDA
Código: LEFLUNOMID
Técnica: Cromatografia líquida - tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (5.9 - 11.7) (A dosis de 5 mg)
(8.4 - 27.6) (A dosis de 10 mg)
(27 - 99) (A dosis de 25 mg)

Descripción: LEGIONELLA PNEUMOPHILA AC TOTALES
Código: LEGIOACTOT
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.89) Negativo
(0.90 - 1.10) Indeterminado
(Sup. 1.11) Positivo

Descripción: LEGIONELLA PNEUMOPHILA AC. IGM SUERO
Código: LEGIONEACM
Técnica: CLIA

Descripción: LEGIONELLA PNEUMOPHILA AC. IGM SUERO
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL. También se realiza en líquidos biológicos.(serogrupo 1)
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: Legionella pneumophila DNA PCR Cualitativa
Código: LEGIONEPCR
Técnica: Deteccion DNA Hibridacion Molecular con Amplificacion (PCR) a Tiempo Real
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Muestra respiratoria, Labado Broncoalveolar,Aspirado Bronquial.
Valores de referencia:

Descripción: Leigh, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000706
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LEISHMANIA AC. IGM
Código: LEISHMAIGM
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta.
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: =<1/24 Negativo
=>1/24 Positivo

Descripción: Leishmania DNA PCR Cualitativa
Código: LEISHMAPCR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: LEISHMANIOSIS AC. SUERO (LEISHMANIA DONOVANI)
Código: LEISHMAAC
Técnica: Técnica CLIA

Descripción: LEISHMANIOSIS AC. SUERO (LEISHMANIA DONOVANI)
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(Inf. 0.89) Negativo
(0.90 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.11) Positivo

Descripción: Léntigo múltiple; Leopard, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000499
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LEPTINA SUERO
Código: LEPTINA
Técnica: Técnica ELISA
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ML SUERO
Valores de referencia:
(0.7 - 11.7) < 10 años
(0.7 - 9.1) > 11 años Para IMC (18-25)
(1.3 - 21.2) > 11 años Para IMC (25-30)
(3.4 - 32.1) > 11 años Para IMC >30

Descripción: LEPTOSPIRA INTERROGANS ANTICUERPOS IGG
Código: LEPTOSPACG
Técnica: Inmunocromatografia
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
1 ml suero refrigerado
Alternativa: plasma citrato, plasma EDTA dipotásico, plasma heparina de litio
Valores de referencia:
= Negativo

Descripción: LEPTOSPIROSIS ANTICUERPOS IGM
Código: LEPTOSPACM
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: Leri-Weill, Sd. Sec Gen: SHOX
Código: GEN_000500
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Lesch-Nyhan, Sd. Sec Gen: HPRT1
Código: GEN_000501
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Leucemia mieloide aguda: gen CEBPA (sec. Sanger)
Código: CEBPA_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción
Valores de referencia:

Descripción: Leucemia mieloide aguda: gen NPM1 exón 12 (sec. Sanger)
Código: NPM1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción
Valores de referencia:

Descripción: Leucemia mieloide aguda: mutaciones de ITD y D835 en FLT3
Código: FLT3
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

Descripción: Leucemia mieloide aguda: mutaciones de ITD y D835 en FLT3
Valores de referencia:

Descripción: Leucemia mieloide aguda: reordenamiento CBFB/MYH11
Código: CBFB_MYH11
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

Muestra: sangre periférica o médula ósea

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción: Leucemia neutrofílica: gen CSF3R (NGS)
Código: CSF3R_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: LEUCINAMINOPEPTIDASA (LAP)
Código: LAP
Técnica: Cinética , dsde 27/10/2011Espectrometría de absorción molecular
Unidades: U/L a 37 ºC
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero
Valores de referencia: (18 - 49)

Descripción: LEUCOCITOS EN EXUDADO
Código: LIQEXULEU
Técnica: Microscopía óptica
Unidades: /µL
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Leucodistrofia de adulto: gen LMNB1 (NGS)
Código: LMNB1_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Leucodistrofia de adulto: gen LMNB1 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Leucodistrofias en adulto. Panel NGS (>10 genes)
Código: GEN_000502
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B1 (NGS)
Código: EIF2B1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B2 (NGS)
Código: EIF2B2
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B3 (NGS)
Código: EIF2B3
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B4 (NGS)
Código: EIF2B4
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B4 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B5 (NGS)
Código: EIF2B5
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalopatía con sustancia blanca evanescente. Panel
Código: GEN_000503
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalopatía. Panel NGS
Código: GEN_000504
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LEVETIRACETAM (KEPPRA)
Código: LEVETIR
Técnica: Enzimoinmunoensayo (EIA)
Unidades: mg/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero separado y alicuotado.
Alicuota especifica para este análisis.
Alternativa: Edta potásico, Heparina sodio, Heparina litio.

Tomar la muestra en estado estable (nivel mínimo, antes de la administración) para garantizar una correcta monitorización terapeútica del levetiracetam.

Valores de referencia: (6.00 - 46.00)

Descripción: Levodopa
Código: LEVODOPA
Técnica: Cromatografía Líquida de Alta Resolución.
Unidades: mcg/mL
Plazo: 10 días

Descripción:	Levodopa
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 mL. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(0.20 - 4.00)

Descripción:	LEVOFLOXACINO
Código:	LEVOFLOXA
Técnica:	Cromatografía líquida-espectrometría de masas
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2ml suero congelado(tubo con separador)
Valores de referencia:	

Descripción:	LEVOMEPROMAZINA
Código:	LEVOPROMAZ
Técnica:	Cromatografía Líquida de Alta Resolución.
Unidades:	ng/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL.
Valores de referencia:	(10 - 140) (Sup. 500) Toxicidad

Descripción:	LH
Código:	LH
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	mU/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(1.80 - 11.78) Mujer > 14 años F. Folicular (7.59 - 89.08) Mujer > 14 años Ovulación (0.56 - 14.00) Mujer > 14 años F. Luteínica (5.16 - 61.99) Mujer > 14 años Post-menopausia (0.57 - 12.07) Hombre > 14 años

Descripción:	Li Fraumeni, Sd. Panel NGS
Código:	GEN_000718
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	LICOPENO (ANNE)
Código:	LICOP
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades:	µg/dL
Plazo:	14 días

Descripción:	LICOPENO (ANNE)
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1mL de suero congelado
Valores de referencia:	(10.22 - 80.11)

Descripción:	Lidocaina en Suero
Código:	LIDOCAINA
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.
Unidades:	µg/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia:	(1.50 - 6.00)

Descripción:	Li-Fraumeni tipo 2, Sd. Sec Gen: CHEK2
Código:	GEN_000505
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Lig X inmuno de reg-poliendocrinopat-enteropat S IPEX. FOXP3
Código:	GEN_000720
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	LINDANO EN ORINA
Código:	LINDANOOR
Técnica:	Cromatografía de gases/Espectrofotometría de masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 ml de orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 1) Personal no expuesto.

Descripción:	LINDANO SUERO (Hexaclorociclohexano)
Código:	LINDANO
Técnica:	
Unidades:	mcg/L
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 ml suero final de jornada laboral
Valores de referencia:	(Inf. 25) Personas expuestas a LINDANO (Final jornada laboral)

Descripción: Linfedema - distiquiasis, Sd. Sec Gen: FOXC2
Código: GEN_000506
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Linfedema hereditario: gen FLT4 (NGS)
Código: FLT4_MUTS
Técnica: NGS con TSOE Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestras de tejido tumotal y sangre.
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: CELULASNK
Descripción: LINFOCITOS NATURAL KILLER SANG
Técnica: Citometría de flujo
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CELULASNK1		LINFOCITOS NATURAL KILLER SANGRE		
Prueba	CD56NKH1		CELULAS KILLER CD56(NKH-1)	%	
Prueba	CD56NKHT		CELULAS NATURAL KILLER TOTALES	/µL	
Prueba	NOTATIP		NOTA TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		
Prueba	LINFOTOT		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/µL	(900 - 5175)
Prueba	CELNK1TOT		CELULAS NK TOTALES	/µL	

Descripción: LINFOCITOS T ACTIVADOS
Código: CD3DR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades: %
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA a temperatura ambiente
Valores de referencia:

Código: LINFOTB1
Descripción: LINFOCITOS T Y B EN SANGRE TOTAL
Técnica: Citometría de fujo
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFOTOT		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/µL	(900 - 5175)
Prueba	CD3		MARCADORES LINFOIDES (CD3)	%	
Prueba	CD3T		LINFOCITOS CD3 TOTALES	/µL	
Prueba	CD19		MARCADORES LINFOIDES CD19	%	
Prueba	CD19T		LINFOCITOS CD19 TOTALES	/µL	
Prueba	NOTATIP		NOTA TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		

Código: T4T8
Descripción: LINFOCITOS T4/T8 (COCIE
Técnica:
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFOTOT		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/µL	(900 - 5175)
Prueba	CD4		CD4 (T4)	%	
Prueba	CD4T		CD4 (T4) TOTAL	/µL	
Prueba	CD8		CD8 (T8)	%	
Prueba	CD8T		CD8 (T8) TOTAL	/µL	
Prueba	COCIENTE		COCIENTE T4/T8		
Prueba	NOTATIP		NOTA TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		

Descripción: Linfohistiocitosis hemofagocítica fam. Sec Gen: PRF1
Código: GEN_000508
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar. Panel NGS
Código: GEN_000507
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LIPASA
Código: LIPA

Descripción: LIPASA
Técnica:
Unidades: U/L a 37 ºC
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (8 - 78)

Código: LIPIDOGRA
Descripción: LIPIDOGRAMA SUERO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PREALFA		PREALFA, LIPIDOGRAMA	%	(22 - 46)
Prueba	PREBETA		PREBETA, LIPIDOGRAMA	%	(1 - 27)
Prueba	BETA_LIP		BETA, LIPIDOGRAMA	%	(47 - 71)
Prueba	BETA_ALFA		COCIENTE BETA/ALFA DEL LIPIDOGRAMA		(1.1 - 3.1) beta+pre beta/alfa
Prueba	BETA_PRE		COCIENTE BETA/PREBETA EN EL LIPIDOGRAMA		(2.2 - 6.2) beta/pre beta

---

Descripción: LIPIDOS TOTALES
Código: LIP
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: .
Valores de referencia: (Inf. 800)

Descripción: Lipodistrofia congénita generalizada. Panel NGS
Código: GEN_000509
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Lipofucinosis ceroide neuronal. Panel NGS
Código: GEN_000510
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Lipofucinosis ceroide neuronal. Panel NGS
Valores de referencia:

Descripción: Lipofuscinosis neuronal ceroidea: gen PPT1 (NGS)
Código: LIPOFUSMUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Lipogranulomatosis de Farber. Sec Gen: ASAH1
Código: GEN_000511
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LIPOPROTEINA (A) SUERO
Código: LPA
Técnica: Téc. Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL Suero/Plasma EDTA.
Valores de referencia: (Inf. 30)

Descripción: LIPOPROTEINA MEMBRANA HEPATICA (LSP) AC.SUERO
Código: ANTILSP
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml SUERO
Valores de referencia: = Negativo < 1:40
= Positivo > 1:40

Descripción: LIPOPROTEINA X
Código: LPX
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero
Valores de referencia: (Inf. 50) < 6 meses
(Inf. 10) > 6 meses

Descripción: LIPOSCALE: TEST AVANZADO DE LIPOPROTEINAS (RMN)
Código: LIPOSCALE
Técnica: RMN
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: LIQUIDO SINOVIAL CRISTALES
Código: LIQSICRIS
Técnica: Microscopía luz polarizada
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: Líquido sinovial (heparina sódica)5 ml. Aceptable Heparina litio.
Valores de referencia:

Descripción: LIQUIDOS Y EXUDADOS LDH
Código: LIQEXULDH
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 ºC
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: LIQUIDOS Y EXUDADOS PH
Código: LIQEXUPH
Técnica: Tira reactiva
Unidades:
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: LIQUIDOS Y EXUDADOS RECUENTO CELULAR
Código: LIQEXUCE
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Lisencefalia ligada al X tipo 1. Sec Gen: DCX
Código: GEN_000513
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Lisencefalia ligada al X tipo 1. Sec Gen: DCX
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Lisencefalia: >10 genes (NGS)
Código: LISENCEFAL
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: LISOZIMA EN LCR
Código: LISOZLCR
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia: (Inf. 2)

Descripción: LISOZIMA EN LIQUIDO PLEURAL
Código: LISOZLIQPL
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 15)

Descripción: LISOZIMA EN MUESTRAS BIOLÓGICAS
Código: LISOZIMA
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: También se realiza en líquidos biológicos.
Valores de referencia: (4 - 13)

Descripción: LISOZIMA ORINA (MURAMIDASA)
Código: LISOZI2
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 2)

Descripción:	LISOZIMA SUERO (MURAMIDASA)
Código:	LISOZI
Técnica:	turbidimetría (Micrococcus lysodeikticus)
Unidades:	mg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL de suero
Valores de referencia:	(2.5 - 8.0)

Descripción:	LISTERIA MONOCYTOGENES AC.
Código:	LISTEAC
Técnica:	Fijación del Compelemento
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero, no mandar tubo con gel separador
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo

Descripción:	Listeria monocytogenes DNA PCR suero
Código:	LISTSUEPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2mL Suero Alternativo: Sangre total EDTA, plasma
Valores de referencia:	

Descripción:	LITIO
Código:	LI
Técnica:	ESPECTROFOTOMETRÍA
Unidades:	mmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.4 - 0.8) T. profiláctica (0.6 - 1.2) T. fase aguda

Descripción:	LITIO ERITROCITOS
Código:	LIERI
Técnica:	ESPECTROMETRÍA DE MASAS/PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE
Unidades:	mmol/L
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 mL sangre total (EDTA) y 1 mL de plasma (EDTA). Se separa el plasma y se envía los dos tubos
Valores de referencia:	(0.2 - 0.45) LITIO ERITROCITOS (0.8 - 1.4) LITIO PLASMA (0.3 - 0.6) INDICE ERITOC/PLASM

Descripción: LKM AC. SUERO
Código: LKMAC
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo <1/40
= Positivo >1/40

Descripción: LORAZEPAM SUERO
Código: LORAZEPAM
Técnica: LC-MS/MS desde 2/1/2012, antesCromatografía líquida de alta resolución
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 ml
Valores de referencia: (50 - 240)

Descripción: Lormetazepam en suero
Código: LORMETAZEP
Técnica: Cromatografía Líquida de Alta Eficacia- Espectrometría de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero. Refrigerado. Alternativa 1 mL Plasma EDTA Tripotásico.
Valores de referencia: (5 - 25)

Descripción: Lowe, Sd. Sec Gen: OCRL
Código: GEN_000514
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Lp-PLA2 (Lipoprotein associated phospholipase A2)
Código: LPPLA2
Técnica: CLIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 21 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia:

Descripción: LRP4 (Low density lipopr receptor relat protein 4) AC. SUERO
Código: LRP4AC
Técnica:
Unidades:

Descripción: LRP4 (Low density lipopr receptor relat protein 4) AC. SUERO
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Se requiere información clínica.
Valores de referencia: =Negativo

Descripción: LSD EN ORINA
Código: LSD
Técnica: EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 mL orina (micción aislada)
Valores de referencia:

Descripción: Lujan-Fryns, Sd. Sec Gen: MED12
Código: GEN_000708
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LUTEINA (ANNE)
Código: LUTEI
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades: µg/dL
Plazo: 14 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero congelado
Valores de referencia: (3.98 - 22.75)

Descripción: M3 MITOCONDRIALES AC.
Código: AMA3
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: = Negativo <1:40
= Positivo > 1:40

Descripción: M4 MITOCONDRIALES AC.
Código: AMA4
Técnica: Téc, IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: M4 MITOCONDRIALES AC.
Valores de referencia: =<1:40 Negativo <1:40
=>1:40 Positivo>1:40

Descripción: M9 MITOCONDRIALES AC.
Código: AMA9
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: =<1:80 Negativo título<1:80
=>1:80 Positivo título>1:80

Descripción: MACRO AST SUERO
Código: MACROGOT
Técnica: PRECIPITACIÓN-ENZIMÁTICA
Unidades: % no precipit
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL.
Valores de referencia: (Inf. 27) Presencia de Macro AST

Descripción: MACRO TSH SUERO
Código: MACROTSH
Técnica: PRECIPITACIÓN-INMUNOLUMINISCENCIA
Unidades: %
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL Suero.
Valores de referencia:

Descripción: Macroamilasa
Código: MACROAMI
Técnica: Precipitación con Polietilenglicol
Unidades: %
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero
Valores de referencia: (Sup. 27) Ausencia de Macroamilasa

Descripción: Macrotrombocitopenia sordera neurosensorial progresiva. MYH9
Código: GEN_000516
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	MAG (MYELIN ASSOCIATED GLYCOPROTEIN) ANTICUERPOS IgM
Código:	MAGACM
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	MAG AC. IGM LCR (Glucoproteína asociada a mielina)
Código:	MAGACMLCR
Técnica:	Téc. Enzimoinmunoanálisis.
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1mL.
Valores de referencia:	

Descripción:	MAGNESIO
Código:	MG
Técnica:	
Unidades:	mmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.62 - 0.91) 2 dias - 4 dias (0.70 - 0.95) 5 meses - 6 años (0.70 - 0.86) 6 años - 12 años (0.70 - 0.91) 12 años - 20 años (0.66 - 1.07) > 20 años

Descripción:	MAGNESIO EN PLASMA SEMINAL
Código:	MGSEMEN
Técnica:	AAS
Unidades:	mg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(1.3 - 42.9)

Descripción:	MAGNESIO ERITROCITOS
Código:	MGERI
Técnica:	Espectrometría de absorción atómica
Unidades:	mg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 ML, alternativo Heparina litio/sódica
Valores de referencia:	(3.5 - 6.5)

Descripción: MAGNESIO ORINA
Código: MG2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mmol/24h
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (3 - 5)

Descripción: Malformac cavernosa cerebral hereditaria 1. Gen: KRIT1
Código: GEN_000518
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Malformac. venosas cutáneas y mucosas. Sec Gen: TEK
Código: GEN_000519
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Malformación cavernosa cerebral hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000517
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MALONDIALDEHÍDO PLASMA
Código: MALONDI
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: µmol/L
Plazo: 23 días
Tubo: Plasma EDTA Refrigerado
Comentario adicional: 1 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (Inf. 2.0)

Descripción: MammaPrint + BluePrint - Expresión génica
Código: MAMMAPRINT
Técnica: Expresión génica
Unidades:
Plazo: 15 días

Descripción: MammaPrint + BluePrint - Expresión génica
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Bloque de tejido tumoral. Tª ambiente
Tumor INFILTRANTE
Entregar a Asesoría Genética
Valores de referencia:

Descripción: MANGANESO EN SANGRE
Código: MANGANESO
Técnica: Espectrometría de emisión atómica-Espectrometría de masas
Unidades: mcg/L
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: TUBO ESPECIAL al final de la semana laboral
Valores de referencia: (Inf. 20)

Descripción: MANGANESO ORINA
Código: MN2
Técnica: Espectrometría emisión atómica-E. masas (ICP/MS) a partir 30/5.Técnica A.A.S.
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 ml orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 8) B.E.I: Personal expuesto

Descripción: MANGANESO SUERO
Código: MN
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: .No se puede realizar de plasma de Edta.
Valores de referencia: (Inf. 3.1)

Descripción: MANTOUX INTRADERMOREACCION
Código: MANTOUX
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: Marfan, enfermedad de, y aneurismas. Panel NGS
Código: GEN_000345
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Marfan, enfermedad de, y aneurismas. Panel NGS
Valores de referencia:

Descripción: Marinesco-Sjögren, Sd. Sec Gen: SIL1
Código: GEN_000520
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Mastocitosis: gen KIT mutación p.D816V (sec. Sanger)
Código: KIT_D816V
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: McArdle, enf.Glucogenosis tipo 5 Sec Gen: PYGM
Código: GEN_000331
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: McCune-Albright, Sd. Sec Gen: GNAS
Código: GEN_000521
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: MDA5 AC.SUERO
Código: MDA5
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: MDMA (EXTASIS) ORINA SCREENING
Código: TIRAEXTASI
Técnica: Inmunoensayo
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: MEDICION LDL ENZIMÁTICO DIRECTO
Código: DIRECTOLDL
Técnica: Enzimática directa
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero
Valores de referencia:
(Inf. 100) Recomendable
(100 - 129) Por encima de lo recomendable
(130 - 159) Linea límite alto
(160 - 189) Alto
(Sup. 189) Muy alto

Descripción: Melanoma familiar - susceptibilidad. Sec Gen: MC1R
Código: GEN_000522
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MELANOMA HEREDITARIO. Panel NGS >10 genes
Código: MELANOMH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MELANOMA SOMATICO. Mutaciones, fusiones
Código: NGS_MELS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: MELAS (encefalopatía mitocondrial): mtDNA (NGS)
Código: MELAS_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Melatonina
Código: MELATONINA
Técnica: Téc. Radioinmunoanálisis.
Unidades: pg/mL
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero congelado
Valores de referencia: (Inf. 30) De día
(Inf. 150) De noche

Descripción: MEMBRANA BASAL GLOMERULAR AC. SUERO
Código: MEMBRANAAC
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
(7 - 10) Indeterminado

Descripción: MEMBRANA HEPATICA (LMA) AC. SUERO
Código: MEMBRAHEAC
Técnica: IFI
Unidades: TITULO
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =<1:40

Descripción: Meningioma. Sec Gen: PDGFB
Código: GEN_000525
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MERCURIO EN PELO
Código: MERCURPELO

Descripción:	MERCURIO EN PELO
Técnica:	ESPECTROMETRÍA EMISIÓN ATÓMICA/ESPECTROMETRÍA MASAS
Unidades:	mcg/g
Plazo:	9 días
Tubo:	
Comentario adicional:	200 mg pelo aprox. Cabello de la zona inferior a la coronilla, agrupar mechón del grosor de un lápiz y cortar con tijeras tan cerca de la raíz como sea posible.
Valores de referencia:	(Inf. 2.0)

Descripción:	MERCURIO INORGANICO SANGRE (EDTA ESPECIAL)
Código:	HGINORGANI
Técnica:	Espectrofotometria de absorción atómica-generador hidruros
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Contenedor libre de metales. Al final de la semana laboral
Valores de referencia:	(Inf. 10) Exposición, Valor Límite Biológico (INSHT)

Descripción:	MERCURIO INORGANICO TOTAL ORINA
Código:	HGINORGAN2
Técnica:	Espectrofotometía de absorción atómica-generador de hidruros
Unidades:	mcg/g creatin.
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 mL orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 30) Personas expuestas a Mercurio (Adoptado ACGIH en 1993/INSHT 2003). Indice de exposición (B.E.I.)/Valor límite biológico. Antes de la jornada laboral

Descripción:	MERCURIO TOTAL ORINA
Código:	HG2
Técnica:	ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ATÓMICA/ESPECTROMETRÍA MASAS (ICP-MS)
Unidades:	mcg/g creatin.
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 mL orina micción aislada antes de la jornada laboral. Contenedor libre de metales.
Valores de referencia:	(Inf. 30) Personas expuestas a Mercurio (Adoptado ACGIH en 1993/INSHT 2003). Índice de exposición (B.E.I)/Valor límite biológico (VLB). Antes de la jornada laboral.

Descripción:	MERCURIO TOTAL SANGRE (EDTA ESPECIAL)
Código:	HG
Técnica:	Espectrometría de emisión atómica-Espectrometría de masas
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Contenedor libre de metales. EDTA dipotásico. Al final de la semana laboral
Valores de referencia:	(Inf. 10) Exposición, Valor Límite Biológico (INSHT)

Descripción: MERRF (epilepsia mioclónica mitocondrial): mtDNA (NGS)
Código: MERRF_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MESOTELINA SOLUBLE (MESOMARK) EN SUERO
Código: MESOTELINA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: nmol/L
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 1.5)

Descripción: METABOLISMO DE ESTROGENOS EN ORINA
Código: METESTROG2
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL de orina de la primera micción de la mañana. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:

Descripción: Metabolismo deficiente de fármacos. Sec Gen: CYP2C19
Código: GEN_000526
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE ANFETAMINA ORINA CONFIRMACION
Código: ANFETACONF
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml orina aislada
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE BARBITURICOS ORINA CONFIRMACION
Código: BARBI2CONF
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:

Descripción: METABOLITOS DE BARBITURICOS ORINA CONFIRMACION
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml orina aislada
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: METABOLITOS DE CANNABIS ORINA CONFIRMACION
Código: CANNACONF
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml orina aislada
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE COCAINA ORINA CONFIRMACION
Código: COCACONF
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE METADONA ORINA CONFIRMACION
Código: METADOCONF
Técnica: Téc. Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL. Micción aislada.
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: METABOLITOS DE OPIACEOS ORINA CONFIRMACION
Código: OPICONF
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Metabolopatías y respuesta a fármacos. Panel NGS
Código: GEN_000527
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: METAHEMOGLOBINA
Código: METAHB
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: % Hb total
Plazo: 4 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5 mL Sangre total Heparina litio (Refrigerado)
Valores de referencia: (Inf. 1.5) Exposición a Nitrobenceno o Inductores de Metahemoglobina

---

Código: METANEP
Descripción: METANEFRINAS EN PLASMA
Técnica: HPLC-Espectrometría de masas
Comentario adicional: 1 ml plasma (EDTA). Congelar y enviar congelado.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	METAN		Perfil, Metanefrina en plasma	pg/mL	(Inf. 90)
Prueba	NORMETAN		Perfil, Normetanefrina en plasma	pg/mL	(Inf. 180)

Código: METANEFR
Descripción: METANEFRINAS ORINA 24 HORAS
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico
Comentario adicional: 10 ml orina 24 horas con 60 ul de HCL 5N. Indicar diuresis de orina.Identificar tubo con el comentario +ácido

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HORAS_VOL		VOLUMEN DE ORINA: HORAS		
Prueba	METANE		PERFIL METANEFRINAS ORINA 24 HORAS METANEFRINA	µg/24h	(6.7 - 52) 1 año - 2 años (11 - 99) 2 años - 6 años (54 - 138) 6 años - 10 años (39 - 243) 10 años - 16 años (Inf. 341) > 16 años
Prueba	NORMETA		PERFIL METANEFRINAS ORINA 24 HORAS NORMETANEFRINA	µg/24h	(32 - 118) 1 año - 2 años (50 - 111) 2 años - 6 años (47 - 176) 6 años - 10 años (53 - 290) 10 años - 16 años (Inf. 444) > 16 años

---

Descripción: METANOL (ALCOHOL METILICO) EN ORINA
Código: METANOL2
Técnica: Cromatografía de gases - iInización de llama
Unidades: mg/L
Plazo: 11 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 15) Final del turno

Descripción: METAQUALONA (CRIBADO) ORINA
Código: METAQUALON

Descripción:	METAQUALONA (CRIBADO) ORINA
Técnica:	Inmunocromatografía cualitativa
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina
Valores de referencia:	= NEGATIVO

Descripción:	METIL ISOBUTIL CETONA ORINA
Código:	METISOBUCE
Técnica:	Cromatografía de gases-Ionización de Llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	11 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL.
Valores de referencia:	(Inf. 1) al final de la jornada laboral (exposición a METILISOBUTILCETONA) VLB-INSHT

Descripción:	METILETILACETONA
Código:	METILACETO
Técnica:	Cromatografía de gases-Ionización de Llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	11 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	5 mL orina final de la jornada laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 2) al final de la jornada laboral (exposición a METILETILCETONA) VLB-INSHT

Descripción:	METILFORMAMIDA ORINA
Código:	METILFORMA
Técnica:	Téc. cromatografía de gases
Unidades:	mg/L
Plazo:	15 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 15) Final de jornada

Descripción:	METOTREXATO
Código:	METOTRE
Técnica:	Inmunofluorescencia de polarización
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Enviar suero protegido de la luz
Valores de referencia:	(Inf. 5) A LAS 24 HORAS (Inf. 0.5) A LAS 48 HORAS (Sup. 5) Tóxico - A LAS 24 HORAS (Sup. 0.5) Tóxico - A LAS 48 HORAS

Descripción:	MGLUR1 ANTICUERPOS LCR (METABOTROPIIC GLUTAMATE RECEPTOR1)
Código:	MGLUR1LCR

Descripción: MGLUR1 ANTICUERPOS LCR (METABOTROPIIC GLUTAMATE RECEPTOR1)
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta (Cell Bindig Assay)
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR
Valores de referencia:

Descripción: MGLUR1 ANTICUERPOS NEURONALES (METABOTROPIC GLUTAMATE R.)
Código: MGLUR1AC
Técnica: Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: MGLUR5 ANTICUERPOS NEURONALES (METABOTROPIC GLUTAMATE R.)
Código: MGLUR5AC
Técnica: Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero refrigerado
Valores de referencia:

Descripción: MHPG ORINA (3-METOXI-4-HIDROXIFENILETILENGLICOL)
Código: MHPG
Técnica: HPLC
Unidades: mg/24 h
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ML DE ORINA 24, PH: 3
Valores de referencia: (0.9 - 2.4)

Descripción: Mi-1/Mi-2 AC. SUERO
Código: MI1MI2AC
Técnica: Técnica Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo
= Positivo

Descripción: MIA (Melanoma Inhibitory Activity)
Código: MIA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: µg/L
Plazo: 34 días

Descripción:	MIA (Melanoma Inhibitory Activity)
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml.congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(Inf. 12.00)

Descripción:	MIANSERINA EN SUERO
Código:	MIANSERINA
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 ml suero
Valores de referencia:	(30 - 120)

Descripción:	MICELIO CANDIDA ALBICANS AC. IGG
Código:	MICECANDID
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero
Valores de referencia:	=Título >1:160 Niveles significativos Título >1:160 Niveles significativos

Descripción:	MICROALBUMINA ORINA
Código:	MICROALB
Técnica:	Inmunoturbidimétrica
Unidades:	mg/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 20)

Descripción:	Microangiopatía cerebral con quistes y calcificaciones. CTC1
Código:	GEN_000528
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MICROBIOTA en HECES (KyberMetabolic)
Código:	MICROBIOTA
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	21 días
Tubo:	heces especiales

Descripción: MICROBIOTA en HECES (KyberMetabolic)

Comentario adicional: Heces recogidas en bote estéril.No congelar.
De lunes a martes fuera de Madrid.
De lunes a miercoles en Madrid.
Imprescindible rellenar formulario de Microbiota intestinal
Cantidad necesaria de heces al menos el equivalente a "tres nueces".
En el test se informa Microbiota, Zonulina y Acidos grasos de cadena corta (Acido Acetico, propionico y butirico)
Se envia al laboratorio de Microecología.

Valores de referencia:

Descripción: Microcefalia primaria autosómico recesiva. Panel NGS

Código: GEN_000530

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Microcefalia primaria: gen ASPM (NGS)

Código: MCPH5_GEN

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Microcefalia primaria: gen MCPH1 (NGS)

Código: MICROCEFAL

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Microcefalia. Panel Ampliado NGS

Código: GEN_000529

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Microdeleciones cromosoma Y en AZF

Código: DELCROM_Y

Técnica: PCR

Descripción: Microdeleciones cromosoma Y en AZF
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Microftalmia / Anoftalmia. Panel
Código: GEN_000531
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MICROSOMALES AC. SUERO (ANTI-TPO)
Código: MICROSOAC
Técnica: Téc. Inmunoensayo Magnético Quimioluminiscente
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 5.61)

Descripción: MIDAZOLAM EN SUERO
Código: MIDAZOLAM
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero
Valores de referencia: (50 - 600)

Descripción: MIELINA ANTICUERPOS EN SUERO
Código: MIELINAC
Técnica: Téc. Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia:

Descripción: MIELINA PROTEINA BASICA EN LCR
Código: MIELINALCR
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 23 días
Tubo: Líquidos Biológicos

Descripción: MIELINA PROTEINA BASICA EN LCR
Comentario adicional: 1 ml de LCR. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (Inf. 4)

Descripción: MIELOPEROXIDASA AC.
Código: MPO
Técnica: EIA
Unidades: IU/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia: (Inf. 3.5) Negativo
(3.5 - 5.0) Indeterminado

Descripción: Migraña hemipléjica famiiliar: <10 genes (NGS)
Código: MIGRAÑA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Migraña hemipléjica familiar 1: gen CACNA1A (NGS)
Código: MIGRAÑA_1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Migraña hemipléjica familiar tipo 2. Sec Gen: ATP1A2
Código: GEN_000532
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Milroy, enfermedad de. Sec Gen: FLT4
Código: GEN_000533
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Milroy, enfermedad de. Sec Gen: FLT4
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopat con defectos en la conducción / DCM+CCD. Panel
Código: GEN_000535
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía arritmogénica ventrículo derecho/ARVC. Panel
Código: GEN_000534
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía arritmogénica y m. súbita: >10 genes (NGS)
Código: ARRITMIA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada fam. aislada. Sec Gen: BAG3
Código: GEN_000536
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada tipo 1M. Sec Gen: CSRP3.
Código: GEN_000537
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada tipo 1R. Sec Gen: ACTC1
Código: GEN_000538

Descripción: Miocardiopatía dilatada tipo 1R. Sec Gen: ACTC1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada. Sec Gen: MYH7
Código: GEN_000539
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada: >10 genes (NGS)
Código: MCD
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada: gen DES (NGS)
Código: DES
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada: gen TNNT2 (NGS)
Código: TNNT2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica familiar: >10 genes (NGS)
Código: MCH
Técnica: NGS TSOE Illumina y MLPA

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica familiar: >10 genes (NGS)
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica familiar: gen MYBPC3 (NGS)
Código: MYBPC3
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica familiar: gen TTN (NGS)
Código: TTN
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica. Proteínas sarcoméricas. Panel
Código: GEN_000540
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía no compactada: >10 genes (NGS)
Código: MCNC
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía restrictiva / RCM. Panel NGS
Código: GEN_000541
Técnica:
Unidades:

Descripción: Miocardiopatía restrictiva / RCM. Panel NGS
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MIOGLOBINA ORINA
Código: MIOGLO2
Técnica: Inmunoquimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: (Inf. 21)

Descripción: MIOGLOBINA SUERO
Código: MIOGLO
Técnica: Inmunoturbidimetría
Unidades: ng/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero, alternativo plasma de EDTA y Heparina
Valores de referencia: (19 - 51) Mujer
(19 - 72) Hombre

Descripción: Miopatía con déficit de ISCU. Sec Gen: ISCU
Código: GEN_000544
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía cuerpos inclusión, Paget demencia frontotemp. VCP
Código: GEN_000543
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía de Brody. Sec Gen: ATP2A1
Código: GEN_000545
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Miopatía de Brody. Sec Gen: ATP2A1
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía de Salih. Sec Gen: TTN
Código: GEN_000546
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía distal de Laing. Sec Gen: MYH7
Código: GEN_000547
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía distal de Miyoshi. Sec Gen: DYSF
Código: GEN_000548
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía hereditaria con cuerpos de inclusión 2. Gen: GNE
Código: GEN_000549
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía miofibrilar alfa-B cristalina: gen CRYAB (NGS)
Código: CRYAB
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía miofibrilar. Panel NGS
Código: GEN_000550

Descripción: Miopatía miofibrilar. Panel NGS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía miotubular centronuclear ligada al X. Sec Gen: MTM1
Código: GEN_000551
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía mitocondrial anemia sideroblástic. Sec Gen: PUS1
Código: GEN_000552
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía nemalínica tipo 3. Sec Gen: ACTA1
Código: GEN_000553
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatías hereditarias: >10 genes (NGS)
Código: MIOPAT_GEN
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miotilinopatía. Sec Gen: MYOT
Código: GEN_000554
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Miotilinopatía. Sec Gen: MYOT
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miotonía agravada por potasio. Sec Gen: SCN4A
Código: GEN_000555
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miotonía congénita: gen CLCN1 (NGS)
Código: MIOTO_CONG
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miotonías no distróficas. Panel NGS
Código: GEN_000557
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MIRTAZAPINA EN SUERO
Código: MIRTAZAPIN
Técnica: LC-MS/MS (2/2/2012)Cromatografía Líquida de Alta Resolución.
Unidades: ng/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL.
Valores de referencia: (30.0 - 100.0)

Descripción: MITOCONDRIALES AC. (AMA) MUESTRA HUMANA
Código: AMAMUES
Técnica:
Unidades: Titulo
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: MITOCONDRIALES AC. SUERO
Código: AMA
Técnica: Técnica IFI
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo <1/40
= Positivo >1/40

Descripción: MITOTANO
Código: MITOTANO
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades: mcg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (14.0 - 20.0)

Descripción: MLPA de METILACIÓN Análisis de 1 mutación de cualquier gen
Código: MLPA_METIL
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Modificador de albinismo oculocután 2. Sec Gen: MC1R
Código: GEN_000558
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MOG AC. (MIELINA OLIGODENDROCITO GLICOPROTEINA) EN SUERO
Código: MOGAC
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades: Titulo
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: =<1/10 Negativo
=>1/10 Positivo

Descripción: MOLIBDENO EN ORINA
Código: MOLIBDENOO

Descripción:	MOLIBDENO EN ORINA
Técnica:	Espectrometría de Emisión Atómica-Espectrometría de Masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 ml de orina(micción aislada).
Valores de referencia:	(10 - 124)

Descripción:	MOLIBDENO SUERO
Código:	MOLIBDENO
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	(Inf. 3)

Descripción:	MONONUCLEOSIS AC. HETEROFILOS
Código:	HETEROAC
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Morfina en suero
Código:	MORFINA
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(10 - 100) Rango terapéutico

Descripción:	Mowat-Wilson, Sd. Sec Gen: ZEB2
Código:	GEN_000559
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MPRO SARS COV2 IGA IMMUNOSTEP
Código:	MPROCOVIDA
Técnica:	
Unidades:	Indice
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: MPRO SARS COV2 IGA IMMUNOSTEP
Comentario adicional: Suero
Alternativa: Plasma de EDTA, plasma de Heparina, plasma de citrato
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo

Descripción: MPRO SARS COV2 IGG IMMUNOSTEP
Código: MPROCOVIDG
Técnica:
Unidades: Indice
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Alternativa: Plasma de EDTA, plasma de Heparina, plasma de citrato
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo

Descripción: Mucolipidosis. Panel NGS
Código: GEN_000560
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Mucopolisacaridosis III: genes HGSNAT, NAGLU y SGSH (NGS)
Código: SANFILIPPO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Mucopolisacaridosis tipo 2 (enf. Hunter): gen IDS (NGS)
Código: HUNTER
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Mucopolisacaridosis. Panel NGS
Código: GEN_000561
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Mucopolisacaridosis. Panel NGS
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Muenke, Sd. Sec Gen: FGFR3
Código: GEN_000562
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MUESTRA BIOLOGICA INMUFENOTIPO LEUCOCITARIO
Código: INMFENOMUE
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: MULTIMEROS DEL FACTOR VON WILLEBRAND
Código: WILLEMULT
Técnica: Electroforesis
Unidades:
Plazo: 42 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 2.7 ml plasma citrato congelado
Aportar resultados de Antigeno y Actividad (ristocetina)de FvW
Resultados afectados por hemolisis
Valores de referencia:

Descripción: MUSCULO CARDIACO AC. SUERO
Código: MUSCARDIAC
Técnica: Técnica IFI
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =<1:20 Negativo < 1:20
=>1:20 Positivo > 1:20

Descripción: MUSCULO ESTRIADO AC. SUERO
Código: MUSESTRIAC
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero refrigerado.

Descripción: MUSCULO ESTRIADO AC. SUERO
Valores de referencia: (Inf. 40)

Descripción: MUSCULO LISO AC. SUERO (SMA)
Código: MUSLISOAC
Técnica: Técnica IFI
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo <1/80
= Positivo >1/80

Descripción: MUSCULO LISO AC. SUERO (SMA) MUESTRA HUMANA
Código: MUSLISOMUE
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades: Titulo
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: Hay que indicar tipo de muestra.
Valores de referencia:

Descripción: Mut. BRAF, RAS. Fusion RET, PAX8
Código: TIROID_MUT
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: PAAF, tejido tumoral parafinado. Tª ambiente
Rotular ONCO.
Valores de referencia:

Descripción: Mutac. Somaticas Pulmon 23 genes
Código: ONCOTISP23
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Bloque parafina o portas
Valores de referencia:

Descripción: Mutac. Somaticas Pulmon 50 genes
Código: ONCOTISP50
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Bloque parafina o portas
Valores de referencia:

Descripción: Mutac. Somaticas Pulmon15 genes
Código: ONCOTISP15
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Bloque parafina o portas
Valores de referencia:

Descripción: Mutación CSF3R-T618I
Código: CSF3R_T618
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: MUTACION DEL GEN DE LA CADENA PESADA DE LAS INMUNOGLO (IGHV)
Código: IGHV
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo:
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones EGFR, BRAF.Fusion ALK ROS1,RET,MET
Código: PANELPULMO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido tumoral tª ambiente: cortes de parafina hechos en anatomía patológica
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones en DNA mitocondrial: mtDNA (NGS)
Código: DNAMT_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones en DYPD, TYMS, y MTHFR asoc. a toxicidad a 5-fu
Código: FU_TOXIC

Descripción: Mutaciones en DYPD, TYMS, y MTHFR asoc. a toxicidad a 5-fu
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones en el gen BRAF V600X
Código: BRAF_MUTS
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: sangre en tubo EDTA.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones en el gen TP53 (exones 2-11)
Código: TP53
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tejido parafinado. Tª ambiente
Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 (NGS)
Código: BRCA_SOMAT
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido tumoral en cortes de parafina (se analizarán extensiones de la muestra para seleccionar el bloque adecuado).
Informe médico imprescindible
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones en los genes KRAS, BRAF, NRAS, PIK3CA, AKT
Código: PANELCOLON
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido tumoral. Tª ambiente: cortes de parafina hechos en anatomía patológica
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones gen CXCR4
Código: CXCR4_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones gen HCN4 (NGS)
Código: HCN4_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones gen HRAS (G12V, G13R y Q61R)
Código: HRAS_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones gen KIT
Código: KIT_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Sangre EDTA.
ROTULAR:ONCO
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones somáticas en genes IDH1, IDH2
Código: IDH1_2SOMA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: Tejido tumoral parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones somáticas gen BRAF (V600X)
Código: BRAF_SOMAT

Descripción: Mutaciones somáticas gen BRAF (V600X)
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: Tejido tumoral parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones somáticas gen KIT (exones 9, 11, 13 y 17)
Código: KIT_SOMAT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: Tejido tumoral parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones somáticas gen PDGFRA
Código: PDGFRA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido tumoral
ROTULAR: ONCO
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones somáticas gen PIK3CA
Código: PIK3CA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido tumoral parafinado. Tª ambiente
ROTULAR: ONCO.
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones somáticas genes CDKN1B y TP53
Código: CDKN1B_TP
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tejido tumoral
Rotulado con ONCO.
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones T674I o D842V en el gen PDGFRA
Código: PDGFRA_MUT
Técnica:

Descripción: Mutaciones T674I o D842V en el gen PDGFRA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Mycobacterium DNA PCR Cualitativa
Código: MYCOB_ATIP
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Muestra: esputo, broncoaspirado, sangre, LCR, colonias, biopsia, tejido, orina, etc.
Valores de referencia:

Descripción: Mycobacterium tuberculosis Ac. IgG en suero
Código: MYCOBACACG
Técnica: Técnica EIA
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Ausencia de anticuerpos

Descripción: Mycobacterium tuberculosis Ac. IgM en suero
Código: MYCOBACACM
Técnica: Técnica EIA
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 0.99) Indeterminado
(Sup. 1.0) Positivo

Descripción: Mycobacterium tuberculosis DNA PCR Cualitativa
Código: MYCOB_PCR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Muestra: esputo, broncoaspirado, sangre, LCR, colonias, biopsia, tejido, orina, etc.
Valores de referencia:

Descripción: MYCOPLASMA HOMINIS AC. IGG
Código: MYCOHOMAC

Descripción:	MYCOPLASMA HOMINIS AC. IGG
Técnica:	EIA
Unidades:	Índice
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma con anticoagulante
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado

Descripción:	MYCOPLASMA HOMINIS AC. IGM
Código:	MYCOHOMACM
Técnica:	EIA
Unidades:	Índice
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma con anticoagulante
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado

Descripción:	Mycoplasma Hominis en muestra por PCR
Código:	MYCOPCR
Técnica:	Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
Unidades:	
Plazo:	11 días
Tubo:	Muestra Citogenética
Comentario adicional:	Muestra endocervical(mujer). Muestra uretral(hombre). De manera alternativa orina
Valores de referencia:	

Descripción:	MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IGG EN LCR
Código:	MYCOPACGLC
Técnica:	Téc. Enzimoinmunoanálisis.
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.
Valores de referencia:	= Negativo <1.00 = Positivo >1.00

Descripción:	MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IGG SUERO
Código:	MYCOACG
Técnica:	Inmunoensayo quimioluminiscencia
Unidades:	UA/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 9.9) Negativo (Sup. 10) Positivo

Descripción: MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IgM EN LCR
Código: MYCOPACMLC
Técnica: Téc.Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo
(Sup. 1.00) Positivo

Descripción: MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IgM SUERO
Código: MYCOPLAACM
Técnica: Inmunoensayo de quimioluminiscencia
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 9.9) Probable ausencia de infección
(Sup. 10.0) Probable infección aguda

Descripción: Mycoplasma pneumoniae DNA PCR Cualitativa
Código: MYCOPNPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 14 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.Orina o suero
Muestras: suero, plasma, LCR, torunda seca, heces, orina, etc.
Valores de referencia: =Negativo Negativo

Descripción: MYCOPLASMAS GENITALES EN EXUDADO
Código: MYCOVAGI
Técnica: Cultivo
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional: Torunda con medio de transporte
Valores de referencia:

Descripción: N.METIL ACETAMIDA EN ORINA
Código: METILCETAM
Técnica: Téc. cromatografía de gases
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 13 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL.
Valores de referencia:

Descripción: NAG ORINA (N-ACETIL BETA D-GLUCOSAMINIDASA)
Código: NAG

Descripción: NAG ORINA (N-ACETIL BETA D-GLUCOSAMINIDASA)
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/g creatin.
Plazo: 5 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.7 - 5.7)

Descripción: Nefrolitiasis/osteoporosis hipofosfatémica 1. Gen: SLC34A1
Código: GEN_000564
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Nefrolitiasis: enfermedad de Dent 1. Sec Gen: CLCN5
Código: GEN_000563
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Nefronoptisis tipo 4. Sec Gen: NPHP4
Código: GEN_000565
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Nefronoptisis. Sec Gen: INVS
Código: GEN_000566
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Nefropatía quística medular tipo 1. Sec Gen: MUC1
Código: GEN_000567
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Nefropatía quística medular tipo 1. Sec Gen: MUC1
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Nefropatías y enfermedad renal. Panel NGS
Código: GEN_000569
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neisseria gonorrheae DNA PCR Cualitativa
Código: NEISSERPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: torunda sin medio y rotulada con BM.
Otras muestras: orina, torunda genital, semen, etc.
Valores de referencia:

Descripción: NEISSERIA GONORRHOEAE ANTICUERPOS
Código: GONOAC
Técnica: Fijacion de complemento
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1ml de suero refrigerado, (tubo sin gel)
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo

Descripción: NEISSERIA MENINGITIDIS AC IGG (POSTVACUNACIÓN)
Código: MENINGIGG
Técnica: Téc. Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: (Sup. 1) Positivo

Descripción: Neisseria meningitidis DNA PCR en Sangre
Código: MENINGPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 2 mL de sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: Neoplasia endocrina múltiple tipo 1: gen MEN1 (NGS)
Código: MEN1
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neoplasia endocrina múltiple tipo 2: gen RET (NGS)
Código: MEN2
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neoplasia endocrina múltiple. Panel NGS
Código: GEN_000570
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neoplasia endocrina múltipole tipo 4: gen CDKN1B (NGS)
Código: MEN4
Técnica: PCr, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: NEOPTERINA ORINA
Código: NEOPTE2
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: mcmol/molcreat
Plazo: 14 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL Orina.congelar. Proteger de la luz
Valores de referencia: (Inf. 220.0)

Descripción: NEOPTERINA SUERO
Código: NEOPTE

Descripción:	NEOPTERINA SUERO
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	nmol/l
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	suero congelado. Proteger de la Luz.
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	Netherton, Sd. Sec Gen: SPINK5
Código:	GEN_000571
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	NEUMOCOCO EN ORINA
Código:	NEUMOCOCO
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Muestra Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Neuroacantocitosis. Sec Gen: XK
Código:	GEN_000572
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Neurodeg acumulación cerebral hierro: Aceruloplasminemia. CP
Código:	GEN_000573
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Neurodeg. con depósitos de hierro: <10 genes (NGS)
Código:	PANK2_MUTS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Neurodeg. con depósitos de hierro: <10 genes (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neurodegeneración déficit de pantotenato quinasa. Gen: PANK2
Código: GEN_000574
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuroferritinopatía. Sec Gen: FTL
Código: GEN_000575
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neurofibromatosis tipo 1: gen NF1 (NGS)
Código: NF1_DNA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neurofibromatosis tipo 2: gen NF2 (NGS)
Código: NF2_DNA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: NEUROMIELITIS OPTICA (ACUAPORINA 4) ANTICUERPOS IGG
Código: ANTINMO
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: NEUROMIELITIS OPTICA (ACUAPORINA 4) ANTICUERPOS IGG

Comentario adicional:
1 mL Suero (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma EDTA Dipotásico (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (Refrigerado)

Valores de referencia:
=<1/10 Título Negativo
=>1/10 Título Positivo

Código: ANNA

Descripción: NEURONALES AC. (CV2,PNMA2,Ri,Yo,Hu,Amph,Recov,Titin,SOX,ZIC)

Técnica: Inmunoblot

Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	AMPHIPHY		PERFIL ANNA AMPHIPHYSINA AC. SUERO		
Prueba	CV2		PERFIL ANNA CV2 AC. SUERO		
Prueba	ACYO		PERFIL ANNA Yo AC. SUERO		
Prueba	ACHU		PERFIL ANNA Hu AC. SUERO		
Prueba	ACRI		PERFIL ANNA Ri AC. SUERO		
Prueba	PNMA2		PERFIL ANNA PNMA2 (Ma2/Ta) AC. SUERO		
Prueba	TRANTICUER		PERFIL ANNA ANTI Tr AC. (SUERO)		
Prueba	RECOVERIN		PERFIL ANNA RECOVERINA AC. SUERO		
Prueba	SOX1		PERFIL ANNA SOX1 AC. SUERO		
Prueba	TITINA		PERFIL ANNA TITINA AC. SUERO		
Prueba	ZICAC		PERFIL ANNA ZIC AC. SUERO		

Código: NEURACLCR

Descripción: NEURONALES DE SUPERFICIE ANTICUERPOS MOSAICO LCR

Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA

Comentario adicional: 1 mL LCR.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LGI1ACLCR		PERFIL LGI1 AC. ANTI RECEPTOR LCR		=>1/2 Título Positivo
Prueba	AMPA1ACLCR		PERFIL AMPA1 AC. ANTI RECEPTOR LCR		=>1/2 Título Positivo
Prueba	AMPA2ACLCR		PERFIL AMPA2 AC. ANTI RECEPTOR LCR		=>1/2 Título Positivo
Prueba	CASPR2LCR		PERFIL CASPR2 AC. ANTI RECEPTOR LCR		=>1/2 Título Positivo
Prueba	GABAACLCR		PERFIL GABA B AC. ANTI RECEPTOR LCR		=>1/2 Título Positivo
Prueba	NMDAACLCR		PERFIL NMDA AC. ANTI RECEPTOR LCR		

Código: MOSANEURO

Descripción: NEURONALES DE SUPERFICIE ANTICUERPOS MOSAICO SUERO

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NMDAACSUER		NMDA AC. ANTI RECEPTOR SUERO		
Prueba	AMPA1		AMPA 1 ANTICUERPOS SUERO		= Negativo Título < 1:10
Prueba	AMPA2		AMPA 2 ANTICUERPOS SUERO		= Negativo Título < 1:10
Prueba	ANTIGABA		GABA B (Subunid GABARB1/B2) AC.antireceptor, Suero		
Prueba	CASPR2		AC. ANTI RECEPTOR DE CASPR2 SUERO		
Prueba	LGI1		LGI 1 AC. ANTI RECEPTOR SUERO		= Valores de referencia indicativos: Se consideran niveles significativos a partir de título 1:10

Descripción: Neuronopatía óptica-sordera-distonía, Sd. Sec Gen: TIMM8A
Código: GEN_000577
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía ataxia retinosis pigmentosa. MTATP6. Mut. T8993G
Código: GEN_000580
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía atáxica sensitiva-disartria-oftalmoplejia. POLG
Código: GEN_000578
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía axonal gigante. Sec Gen: GAN
Código: GEN_000579
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Neuropatía axonal gigante. Sec Gen: GAN
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía con ataxia y retinosis pigmentosa. Gen: MTATP6
Código: GEN_000581
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía motora distal hereditaria 2A: gen HSPB8 (NGS)
Código: HSPB8_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía motora distal hereditaria 2C: gen HSPB3 (NGS)
Código: HSPB3_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía óptica hereditaria de Leber: 3 mutaciones mtDNA
Código: LHON_DNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía sensitiva con demencia sordera. Sec Gen: DNMT1
Código: GEN_000582
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Neuropatía sensitiva con demencia sordera. Sec Gen: DNMT1
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatías motoras sensoriales hereditarias. Panel NGS
Código: GEN_000583
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatías motoras y sens. agenesia cuerpo calloso. LC12A6
Código: GEN_000584
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatías sensitivas y autonómicas hereditarias. Panel NGS
Código: GEN_000585
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: NEUROPEPTIDO Y EN PLASMA
Código: NEUROPEPTY
Técnica: Radioinmunoensayo
Unidades: pmol/L
Plazo: 23 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 2 mL plasma EDTA.Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (31.0 - 70.0)

Código: NEUROTRLCR
Descripción: NEUROTRANSMISORES LCR
Técnica: Cromatografía líquida de Alta Resolución (HPLC)
Comentario adicional: 1 mL LCR. Recubrir tubo con papel de plata para proteger de la luz. Congelar y enviar congelado. Imprescindible enviar informe clínico.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes					
Prueba	OMDLCR		3ORTOMETILDOPA LCR	nmol/L	(24 - 148) 0-30 días (20 - 162) 1-5 meses (4 - 50) 6-24 meses (3 - 64) 3-6 años (5 - 60) 7-10 años (3 - 54) 11-16 años
Prueba	MHPGLCR		MHPG LCR	nmol/L	(44 - 106) 0-30 días (30 - 124) 1-5 meses (20 - 80) 6-24 meses (22 - 54) 3-6 años (13 - 68) 7-10 años (11 - 46) 11-16 años
Prueba	OHTRPLCR		5HIDROXITRIPTOFANO LCR	nmol/L	(0 - 24) 0-30 días (0 - 26) 1-5 mese (0 - 15) 6-24 meses (0 - 23) 3-6 años (0 - 16) 7-10 años (0 - 12) 11-16 años
Prueba	HIAALCR		5HIDROXIINDOLACETICOLCR	nmol/L	(428 - 1122) 0-30 días (217 - 1142) 1-5 meses (170 - 490) 6-24 meses (106 - 316) 3-6 años (87 - 366) 7-10 años (63 - 185) 11-16 años
Prueba	HVALCR		HOMOVANILICOLCR	nmol/L	(658 - 1434) 0-30 días (354 - 1328) 1-5 meses (344 - 906) 6-24 meses (304 - 658) 3-6 años (202 - 596) 7-10 años (156 - 410) 11-16 años
Prueba	HVAHIAALCR		RATIO HVA/5-HIAA LCR		(1.0 - 2.0) 0-30 días (1.0 - 2.5) 1-5 meses (1.0 - 3.5) 6-24 meses (2.0 - 3.5) 3-6 años (1.0 - 3.5) 7-10 años (1.5 - 3.0) 11-16 años
Prueba	HVAMHPGLCR		RATIO HVA/MHPG LCR		(5.0 - 30) 0-30 días (5.0 - 30) 1-5 meses (5.0 - 30) 6-24 meses (5.0 - 30) 3-6 años (5.0 - 30) 7-10 años (5.0 - 30) 11-16 años

Descripción: Neutropenia aloinmune neonatal. Sec Gen: FCGR3B
Código: GEN_000586
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neutropenia congénita 1: gen ELANE (NGS)
Código: NEUTROPENI
Técnica: NGS con TSOE de Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Neutropenia congénita 1: gen ELANE (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neutropenia congénita severa AR tipo 3. Sec Gen: HAX1
Código: GEN_000587
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Niemann-Pick. Panel NGS
Código: GEN_000589
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Nijmegen, Sd. Sec Gen: NBN
Código: GEN_000590
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: NIQUEL ORINA
Código: NIQUEL2
Técnica: Espectrometría de emisión atómica/Espectrometría de masas (ICP-MS)(Espectrofotometría de absorción atómica / Cámara de grafito hasta 3/09/2012)
Unidades: mcg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 5 ml de micción aislada al final de la semana laboral
Valores de referencia: (Inf. 5.0) Personas expuestas a sales insolubles de Níquel y Níquel metálico (Final semana) (BEI-ACGIH)
(Inf. 30.0) Personas expuestas a sales solubles de Níquel (Final semana) (BEI-ACGIH)

Descripción: NIQUEL ORINA FINAL DE JORNADA
Código: NIQUEL2F
Técnica: Espectrometría de emisión atómica/Espectrometría de masas (ICP-MS)(Espectrofotometría de absorción atómica / Cámara de grafito hasta 3/09/2012)
Unidades: mcg/L
Plazo: 7 días

Descripción:	NIQUEL ORINA FINAL DE JORNADA
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 5.0) Personas expuestas a sales insolubles de Níquel y Níquel metálico (Final semana) (BEI-ACGIH) (Inf. 30.0) Personas expuestas a sales solubles de Níquel (Final semana) (BEI-ACGIH)

Descripción:	NIQUEL SUERO
Código:	NIQUEL
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	mcg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 ml de suero, no utilizar tubos con gel separador
Valores de referencia:	(Inf. 4) No Expuesto (Inf. 10) Personas expuestas. (Basel RC. Biological Monitoring Methods for Industrial Chemicals). Indice de exposición (B.E.I) orientativo 10.0 mcg/L

Descripción:	Nistagmus congénito AD y ligado a X: <10 genes (NGS)
Código:	NISTAGMUS
Técnica:	NGS TSOE Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	NITRAZEPAM SUERO (MOGADON)
Código:	NITRAZEPAM
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(30 - 90)

Descripción:	NMDA AC. ANTI RECEPTOR SUERO
Código:	NMDAACSUER
Técnica:	Inmunocitoquímica (Cell Based Assay).
Unidades:	
Plazo:	13 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero refrigerado
Valores de referencia:	

Descripción:	N-METILFORMAMIDA (EXPOSICIÓN A DIMETILFORMAMIDA)
Código:	DMFORMAMI
Técnica:	cromatografía de gases

Descripción: N-METILFORMAMIDA (EXPOSICIÓN A DIMETILFORMAMIDA)
Unidades: mg/L
Plazo: 17 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: 10 ml orina micción aislada al final de la jornada laboral
Valores de referencia:

Descripción: NMP22 (MARCADOR TUMORAL VEGIJA) ORINA
Código: NMP22
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 15 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: TUBOS ESPECIALES, ORINA CON SOLUCION ESTABILIZADORA E INSTRUCCIONES
Valores de referencia: (Inf. 7.5)

Descripción: NOCARDIA SPP. PCR MUESTRA
Código: NOCARDIPCR
Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN (PCR)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo:
Comentario adicional: Muestra biológica.
Valores de referencia:

Descripción: NOR-90 AC. SUERO
Código: NOR90AC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo
= Positivo

Descripción: Norovirus y Saprovirus RNA PCR muestra
Código: NOROVIRPCR
Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN a TIEMPO REAL RT-PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: Heces y vómitos. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:

Descripción: NT-PRO-BNP (NT-PRO-PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL)
Código: PROBNP
Técnica: ICMA
Unidades: pg/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Congelado

Descripción: NT-PRO-BNP (NT-PRO-PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL)
Comentario adicional: Suero. Tubo alternativo es plasma de EDTA y heparina.
Valores de referencia: (Inf. 105) Hombre < 75 años
(Inf. 163) Hombre > 75 años
(Inf. 109) Mujer < 75 años
(Inf. 243) Mujer > 75 años

Descripción: NUCLEARES AC SUERO
Código: ANA
Técnica: Técnica IFI
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo <1/160
= Positivo >1/160

Descripción: NUMERO TOTAL HEMATIES
Código: HEMATIES
Técnica:
Unidades: 10^6/µL
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (4.60 - 6.20) Hombre
(4.20 - 5.40) Mujer

Descripción: NUMERO TOTAL LEUCOCITOS
Código: LEUCOCITOS
Técnica:
Unidades: 10^3/µL
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (4.00 - 11.00)

Descripción: NUMERO TOTAL PLAQUETAS
Código: PLAQ
Técnica:
Unidades: 10^3/µL
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (130 - 450)

Descripción: nuria
Código: NURIA
Técnica: Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades:
Plazo: 2 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: nuria
Comentario adicional: 2-3 mg tejido. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (200 - 1200)

Descripción: NXP2 AC.SUERO
Código: NXP2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: Obesidad monogénica no sindrómica: <10 genes (NGS)
Código: OBESI_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Obesidad mórbida. Sec Gen: MC4R
Código: GEN_000592
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Obesidad. Panel NGS
Código: GEN_000591
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Obesidad. Sec Gen: PPARG
Código: GEN_000593
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Oftalmoplejia ext. crónica progresiva AD tipo 4. Gen: POLG2
Código: GEN_000594
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Oftalmoplejia externa progresiva AR. Sec Gen: POLG
Código: GEN_000595
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: OJ AC. SUERO
Código: OJAC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: OLANZAPINA SUERO
Código: OLANZAPINA
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem masas.
Unidades: ng/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL.
Valores de referencia: (20 - 80)

Descripción: OLIGOSACARIDOS ORINA
Código: OLIGOSACAR
Técnica: Electroforesis capilar
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 ml de orina (micción aislada)
CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:

Código: OMALIZUMAB
Descripción: OMALIZUMAB Y AC. ANTI OMALIZUMAB
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Comentario adicional: 2 ml de suero. Toma de muestra antes de la administración de la próxima dosis.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	OMALIZ		OMALIZUMAB (P. PERFIL)	mcg/mL	
Prueba	OMALIZAC		ANTI OMALIZUMAB (P. PERFIL)		

Descripción: Omenn. Panel NGS
Código: GEN_000596
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Oncoproteína HER-2/neu en suero
Código: HER2NEU
Técnica: EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Congelar inmediatamente
Valores de referencia: (Inf. 15)

Descripción: Oncotype próstata: expresión génica
Código: ONCOTYPROS
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Bloque de tejido tumoral e informes anatomía patológica e inmunohistoquímica, lo gestiona asesoría genética
Valores de referencia:

Descripción: Oncotype: expresión génica
Código: ONCOTYPE
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Bloque de tejido tumoral mama. Tª ambiente
Tumor INFILTRANTE
Entregar a Asesoría Genética
Valores de referencia:

Descripción: OPIACEOS
Código: OPIA
Técnica: Inmunoensayo
Unidades:
Plazo: 5 días

Descripción: OPIACEOS
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: OPIACEOS EN PELO (NEODIAGNOSTICA)
Código: OPIAPELO
Técnica: LC-MS/MS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: PEDIR KIT ESPECIAL A CARMEN DEL PALACIO.
Agrupar mechón del grosor de un lápiz y cortar con tijeras tan cerca de la raiz como sea posible (NO es imprescindible que sea de la coronilla). Una vez cogida la muestra poner en papel de aluminio indicando con un rotulador cual es la zona de la raiz

Valores de referencia:

Descripción: Organoides (PDO) + Dianas terapeúticas + Panel fusiones
Código: ONCOPDONGS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra de biopsia fresca para el PDO NO tiene que pasar por laboratorio central, va directamente a Megalab Alemania.
Debe de enviarse refrigerada a 4ºC.
Muestra de tejido parafinado Tª ambiente

Valores de referencia:

Descripción: Organoides (PDO) + tratamiento y pronóstico + Panel fusiones
Código: PDONGSCMPT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra de biopsia fresca para el PDO NO tiene que pasar por laboratorio central, va directamente a Megalab Alemania.
Debe de enviarse refrigerada a 4ºC.
Muestra de tejido parafinado Tª ambiente

Valores de referencia:

Descripción: Organoides (PDO) + tratamiento y pronóstico + Panel fusiones
Código: PDONGSCMPT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra de biopsia fresca para el PDO NO tiene que pasar por laboratorio central, va directamente a Megalab Alemania.
Debe de enviarse refrigerada a 4ºC.
Muestra de tejido parafinado Tª ambiente

Valores de referencia:

Descripción: Organoides (PDO) + tratamiento y pronóstico + Panel fusiones
Código: PDONGSCMPT
Técnica:

Descripción: Organoides (PDO) + tratamiento y pronóstico + Panel fusiones
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra de biopsia fresca para el PDO NO tiene que pasar por laboratorio central, va directamente a Megalab Alemania.
Debe de enviarse refrigerada a 4ºC.
Muestra de tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Organoides (PDO) + tratamiento y pronóstico + Panel fusiones
Código: PDONGSCMPT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra de biopsia fresca para el PDO NO tiene que pasar por laboratorio central, va directamente a Megalab Alemania.
Debe de enviarse refrigerada a 4ºC.
Muestra de tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Organoides derivados del paciente PDO
Código: ONCOPDO
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Muestra de biopsia fresca que NO tiene que pasar por laboratorio central, va directamente a Megalab Alemania.
Debe de enviarse refrigerada a 4ºC.
Valores de referencia:

Descripción: ORTO CRESOL EN ORINA (Exposicion a Tolueno)
Código: ORTOCRESOL
Técnica: Téc. HPLC
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 9 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral.
enviar refrigerada.
Valores de referencia: (Inf. 0.6) Final de jornada (exposición TOLUENO)

Descripción: OSMOLALIDAD ORINA
Código: OSMOLAL2
Técnica: Osmometría
Unidades: mOsm/Kg
Plazo: 3 días
Tubo: Orina HSR
Comentario adicional:
Valores de referencia: (300 - 1300) > 15 años
(50 - 600) < 15 años

Descripción: OSMOLALIDAD SUERO
Código: OSMOLALI
Técnica: Osmometría
Unidades: mOsm/Kg
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (275 - 300)

Descripción: OSTEOCALCINA SUERO
Código: OSTEOCAL
Técnica: Inmunoensayo por quimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Valores de referencia: (12 - 52.1) Hombre
(6.5 - 42.3) Mujer Premenopausia
(5.4 - 59.1) Mujer Posmenopausia

Descripción: Osteocondromatosis 1 y 2: <10 genes (NGS)
Código: OSTEOCONDR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Osteodisplasia poliq. leucoencefalopatía esclerosant. Panel
Código: GEN_000597
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Osteogénesis imperfecta ampliado. Panel NGS
Código: GEN_000598
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Osteogénesis imperfecta: genes COL1A1 y COL1A2 (NGS)
Código: OSTEOG_IMP

Descripción: Osteogénesis imperfecta: genes COL1A1 y COL1A2 (NGS)
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Osteopetrosis infantil maligna. Sec Gen: CLCN7
Código: GEN_000599
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Osteopetrosis; Albers-Schonberg, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000600
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: OVARIO AC. SUERO
Código: OVARIOAC
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =<1:20 Negativo <1:20
=>1:20 Positivo >1:20

Descripción: OXAZEPAM
Código: OXAZEPAM
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (200 - 1400)

Código: OXCARBA
Descripción: OXCARBAZEPINA Y SU METABOLITO
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Comentario adicional: 1 mL suero. Muestra extraída en pre-dosis. Refrigerar.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	OXCAR		NIVEL OX. SUERO	µg/mL	
Prueba	HIDROXICAR		METABOLITO ACTIVO DE OXCARBAZEPINA	µg/mL	(10.0 - 35.0) Margen terapeútico Oxcarbazepina+10-OH-carbazepina

Descripción: OXIHEMOGLOBINA
Código: OXIHB
Técnica:
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (94 - 99) Adultos

Descripción: p155-p140 (TIF1 GAMMA) ANTICUERPOS SUERO
Código: P155P140
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: P16:gen CDKN2A. Cancer pancreas (NGS)
Código: P16_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Código: ORIGENBIEN
Descripción: Pack Bienestar Gold Origenlab
Técnica:
Comentario adicional: Kit especial, solicitar a Asesoría genética
Muestra: sangre EDTA, saliva o trounda seca para ADN

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NUTRIGEN		T. genetico nutricion y metabolismo		
Prueba	DEPORGEN		T. genetico predisposicion rendimiento deportivo		
Prueba	DERMAGEN		T. genetico tratamiento facial y cosmetico		
Prueba	ANCESTROS		T. genetico origen ancestros		

Componentes					
Prueba	TELOTEST		ESTUDIO DE TELOMEROS		

Código: ORIGENUTRI
Descripción: Pack Nutrición Origenlab
Técnica:
Comentario adicional: Kit especial, solicitar a Asesoría genética
Muestra: sangre EDTA, saliva o trounda seca para ADN

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NUTRIGEN		T. genetico nutricion y metabolismo		
Prueba	INTALIGEN		Test genético intolerancia gluten, lactosa y fructosa		
Prueba	SUPLEMEN		Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas		

Código: ORIGENSALU
Descripción: Pack Salud Origenlab
Técnica:
Comentario adicional: Kit especial, solicitar a Asesoría genética
Muestra: sangre EDTA, saliva o trounda seca para ADN

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TROMBO_AVA		Panel avanzado de trombofilia: 23 genes		
Prueba	FARMAGEN75		Estudio genético de respuesta a 75 fármacos		
Prueba	PANERIESGO		Panel de riesgo genético		

Descripción: Paget del hueso, enfermedad de. Sec Gen: TNFRSF11A
Código: GEN_000601
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pallister-Hall, Sd. Sec Gen: GLI3
Código: GEN_000602
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: P-AMINO FENOL (ANILINA)
Código: P.AMINOFEN
Técnica: Cromatografía Líquida de Alta Eficacia.
Unidades: mg/L
Plazo: 12 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 mL orina fin de jornada laboral (Enviar refrigerada)
Valores de referencia: (Inf. 50) Personas expuestas a ANILINA. Valor Límite Biológico (VLB-INSHT). Al final de la jornada laboral.

Descripción: Pancreatitis crónica hereditaria. Sec Gen: CTRC
Código: GEN_000603
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pancreatitis hereditaria. Sec Gen: CFTR
Código: GEN_000604
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pancreatitis hereditaria: gen PRSS1 (NGS)
Código: PRSS1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Pancreatitits hereditaria: gen SPINK1 (NGS)
Código: SPINK1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: PANEL IGH-IGK. Clonalidad B, NGS en leucemias y linfomas
Código: GEN_000786

Descripción: PANEL IGH-IGK. Clonalidad B, NGS en leucemias y linfomas
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Panel avanzado de trombofilia: 23 genes
Código: TROMBO_AVA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Panel básico de trombofilias: FII, FV Leiden y MTHFR
Código: TROMBO_BAS
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Panel de riesgo genético
Código: PANERIESGO
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Se puede hacer en saliva, previo envío de kit de recolección de saliva
Valores de referencia:

Descripción: Panel de trombofilias: FII, FV Leiden, MTHFR y FXII
Código: TROMBO_PAN
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Panel de trombofilias: FII, FV Leiden, MTHFR y FXII

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: PANEL EMR LINFOIDE. Enfermedad mínima Residual por NGS

Código: GEN_000789

Técnica:

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas ONCO. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: PANEL EMR MIELOIDE. Enfermedad mínima Residual por NGS

Código: GEN_000788

Técnica:

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: PANEL FUSIONES genes de fusión oncología mediante NGS

Código: NGS_FUSION

Técnica:

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Bloque parafina. Tª ambiente

Valores de referencia:

Código: PGASTROPCR

Descripción: Panel gastrointestinal PCR, heces

Técnica: PCR

Comentario adicional: Heces refrigeradas.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	GIPCAMPYLO		Perfil Campylobacter spp PCR . heces		
Prueba	GIPCLOSTRI		Perfil Clostridium difficile toxinas A/B PCR, heces		
Prueba	GIPPRESIOM		Perfil Plesiomonas shigelloides PCR, heces		
Prueba	GIPSALMON		Perfil Salmonella spp. PCR , heces		
Prueba	GIPVIBRIOP		Perfil Vibrio parahaemolyticus PCR, heces		
Prueba	GIPVIBRIOC		Perfil Vibrio cholerae PCR, heces		
Prueba	GIPVIBRIOV		Perfil Vibrio vulnificus PCR, heces		

Componentes					
Prueba	GIPYERSINI		Perfil Yersinia enterocolitica PCR, heces		
Prueba	GIP_EAEC		Perfil E.coli enteroagregativa PCR, heces		
Prueba	GIP_EPEC		Perfil E.coli enteropatogenica PCR, heces		
Prueba	GIP_ETEC		Perfil E.coli enterotoxigénica PCR, heces		
Prueba	GIP_STEC		Perfil E.coli productor de toxinas Shiga PCR, heces		
Prueba	GIP_ECOLI		Perfil E.coli O157:H7 PCR, heces		
Prueba	GIPCRYPTO		Perfil Cryptosporidium spp. PCR, heces		
Prueba	GIPCYCLOSP		Perfil Cyclospora cayetanensis PCR, heces		
Prueba	GIPENTAMO		Perfil Entamoeba histolytica PCR, heces		
Prueba	GIPGIARDIA		Perfil Giardia intestinalis PCR, heces		
Prueba	GIPADENOVI		Perfil Adenovirus F 40/41 PCR, heces		
Prueba	GIPASTROVI		Perfil Astrovirus PCR, heces		
Prueba	GIPNOROVI		Perfil Norovirus GI PCR, heces		
Prueba	GIPNOROVII		Perfil Norovirus GII PCR, heces		
Prueba	GIPROTAVIR		Perfil Rotavirus A PCR, heces		
Prueba	GIPSAPOV		Perfil Sapovirus GI/GII/GIV/GV PCR, heces		

Descripción: Panel germinal NGS <10 genes
Código: NGSINF10
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: CONSULTAR SIEMPRE ANTES A ASESORÍA GENÉTICA

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Panel germinal NGS >10 genes
Código: NGSSUP10
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: CONSULTAR SIEMPRE ANTES A ASESORÍA GENÉTICA

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Panel HRD def. recombinación homóloga (NGS) 13 genes
Código: PANEL_HRD
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días

Descripción: Panel HRD def. recombinación homóloga (NGS) 13 genes
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Panel NGS
Valores de referencia:

Descripción: PANEL LINFOIDE: mut somaticas mediante NGS
Código: NGS_LINFOI
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: PANEL MIELOIDE: mut somaticas mediante NGS
Código: NGS_MIELOI
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO,.
IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Panel somatico genes: TET2, DNMT3A, SF3B1, ASXL1 y TP53
Código: GENES_CHIP
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO,.
IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA
Valores de referencia:

Descripción: PANEL TCR. Clonalidad T por NGS en leucemias y linfomas
Código: GEN_000787
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Valores de referencia:

Descripción: PANEL TERAPIA Y PRONOSTICO. Mutaciones somáticas por NGS
Código: TRAT_PRON
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Descripción: PANEL TERAPIA Y PRONOSTICO. Mutaciones somáticas por NGS
Comentario adicional: Bloque parafina. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: PANEL TERAPIA. mut. somáticas para terapia (NGS)
Código: TUMOR_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Bloque parafina. Tª ambiente
ROTULAR ONCO
Valores de referencia:

Descripción: PAPERAS AC. IGG SUERO
Código: PAPERASACG
Técnica: CLIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero. Las pruebas realizadas confirman que es posible utilizar EDTA potásico y heparina sódica como anticoagulantes
Valores de referencia: (Sup. 11) Positivo

Descripción: PAPERAS AC. IGM SUERO
Código: PAPERASACM
Técnica: Técnica EIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.9 - 1.1) Indeterminado
(Inf. 0.9) Negativo

Descripción: PAPERAS IGG EN LCR
Código: PAPERASGLC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: PAPERAS IGM EN LCR
Código: PAPERASMLC
Técnica: Téc. Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR

Descripción: PAPERAS IGM EN LCR
Valores de referencia: (Inf. 1.0) Negativo

Descripción: PAPILOMAVIRUS ANTICUERPOS IGG SUERO
Código: PAPILOIGG
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: (Sup. 1) ó =1 Positivo
(Inf. 1) Negativo

Descripción: Paquioniquia congénita. Panel NGS
Código: GEN_000607
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PARACETAMOL EN SUERO
Código: PARACETA
Técnica: EIA
Unidades: µg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (10 - 25) ..Nivel terapéutico
(Sup. 200) ..Toxicidad-pico máximo-(a las 4 h.de la toma)
(Sup. 50) ..Nivel tóxico a las 12 h.
(Inf. 120) ..Niveles tolerables a las 4 h. post-ingestión

Descripción: PARAINFLUENZA (1-4) AC IGG
Código: PARAIN4ACG
Técnica: téc. EIA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.09) Indeterminado

Descripción: PARAINFLUENZA (1-4) AC IGM
Código: PARAIN4ACM
Técnica: Téc. EIA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: PARAINFLUENZA (1-4) AC IGM
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.1) Indeterminado

Descripción: Parálisis periódica hipercalémica 1. Sec Gen: SCN4A
Código: GEN_000608
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Parálisis periódica hipocal.: genes CACNA1S y SCN4A (NGS)
Código: PARHIPOCAL
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Parálisis periódica hipocalémica 1 y 2. Panel NGS
Código: GEN_000609
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Paramiotonía congénita. Sec Gen: SCN4A
Código: GEN_000610
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PARA-NITROFENOL EN ORINA
Código: PNITFEN
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 17 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina al final semana laboralexposición NITROBENCENO; al final de la jornada laboral para exposición a PARATION
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 11 (SPG11): gen SPG11 (NGS)
Código: SPG11_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 2 (SPG2): gen PLP1 (NGS)
Código: SPG2_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 30 (SPG30): gen KIF1A (NGS)
Código: SPG30
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 31 (SPG31): gen REEP1 (NGS)
Código: REEP1_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 3A (SPG3A): gen SPG3A (NGS)
Código: SPG3A_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 4 (SPG4): gen SPAST (NGS)
Código: SPG4_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningúa aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 6 (SPG6): gen NIPA1 (NGS)
Código: SPG6_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 7 (SPG7): gen SPG7 (NGS)
Código: SPG7_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000611
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica ligada al X 1. Sd. Masa y Crash. L1CAM
Código: GEN_000612
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica ligada al X tip 2. Sec Gen: PLP1
Código: GEN_000613

Descripción: Paraplejia espástica ligada al X tip 2. Sec Gen: PLP1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica: >10 genes (NGS)
Código: SPG_TOTAL
Técnica: NGS con TSO de Illumina y MLPA para algunos genes
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestras de tejido tumotal y sangre.
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PARASITOS HECES
Código: PARAS
Técnica: microscopia optica
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Heces Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PARATHORMONA INTACTA
Código: PTHINTAC
Técnica:
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Congelar si no se envía en el día.
Alternativo, suero.
Valores de referencia: (18.32 - 87.71) Adultos

Descripción: Parechovirus, determinación cualitativa
Código: PARECHOVIR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Parkinson, enfermedad de. Panel NGS
Código: GEN_000615
Técnica:

Descripción: Parkinson, enfermedad de. Panel NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PAROXETINA
Código: PAROXETINA
Técnica: Técnica LC-MS/MS,(HPLC hasta 27/10/2011)
Unidades: ng/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 ml suero
Valores de referencia: (20 - 65)

Descripción: PARVOVIRUS AC. Ig G EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: PARVOACIGG
Técnica: Enzimoinmunoanalisis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 0.5 ml de LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: PARVOVIRUS AC. Ig M EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: PARVOACIGM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: PARVOVIRUS B19 AC. IGG SUERO
Código: PARVB19ACG
Técnica: Técnica CLIA (Hasta fecha 15/11/2011 Técnica ELISA)
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa: plasma (EDTA, citrato y heparina)
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: PARVOVIRUS B19 AC. IGM SUERO
Código: PARVB19ACM
Técnica: Técnica CLIA (Hasta 15/11/2011 Técnica EIA)

Descripción: PARVOVIRUS B19 AC. IGM SUERO
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa: plasma (citrato, plasma, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: Parvovirus B19 DNA PCR Cualitativa
Código: PARVOVIDNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: PARVOVIRUS B19 DNA PCR MUESTRA BIOLOGICA
Código: PARVODNAMU
Técnica: Hibridación molecular con amplificación (PCR)
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestras aceptadas:
2mL suero
Médula ósea (EDTA)
Líquido amniótico
Líquido sinovial
Tejido
Valores de referencia:

Descripción: Paternidad Prenatal no invasiva
Código: PATERPREN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: sangre materna e hisopo bucal presunto padre. Kit especial. Pedir a Asesoría genética.
Valores de referencia:

Descripción: Patología esquelética hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000616
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Patología muscular hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000617
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Patología renal quística hereditaria del adulto. Panel NGS
Código: GEN_000618
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Patologías de la Retina. Panel
Código: GEN_000619
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Patologías del espectro branquio-oto-renal. Panel NGS
Código: GEN_000620
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Patologías del tejido conectivo. Panel NGS
Código: GEN_000621
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PCA-2 (CITOPLASMA DE CELULAS DE PURKINJE TIPO 2 AC.SUERO
Código: PCA2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días

Descripción: PCA-2 (CITOPLASMA DE CELULAS DE PURKINJE TIPO 2 AC.SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: =No se detectan

Descripción: P-CLOROBENCENO ORINA(EXPOSICION A)
Código: P.CLOROFEN
Técnica: Técnica HPLC
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 23 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml orina aislada al final de la semana laboral
Valores de referencia:

Descripción: PCNA (PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN) AC.
Código: AC.PCNA
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: PCR - Ultrasensible
Código: PCRULTRA
Técnica: Inmunoquimica
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero o plasma heparina
Valores de referencia: (Inf. 0.3)

Descripción: PCR EN RESTOS ABORTIVOS
Código: PCRABORT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Muestra Citogenética
Comentario adicional: Muestra en medio de cultivo. Refrigerada.
Contactar con genetica@megalab.es para envío de medio
Valores de referencia:

Descripción: PDGFR AC.SUERO
Código: PDGFR
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: PDGFR AC.SUERO
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: Pendred, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000622
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pepsinogeno I en suero
Código: PEPSINOG
Técnica: Técnica EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 22 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero
alternativa: 1 ml plasma citrato
1ml plasma edta, 1 ml plasma heparina
Valores de referencia: (Sup. 25.0)

Descripción: PEPTIDO C EN ORINA
Código: PEPTIDCORI
Técnica: Inmunoluminiscencia
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 5 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 ml orina 24. Indicar volumen 24 h
Valores de referencia: (30 - 118)

Descripción: PEPTIDO C SUERO
Código: PEPTIC
Técnica: Téc. ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero o plasma heparina
Valores de referencia: (0.8 - 5.2)

Descripción: PEPTIDO CICLICO CITRULINADO AC. SUERO
Código: PEPCICITRU
Técnica: Téc..ICMA
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero/ Plasma Heparina/ Plasma EDTA tripotásico.
Valores de referencia: (Inf. 5) Negativo

Descripción:	PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO PLASMA (VIP)
Código:	VIP
Técnica:	RIA
Unidades:	pmol/L
Plazo:	23 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma EDTA congelado
Valores de referencia:	(Inf. 30.0)

Descripción:	Peptido Liberador de Pro-Gastrina (Pro-GRP) en suero
Código:	GRP
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 50)

Descripción:	PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL PLASMA
Código:	BNP
Técnica:	Inmunoensayo Magnético Quimioluminiscente
Unidades:	ng/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma EDTA congelado
Valores de referencia:	(Inf. 100)

Descripción:	PEPTIDOS DE GLUTEN EN HECES
Código:	GLUTHECES
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	2 g heces. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	=Negativo

Descripción:	PERAMPANEL (FYCOMPA)
Código:	PERAMPANEL
Técnica:	Cromatografía Líquida -Tándem Masas
Unidades:	ng/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(180 - 980)

Descripción:	PERFIL (CLOZAPINA + DESMETILCLOZAPINA)
Código:	SUMACLOZAP
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas
Unidades:	mcg/L

Descripción: PERFIL (CLOZAPINA + DESMETILCLOZAPINA)
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma EDTA Tripotásico (Refrigerado)
Valores de referencia: (100 - 800)

Descripción: PERFIL AMPA1 AC. ANTI RECEPTOR LCR
Código: AMPA1ACLCR
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: =>1/2 Título Positivo

Descripción: PERFIL AMPA2 AC. ANTI RECEPTOR LCR
Código: AMPA2ACLCR
Técnica: Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia: =>1/2 Título Positivo

Descripción: PERFIL ANNA Ri AC. SUERO
Código: ACRI
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PERFIL ANNA Yo AC. SUERO
Código: ACYO
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PERFIL ANNA ZIC AC. SUERO
Código: ZICAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: PERFIL ANNA ZIC AC. SUERO
Valores de referencia:

Descripción: PERFIL CASPR2 AC. ANTI RECEPTOR LCR
Código: CASPR2LCR
Técnica: Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia: =>1/2 Título Positivo

Código: CITOVAG
Descripción: PERFIL CITOLOGÍA VAGINAL
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT		NREGCIT		
Prueba	ESTHORM		ESTHORM		
Prueba	CATCALIDAD		CATCALIDAD		
Prueba	ESTMICRO		ESTMICRO		
Prueba	ASPMORG		Aspecto Morfológico		
Prueba	RESDIAG		Resumen Diagnóstico		
Prueba	NOTACITO		Nota Citologia		
Prueba	SNOMEDC		SNOMED Citologías		
Prueba	PATO		PATÓLOGO		
Prueba	TDMVAGINAL		TIPO DE MUESTRA VAGINAL		
Prueba	CITOTECNIC		CITOTÉCNICO		

Descripción: PERFIL CLOZAPINA EN SUERO
Código: CLOZAPINA
Técnica: HPLC-Espectrometría de masas
Unidades: mcg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml Suero
Alt. 1 ml plasma de edta tripotásico
Valores de referencia: (300 - 800)

Código: CLOZAPINAS
Descripción: PERFIL CLOZAPINA Y DESMETILCLOZAPINA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CLOZAPINA		PERFIL CLOZAPINA EN SUERO	mcg/L	(300 - 800)
Prueba	DESCLOZAPI		PERFIL DESMETILCLOZAPINA	mcg/L	(100 - 300)
Prueba	SUMACLOZAP		PERFIL (CLOZAPINA + DESMETILCLOZAPINA)	mcg/L	(100 - 800)

Descripción: PERFIL DESMETILCLOZAPINA
Código: DESCLOZAPI
Técnica:
Unidades: mcg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml Suero
Alt. 1 ml plasma de edta tripotásico
Valores de referencia: (100 - 300)

Descripción: PERFIL DIAZEPAM (DIAZEPAM)
Código: DIAZEPAM
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL de suero
Valores de referencia:

Código: PEADRENAL
Descripción: PERFIL ESTRES ADRENAL EN SALIVA CORTISOL /DEHA-S
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Comentario adicional: 1 mL de Saliva por toma. Toma de muestras de 8h, 12h, 16h, y 24h en tubos especiales (salivette).
En la hora previa a la toma de la muestra: No tomar ningún alimento, bebida, medicamento, masticar chicle ni aplicar ningún producto en los labios.
Tampoco se lave los dientes ni utilice ningún colutorio para enjuagarse la boca.
INSTRUCCIONES:
-Destapar el tubo correspondiente (1, 2, 3 o 4) según la hora, y, con las manos limpias y la punta de los dedos, extraer la torunda el tubo.
-Introducir la torunda en la boca, mantenerla 2 minutos por debajo de la lengua, para que quede totalmente empapada de saliva. Deberá realizar ligeros movimientos de mandíbula espaciados en el tiempo, durante esos 2 minutos, para estimular la salivaci
-Volver a introducir la torunda (impregnada en saliva) en el tubo pequeño y taparlo correctamente.
Conservar refrigeradas todas las muestras hasta la entrega en el laboratorio.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PEACORT8		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 8H	ng/mL	(3.00 - 9.00)
Prueba	PEACORT12		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 12H	ng/mL	(1.50 - 3.00)
Prueba	PEACORT16		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 16H	ng/mL	(1.00 - 3.00)
Prueba	PEACORT24		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 24H	ng/mL	(0.80 - 1.20)
Prueba	PEADEHAS12		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA DEHA-S 12	ng/mL	(3.00 - 10.00)
Prueba	PEADEHAS16		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA DEHA-S 16	ng/mL	(3.00 - 10.00)
Prueba	PEACP		PERFIL ESTRES ADRENAL SALI VALOR PROMEDIO CORTISOL (12H-16H)	ng/mL	

Componentes					
Prueba	PEADP		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA VALOR PROMEDIO DHEA-S (12H-16H)	ng/mL	
Prueba	PEAGRAFI		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA GRAFICO		

Descripción: Perfil Etiocolanolona, orina
Código: ETIOCOL2
Técnica:
Unidades: mg/24 h
Plazo: 10 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia: (1.50 - 5.00)

Descripción: PERFIL GABA B AC. ANTI RECEPTOR LCR
Código: GABAACLCR
Técnica: Cell Binding Assay IFI
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia: =>1/2 Título Positivo

Descripción: Perfil Indice Amiloide (Peptido 1-42/Peptido 1-40)
Código: INDICEAMIL
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Índice
Plazo: 17 días
Tubo: Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional: 2 mL LCR. Congelar la muestra inmediatamente.
Se requiere recoger la muestra de LCR en tubo de polipropileno.
Valores de referencia: (Inf. 0.10)

Descripción: PERFIL LGI1 AC. ANTI RECEPTOR LCR
Código: LGI1ACLCR
Técnica: Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia: =>1/2 Título Positivo

Descripción: Perfil Linf Th17 (CXCR3-CCR6+), % LT CD4+
Código: LINF_TH17
Técnica: Citofluorimetría de flujo
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia

Descripción: Perfil Linf Th17 (CXCR3-CCR6+), % LT CD4+

Comentario adicional: 1 mL Sangre total EDTA a temperatura ambiente

Valores de referencia:
(1 - 8) < 2 años
(3 - 7) 3 años - 4 años
(4 - 11) 5 años - 6 años
(3 - 10) 7 años - 8 años
(5 - 11) 9 años - 13 años
(6 - 14) > 14 años

Código: TH1Y2_TH17

Descripción: Perfil linfocitario Th1/Th2/Th17/Tfh, sangre total

Técnica: Citofluorimetría de flujo

Comentario adicional: 1 mL Sangre total (anticoagulante: EDTA)

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINF_TFH		Perfil Linf Tfh CXCR5+, % LT CD4+	%	(0.12 - 1.16) < 1 año (1.49 - 5.03) 2 años - 6 años (1.65 - 8.11) 7 años - 19 años (3.59 - 10.45) > 20 años
Prueba	LINF_TH1		Perfil Linf Th1 (CXCR3+CCR6-), % LT CD4+	%	(3 - 17) < 2 años (6 - 17) 3 años - 4 años (8 - 18) 5 años - 6 años (6 - 22) 7 años - 8 años (9 - 21) 9 años - 13 años (11 - 28) > 14 años
Prueba	LINF_TH2		Perfil Linf Th2 (CXCR3-CCR6-), %LT CD4+	%	(5 - 14) < 2 años (6 - 15) 3 años - 4 años (7 - 19) 5 años - 6 años (5 - 14) 7 años - 8 años (8 - 14) 9 años - 13 años (7 - 16) > 14 años
Prueba	LINF_TH17		Perfil Linf Th17 (CXCR3-CCR6+), % LT CD4+	%	(1 - 8) < 2 años (3 - 7) 3 años - 4 años (4 - 11) 5 años - 6 años (3 - 10) 7 años - 8 años (5 - 11) 9 años - 13 años (6 - 14) > 14 años
Prueba	LINF_TH1_7		Perfil Linf Th 1/17 (CXCR3+CCR6+), % LT CD4+	%	(1 - 6) < 2 años (2 - 7) 3 años - 4 años (3 - 10) 5 años - 8 años (4 - 14) 9 años - 13 años (7 - 19) > 14 años

---

Código: LYMECD57NK

Descripción: PERFIL LYME CITOMETRÍA (CD57+NK CÉLULAS)

Técnica: Citometría de flujo

Comentario adicional: 5 ml de EDTA. Envío inmediato

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LYMELINFT		PERFIL LYME LINFOCITOS TOTALES	/µL	
Prueba	LYMECD57		PERFIL LYME CD57	%	(2 - 23)
Prueba	LYMECD57T		PERFIL LYME CD57 TOTALES	/µL	(40 - 500)
Prueba	LYMECD3NO		PERFIL LYME CD57 CD3- (NK CÉLULAS)	%	(2 - 60)

Componentes					
Prueba	LYMECD3NT		PERFIL LYME CD57 CD3- (NK CÉLULAS)	/µL	(100 - 360)

Código: MFENIDRITA
Descripción: PERFIL METILFENIDATO Y ACIDO RITALINICO SUERO
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia-Espectrometría de masas
Comentario adicional: 1 mL suero/ alternativa 1 mL plasma Heparina litio. Refrigerar

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MFENIDATO		Perfil Metilfenidato en suero	µg/L	(8 - 30)
Prueba	RITALINICO		Perfil Acido Ritalinico en suero	µg/L	(80 - 300)

Código: MFENITRIT2
Descripción: PERFIL METILFENIDATO Y ACIDO RITANILICO EN ORINA
Técnica: Cromatografia de gases -Espectrometria de masas
Comentario adicional: 5 ML DE ORINA REFRIGERADA

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MFENIDATO2		PERFIL METILFENIDATO Y ACIDO RITANILICO EN ORINA	ng/mL	
Prueba	RITANILIC2		PERFIL METILFENIDATO Y ACIDO RITANILICO EN ORINA	ng/mL	

Código: NKVERDADE
Descripción: PERFIL NK VERDADEROS CITOMETRIA
Técnica: Citometria de flujo
Comentario adicional: 5 ML DE EDTA ENVIO INMEDIATO

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NKVERDACD3		PERFIL NK VERDADERO CD3	%	(50 - 81)
Prueba	NKVERDCD56		PERFIL NK VERDADERO CD56	%	(8 - 20)
Prueba	NKVERCD94		PERFIL NK VERDADERO CD94	%	
Prueba	NKVERDADER		PERFIL NK VERDADEROS((CD3- CD16+ CD56+ CD94+)	%	(3.5 - 11.2)
Prueba	NKVERD16Y3		PERFIL NK VERDADERO CD16+CD3-	%	(5 - 16)

Descripción: PERFIL NMDA AC. ANTI RECEPTOR LCR
Código: NMDAACLCR
Técnica: Inmunocitoquímica (Cell Based Assay).
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: Líquidos Biológicos

Descripción: PERFIL NMDA AC. ANTI RECEPTOR LCR
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia:

Descripción: Perfil Peptido Beta-Amiloide(1-42), LCR
Código: PEPBETAMIL
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional: 1 ml LCR congelado
Valores de referencia: (610 - 974) 21 años - 50 años
(562 - 1018) 51 años - 71 años
(567 - 1027) > 71 años

Código: POOLNACOVI
Descripción: Perfil Pool Nasal Coronavirus SARS COV 2 RT PCR
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	POOLNASCOV		Pool Nasal Coronavirus SARS 2 RT-PCR		
Prueba	COVNASRES		RESULTADO SARS-COV2 RT-PCR NASAL		
Prueba	COV_CT		Resultado interno COVID Ct		
Prueba	COVENVIO		ENVIO COVID LAB EXTERNO		

Código: POOLSACOVI
Descripción: Perfil Pool Saliva Coronavirus SARS COV 2 RT PCR
Técnica:
Comentario adicional: Muestra saliva (solicitar al almacén Valderribas)

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	POOLSALCOV		Pool Saliva Coronavirus SARS 2 RT-PCR		
Prueba	COVSALRES		RESULTADO SARS-COV2 RT-PCR SALIVA		
Prueba	COV_CT		Resultado interno COVID Ct		
Prueba	COVENVIO		ENVIO COVID LAB EXTERNO		

Código: PORCENTUMO
Descripción: Perfil porcentaje tumoral
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes					
	ADN_TUMOR				
Prueba	ENRIQ_MUES		Enriqueciemiento de la muestra		

Descripción: Perfil T4 Reguladores(CD4+CD25+CD127 low) TOTALES
Código: T4REGULATO
Técnica:
Unidades: cel/mm3
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (25 - 74)

Descripción: PF4-HEPARINA AC.SUERO (FACTOR PLAQUETARIO 4-HEP)
Código: PF4AC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 2 mL plasma(citrato) pobre en plaquetas(doble centrifugación a 2500g/15min.Aspirar parte superior).CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:

Descripción: PGD-HLA Informatividad enfermedades frecuentes
Código: HLAPGTINFR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PGD-HLA Informatividad enfermedades no frecuentes
Código: HLAPGTINNF
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA
También Hisopo bucal
Valores de referencia:

Descripción: PGD-Informatividad enfermedades frecuentes
Código: PGTINFREC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:

Descripción: PGD-Informatividad enfermedades frecuentes
Valores de referencia:

Descripción: PGD-Informatividad enfermedades no frecuentes
Código: PGTINFNOF
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PGT aneuploidías
Código: PGTA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PGT monogénicas
Código: PGTM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Picnodisostosis. Sec Gen: CTSK
Código: GEN_000623
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Piebaldismo. Sec Gen: KIT
Código: GEN_000624
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pierson, Sd. Sec Gen: LAMB2
Código: GEN_000625
Técnica:

Descripción: Pierson, Sd. Sec Gen: LAMB2
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: PIRIDINOLI
Descripción: PIRIDINOLINA Y DESOXIPIRIDINOLINA EN ORINA
Técnica: HPLC
Comentario adicional: 5 mL de orina (1º micción de la mañana).
Podrían ser aceptables otras muestras de orina. No es necesaria dieta específica.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PIR		Piridinolina	nmol/mmol crea.	(26 - 91)
Prueba	DPIR		Desoxipiridinolina	nmol/mmol crea.	(3 - 21)

Descripción: PIRUVATO QUINASA ERITROCITOS
Código: PQERI
Técnica: Cinética - Espectrofotometría
Unidades: mU/10^9 erit.
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 mL sangre total Heparina . Envío inmediato
Alt. sangre total EDTA
Valores de referencia: (60 - 220)

Descripción: PIRUVICO A LOS 30 MINUTOS
Código: PIRUVICO30
Técnica: Cinetica- Espectrofotometria ultravioleta
Unidades: mg/dl
Plazo: 4 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Preparación especifica de la muestra tubo especial con instrucciones adjuntas
Valores de referencia:

Descripción: PL-7/PL-12 AC. SUERO
Código: PL7PL12AC
Técnica: Técnica Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =Negativo

Descripción: PLAQUETAS AC. SANGRE TOTAL
Código: PLAQUEAC
Técnica: Citometría de flujo

Descripción: PLAQUETAS AC. SANGRE TOTAL
Unidades: %
Plazo: 5 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: 15 mL Sangre Total EDTA. Envío INMEDIATO a temperatura ambiente. Si el recuento es inferior a 20000 plaquetas/mcL, indispensable envío de 25 mL y envío en 24H.
Valores de referencia: (Inf. 30) Negativo
(Sup. 30) Positivo

Descripción: PLAQUETAS ANTICUERPOS SUERO
Código: ACPLAQUE
Técnica: Técnica IFI.
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Titulo <1:20 Negativo
= Titulo >1:20 Positivo

Descripción: PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Código: PRP
Técnica: Centrifugación
Unidades:
Plazo:
Tubo: Citrato especial (Sangre total)
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación. Solicitar kit y tubos a almacén.
Determinación disponible únicamente en Hospital Zarzuela, Granada, Estepona y Toledo(laboratorio Virtudes)
Valores de referencia:

Descripción: PLASMINOGENO EN PLASMA
Código: PLASMINOGE
Técnica: Técnica cromogénica
Unidades: %
Plazo: 8 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 3 mL Plasma Citrato Sódico congelado
Valores de referencia: (80 - 120)

Descripción: PLASMINOGENO ACTIVADOR TISULAR (tPA) PLASMA
Código: PLASMIACTI
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 23 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1mL Plasma Citrato Sódico congelado
Valores de referencia: (2.0 - 8.0)

Descripción: Plasmodium DNA PCR Cualitativa
Código: MALARIAPCR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:

Descripción: Plasmodium DNA PCR Cualitativa
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinacion: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: PLASMODIUM SPP ANTICUERPOS (MALARIA) SUERO
Código: PLASMOAC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero,alt (plasma de citrato, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado
(Sup. 11) Positivo

Descripción: PLATA EN ORINA
Código: AG2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml de orina aislada
Valores de referencia: (Inf. 1)

Descripción: PLATA EN SUERO
Código: PLATASUERO
Técnica: Espectrometría de masas -Plasma acoplado inductivamente
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero.
Valores de referencia: (Inf. 5)
(Inf. 200) Terapéutico

Descripción: PLATINO EN ORINA
Código: CISPLAORIN
Técnica: Téc. espectrometría de emisión atómica/espectrometría de masas
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.05) Valor orientativo

Descripción: PLATINO SUERO
Código: PLATINO
Técnica: Escpectometría de Emisión Atómica/Espectrometria de Masas (ICP-MS)
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días

Descripción:	PLATINO SUERO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(600 - 18000) Pico (100 - 400) Valle (Inf. 1) Control de personal expuesto

Descripción:	PLOMO EN SANGRE
Código:	PB
Técnica:	téc. AAS
Unidades:	µg/dL
Plazo:	6 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 mL.sangre total EDTA Momento de toma de muestra no es crítico
Valores de referencia:	(Inf. 70) Valor Límite Biológico (INSHT) (Inf. 25)

Descripción:	PLOMO ORINA
Código:	PB2
Técnica:	Técnica Espectrofotometría de masas-Plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades:	mcg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 mL orina OFJ (micción aislada)
Valores de referencia:	

Descripción:	PM-1 Ac. SUERO
Código:	PM.1
Técnica:	Técnica Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	= Negativo

Descripción:	PNEUMOCYSTIS JIROVECII (CARINII) IF LIQ. BIOLOGICO
Código:	PNECARAG
Técnica:	Tinción plata-metenamina
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	Lavado brocoalveolar, esputo. Volumen 15 ml
Valores de referencia:	

Descripción:	Pneumocystis jirovecii DNA PCR cualitativa
Código:	PNEUMODNA
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	10 días

Descripción: Pneumocystis jirovecii DNA PCR cualitativa
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Muestras: MUESTRA RESPITARORIA (moco, esputo, torunda nasofaríngea, BAS, BAL, etc)
Valores de referencia:

Descripción: Poliarteritis nodosa. Deficienc adenosin deaminasa-2. ADA2
Código: GEN_000626
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Policitemia vera: gen JAK2 exón 12
Código: JAK2_EX.12
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:

Descripción: Poliendocrinopatía autoinmune tipo 1. Sec Gen: AIRE
Código: GEN_000627
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismo FSHR: respuesta estimulación ovárica
Código: FSHRPOLIM
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismo rs4149056 asoc a miopatías induc por estatinas
Código: SLCO1B1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Polimorfismo rs4149056 asoc a miopatías induc por estatinas
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismo rs738409 asociado a hígado graso no alcohólico
Código: PNPLA3_SNP
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismos C889T y C3953T de genes IL-1A y IL-1B respect.
Código: IL1ABMUTS
Técnica: PCR y digestión
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: sangre o puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta).
Valores de referencia:

Descripción: Polineuropatía amiloide familiar: secuenciación gen TTR
Código: ANDRADE
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Polineuropatía, sordera, ataxia, ret. pig. catarata. ABHD12
Código: GEN_000629
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Polioma virus (JC-BK), LCR PCR Cualitativa
Código: POLIOLCR
Técnica: Q-PCR
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR refrigerado

Descripción: Polioma virus (JC-BK), LCR PCR Cualitativa
Valores de referencia:

Descripción: Polioma virus JC, Sangre PCR Cualitativa
Código: POLIOSANGR
Técnica: Q-PCR
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 mL sangre total EDTA. Refrigerada
Valores de referencia:

Descripción: POLIOVIRUS ANTICUERPOS
Código: POLIOVAC
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 33 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: (Inf. 8.00) Negativo

Descripción: POLIPEPTIDO PANCREATICO
Código: PPANCREATI
Técnica: RIA
Unidades: pmol/L
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero congelar inmediatamente
Valores de referencia: (Inf. 100)

Descripción: Poliposis adenomatosa familiar (cáncer colon): gen APC (NGS)
Código: APC_MUT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal Ampliado. Panel NGS
Código: GEN_000635
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal auto. dom: genes PKD1 y PKD2 (NGS)
Código: ADPKD

Descripción: Poliquistosis renal auto. dom: genes PKD1 y PKD2 (NGS)
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal autos recesiva: gen PKHD1 (NGS)
Código: ARPKD
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal. Panel NGS
Código: GEN_000634
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pool Nasal Coronavirus SARS 2 RT-PCR
Código: POOLNASCOV
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra nasal
Valores de referencia:

Descripción: Pool Saliva Coronavirus SARS 2 RT-PCR
Código: POOLSALCOV
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra saliva (solicitar al almacén Valderribas)
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria cutánea tarda. Sec Gen: UROD
Código: GEN_000637
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Porfiria cutánea tarda. Sec Gen: UROD
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria eritropoyética congénita. Sec Gen: UROS
Código: GEN_000638
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria hepática aguda. Sec Gen: ALAD
Código: GEN_000639
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria intermitente aguda: gen HMBS (NGS)
Código: PORFIRIA
Técnica: NGS con TSOE Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria variegata. Sec Gen: PPOX
Código: GEN_000640
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria. Panel NGS
Código: GEN_000641
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: PORFIHECES
Descripción: PORFIRINAS EN HECES
Técnica: HPLC
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COPROH		COPROPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 5)
Prueba	UROH		UROPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 1.2)
Prueba	PROTOH		PROTOPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 8)
Prueba	HEPTAH		HEPTACARBOXILPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 0.5)

Código: PORFIFRA2
Descripción: PORFIRINAS FRACCIONADAS EN ORI
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Comentario adicional: 10 ml de orina de 24 h

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COPROP		Perfil TETRACARBOXILPORFIRINAS EN ORINA	mcg/24 h	(Inf. 96) Hombre (Inf. 60) Mujer
Prueba	UROP		Perfil OCTACARBOXILPORFIRINAS EN ORINA	mcg/24 h	(Inf. 46) Hombre (Inf. 22) Mujer
Prueba	PENTA		Perfil PENTACARBOXILPORFIRINAS EN ORINA	mcg/24 h	(Inf. 4) Hombre (Inf. 3) Mujer
Prueba	HEXAC		Perfil HEXACARBOXILPORFIRINAS EN ORINA	mcg/24 h	(Inf. 5) Hombre (Inf. 4) Mujer
Prueba	HEPTAC		Perfil HEPTACARBOXILPORFIRINAS EN ORINA	mcg/24 h	(Inf. 13) Hombre (Inf. 9) Mujer

---

Código: PORFIRFRAC
Descripción: PORFIRINAS FRACCIONADAS SANGRE TOTAL
Técnica: HPLC
Comentario adicional: 1 ML SANGRE TOTAL EDTA

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PROTOPFRAC		PROTOPORFIRINA EN SANGRE	mcg/dL eritroc	(Inf. 80)
Prueba	COPROPFRAC		COPROPORFIRINA EN SANGRE	mcg/dL eritroc	(Inf. 2)

Descripción: PORFOBILINOGENO DESAMINASA ERITROCITOS
Código: PORFOBGDES
Técnica: Espectrofotometría visible
Unidades: pmol/mg prot
Plazo: 17 días

Descripción:	PORFOBILINOGENO DESAMINASA ERITROCITOS
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	2 ml
Valores de referencia:	(Sup. 66) Actividad normal (57 - 66) Línea límite (Inf. 57) Actividad disminuída

Descripción:	PORFOBILINOGENO ORINA
Código:	PORFOBILI
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	Proteger de la luz 10 ML DE ORINA DE 24 HORAS
Valores de referencia:	(Inf. 3.4)

Descripción:	POTASIO
Código:	K
Técnica:	
Unidades:	mmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(3.5 - 5.1)

Descripción:	POTASIO ORINA
Código:	K2
Técnica:	Potenciometría directa
Unidades:	mmol/24h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(25 - 100)

Descripción:	PREALBUMINA SUERO
Código:	PREALB
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativa plasma EDTA
Valores de referencia:	(16 - 45) Hombre (14 - 38) Mujer (7 - 25) Hasta 1 año (11 - 34) De 1 - 12 años

Descripción:	PRECIPITINA PLUMAS DE PERIQUITO
Código:	PLUMAPERIQ
Técnica:	Inmunodifusión Ouchterlony

Descripción: PRECIPITINA PLUMAS DE PERIQUITO
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =Negativo

Descripción: PRECIPITINAS ALTERNARIA ALTERNATA
Código: ALTERNAAC
Técnica: Téc. Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Código: ASPERGIAC
Descripción: PRECIPITINAS ASPERGILLUS SUERO
Técnica: Téc. Inmunodifusión Ouchterlony
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ASPFUMISO		PERFIL PRECIPITINAS ASPERGILLUS FUMIGATUS (SOMATICO)		= Negativo
Prueba	ASPFUMIME		PERFIL PRECIPITINAS ASPERGILLUS FUMIGATUS (METABOLICO)		= Negativo
Prueba	ASPNIGER		PERFIL PRECIPITINAS ASPERGILLUS NIGER		= Negativo
Prueba	ASPNIDUL		PERFIL PRECIPITINAS ASPERGILLUS NIDULANS		= Negativo
Prueba	ASPTERRE		PERFIL PRECIPITINAS ASPERGILLUS TERREUS		= Negativo
Prueba	ASPFLAVUS		PERFIL PRECIPITINAS ASPERGILLUS FLAVUS		= Negativo

---

Descripción: PRECIPITINAS CANDIDA ALBICANS
Código: CANDIPRECI
Técnica: Inmunodifusión doble
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: PRECIPITINAS EXCREMENTOS DE CANARIO
Código: EXCRECAAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 16 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero

Descripción: PRECIPITINAS EXCREMENTOS DE CANARIO
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: PRECIPITINAS EXCREMENTOS DE PALOMA
Código: EXPALOMA
Técnica: Inmunodifusión-Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PRECIPITINAS EXCREMENTOS DE PERIQUITO
Código: EXCREPEAC
Técnica: Téc. Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: PRECIPITINAS EXCREMENTOS GALLINA EN SUERO
Código: SUEGALLIAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ML SUERO
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: PRECIPITINAS FUSARIUM CULMORUM
Código: FUSARIAC
Técnica: Téc. Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PRECIPITINAS MICROPOLYSPORA FAENI
Código: MICROFAE
Técnica: Téc. Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: PRECIPITINAS PENICILLIUM NOTATUM
Código: PENINOTAAC

Descripción: PRECIPITINAS PENICILLIUM NOTATUM
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: PRECIPITINAS PLUMAS DE CANARIO
Código: PLUMACANAR
Técnica: Inmunodifusión-Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (2-8 ºC - Refrigerar)
Valores de referencia: =Negativo

Descripción: PRECIPITINAS PLUMAS DE GALLINA
Código: PLUMAGALLI
Técnica: Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =Negativo

Descripción: PRECIPITINAS PLUMAS DE PALOMA
Código: PLUMAPALOM
Técnica: Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =Negativo

Descripción: PRECIPITINAS SUERO DE LORO
Código: SUERLORO
Técnica: Téc. Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: SUERO REFRIGERADO
Valores de referencia:

Descripción: PRECIPITINAS SUERO DE PALOMA
Código: SUEPALOMA
Técnica: Téc. Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: PRECIPITINAS SUERO DE PALOMA
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PRECIPITINAS SUERO DE PERIQUITO
Código: SUEPERIQUI
Técnica: Téc. Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =Negativo

Descripción: PRECIPITINAS THERMOACTINOMYCES VULGARIS
Código: TERMOVUL
Técnica: Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero refrigerado
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: PRECIPITINAS: SUERO DE GALLINA
Código: SUEGALLINA
Técnica: Inmunodifusión
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: PREGABALINA (LYRICA) SUERO
Código: PREGABALIN
Técnica: Cromatografía Líquida Tándem Masas.
Unidades: mcg/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (1.0 - 8.0) Rango terapeútico orientativo

---

Descripción: PREGNANDIOL ORINA
Código: PREGNANDI
Técnica: Cromatografía gases - Ionización de llama
Unidades: mg/24 h
Plazo: 12 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 25 mL de orina de 24 h.

Descripción: PREGNANDIOL ORINA

Valores de referencia:
(Inf. 0.1) < 2 años
(Inf. 0.3) 2 años - 5 años
(Inf. 0.5) 5 años - 9 años
(0.1 - 0.70) Hombre 9 años - 15 años
(0.1 - 1.90) Hombre > 15 años
(0.1 - 1.2) Mujer 9 años - 15 años
(0.1 - 2.6) Mujer Folicular
(2.6 - 10.60) Mujer Luteínica
(10 - 100) Mujer Embarazo

Descripción: PREGNANTRIOL ORINA

Código: PREGNANTRI

Técnica: Cromatografía gases - Ionización de llama

Unidades: mg/24 h

Plazo: 12 días

Tubo: Orina 24 Horas

Comentario adicional: 25 mL orina de 24 h.

Valores de referencia:
(Inf. 0.10) < 5 años
(Inf. 0.30) 5 años - 9 años
(0.20 - 0.60) Hombre 9 años - 15 años
(0.40 - 2.5) Hombre > 15 años
(0.10 - 0.60) Mujer 9 años - 15 años
(0.10 - 1.80) Mujer Fase folicular
(0.90 - 2.20) Mujer Fase luteínica

Descripción: PREGNENOLONA SUERO

Código: PREGNE

Técnica: EIA

Unidades: ng/mL

Plazo: 6 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL Suero. Congelar y enviar congelado.

Valores de referencia:
(0.1 - 3.4) Hombre
(0.1 - 3.8) Mujer

Descripción: Primidona en suero

Código: PRIMI

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectroscopía de masas

Unidades: mg/L

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL Suero. Refrigerado. Alternativa 1 mL Plasma EDTA Tripotásico.

Valores de referencia:
(4 - 12) Rango terapeútico
(Sup. 15) Tóxico

Descripción: PROCALCITONINA

Código: PROCALCITO

Técnica: Técnica inmunocromatográfica

Unidades: ng/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Congelado

Descripción:	PROCALCITONINA
Comentario adicional:	Alt. plasma EDTA, o heparina. NO PLASMA CITRATO, estbilidad 24 horas. Si no congelar , aguanta tres veces descongelacion
Valores de referencia:	(Inf. 0.5)

Descripción:	PROCOLAGENO I PROPEPTIDO AMINOTERMINAL (P1NP) SUERO
Código:	PROCOLAIAM
Técnica:	CLIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: Plasma (heparina, edta)
Valores de referencia:	(21 - 78) Hombre (15.1 - 58.6) Mujer Adultas (14.3 - 58.9) Postmenopausia con tratamiento hormonal (20.3 - 76.3) Postmenopausia sin tratamiento hormonal

Descripción:	PROCOLAGENO III PROPEPTIDO AMINOTRMINAL SUEROCONG
Código:	PROCOLAIII
Técnica:	Téc. RIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL de suero congelado.Centrifugar, decantar y congelar rapidamente.
Valores de referencia:	(0.34 - 0.61) < 10 años (0.64 - 1.70) 10 años - 15 años (0.37 - 1.80) 15 años - 20 años (0.33 - 0.79) > 20 años

Descripción:	PRODUCTOS DEGRADACION FIBRINOGENO
Código:	PDF
Técnica:	Inmunoensayo automatizado de aglutinación de látex
Unidades:	mg/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	Congelar el plasma citrato.
Valores de referencia:	(Inf. 5)

Descripción:	PROGESTERONA
Código:	PROGES
Técnica:	ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativo plasma con EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 0.5) Hombre > 14 años (Inf. 0.5) Mujer > 14 años Folicular (1.2 - 15.9) Mujer > 14 años Luteínica (Inf. 0.5) Mujer > 14 años Post menopausia

Descripción:	PROINSULINA SUERO
Código:	PROINSU
Técnica:	CLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 180)

Descripción:	PROLACTINA
Código:	PRL
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(3.46 - 19.40) Hombre (5.18 - 26.53) Mujer (1.8 - 20.3) Mujer Post-menopausia

Descripción:	PROPOXIFENO CRIBADO, ORINA
Código:	PROPOXIOR
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL Orina
Valores de referencia:	= NEGATIVO

Descripción:	PROSIGNA: expresión génica
Código:	PROSIGNA
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Bloque de tejido tumoral mama. Tª ambiente Tumor INFILTRANTE Entregar a Asesoría genética
Valores de referencia:	

Descripción:	PROSTAGLANDINA E2 ORINA
Código:	PGE22
Técnica:	RIA
Unidades:	pg/min
Plazo:	35 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10mL orina 24h. CONGELAR INMEDIATAMENTE. Se requiere la diuresis.
Valores de referencia:	(165 - 540)

Descripción: PROSTAGLANDINA E2 PLASMA
Código: PGE2
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 25 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 3 ml plasma EDTA. Separar y congelar inmediatamente. Como alternativa suero o plasma heparina
Valores de referencia: (Inf. 2297)

Descripción: PROTEINA 14-3-3 (ENCEFALOPATIAS) LCR
Código: PROT14.3.3
Técnica: Sds-Page/IMMUNOBLOT
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional: 1 mL LCR (NO HEMÁTICO), CONGELADO. INDISPENSABLE ADJUNTAR INFORME CLINICO. LA HEMÓLISIS INTERFIERE EN LA DETERMINACIÓN.
En caso de SOSPECHA DE PRIONES, es necesario envío de la muestra en ENVASE DE SEGURIDAD NIVEL 3 (CONSULTAR CON LABORATORIO).
Valores de referencia:

Descripción: PROTEINA C ACTIVIDAD PLASMA
Código: PROTEINA.C
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL plasma
Valores de referencia: (70 - 130)

Descripción: PROTEINA C ANTIGENICA PCAG
Código: PROTCAG
Técnica: EIA
Unidades: %
Plazo: 10 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL de plasma. Separar y congelar.
Valores de referencia: (70 - 140)

Descripción: PROTEINA C REACTIVA SUERO
Código: PCR
Técnica: Inmunoturbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1ml
NO HACER EN EDTA
Valores de referencia: (Inf. 0.5)

Descripción: PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA MUESTRA
Código: PROCATEOMU
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis

Descripción:	PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA MUESTRA
Unidades:	µg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	
Comentario adicional:	Muestra moco nasal/Lavado nasal
Valores de referencia:	(5.0 - 46.0) Moco nasal (3.0 - 31.0) Lavado nasal

Descripción:	PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA SUERO
Código:	PROCATIOEO
Técnica:	FEIA. Fluoroinmunoensayo.
Unidades:	mcg/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Alt. plasma EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 13)

Descripción:	PROTEINA PLASMATICA A ASOCIADA A LA GESTACION
Código:	PAPP.A
Técnica:	Electroquimioluminiscencia
Unidades:	mUI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. No emplear plasma
Valores de referencia:	= 0.28 mUI/mL-Embarazo-8 semanas = 0.47 mUI/mL-Embarazo-9 semanas = 0.90 mUI/mL-Embarazo-10 semanas = 1.58 mUI/mL-Embarazo-11 semanas = 2.51 mUI/mL-Embarazo-12 semanas = 3.68 mUI/mL-Embarazo-13 semanas

Descripción:	PROTEINA RELACIONADA CON LA PTH
Código:	PTHRP
Técnica:	Radioinmunoensayo
Unidades:	pmol/L
Plazo:	14 días
Tubo:	Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional:	Plasma EDTA. Extracción en tubo con APROTININA (trasylol). Centrifugar, congelar inmediatamente y enviar congelado. Tubo independiente del resto de pruebas.
Valores de referencia:	(Inf. 1.4)

Descripción:	PROTEINA S ACTIVIDAD PLASMA
Código:	PROTSACTI
Técnica:	Coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	6 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma citrato congelado. centrifugar la sangre a 2500g durante 15 minutos. Separar 3/4 partes superiores del plasma con pipeta (no decantar) y traspasarlo a otro tubo. Centrifugar una segunda vez el plasma traspasado al tubo, a 2500g durante 15 minutos. Separar el sobrenadan
Valores de referencia:	(77 - 143) Hombre (55 - 118) Mujer

Descripción:	PROTEINA S LIBRE ANTIGÉNICA PLASMA
Código:	PROTSLIBRE
Técnica:	Inmuno-turbidimétrico
Unidades:	%
Plazo:	3 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	5 mL de Plasma Citrato
Valores de referencia:	(70 - 148) Hombre (50 - 134) Mujer

Descripción:	PROTEINA S TOTAL ANTIGENICA PSAG
Código:	PROTEINA.S
Técnica:	EIA
Unidades:	%
Plazo:	10 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL Plasma Citrato Sódico. Separar plasma y congelar inmediatamente.
Valores de referencia:	(75 - 140) Hombre (60 - 140) Mujer

Descripción:	PROTEINA S-100B SUERO
Código:	PROTS100
Técnica:	ICMA. Inmunoquimioluminiscencia.
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero no hemolizado congelado
Valores de referencia:	(Inf. 0.15)

Descripción:	PROTEINA TAU (LCR)
Código:	TAUPROLCR
Técnica:	Técnica Enzimoinmunoanalisis
Unidades:	pg/mL
Plazo:	13 días
Tubo:	Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional:	1 mL LCR en tubo polipropileno ESPECIAL a su disposición. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(146 - 410) (Sup. 404) Enfermedad de Alzheimer

Descripción:	PROTEINAS EN ORINA
Código:	PROTEINAS
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	PROTEINAS ORINA
Código:	PT2

Descripción:	PROTEINAS ORINA
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 100)

Descripción:	PROTEINAS TOTALES LCR
Código:	LIQLCPT
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquido Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(15 - 45)

Descripción:	PROTEINAS TOTALES SUERO
Código:	PT
Técnica:	
Unidades:	g/dL
Plazo:	
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(6 - 8.3)

Descripción:	PROTEINASA-3 AC.
Código:	PR3
Técnica:	EIA
Unidades:	IU/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 2.0) Negativo (2.0 - 3.0) Indeterminado

Descripción:	Proteus, Sd. Sec Gen: AKT1
Código:	GEN_000642
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Protoporfiria ligada al X. Panel NGS
Código:	GEN_000644
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días

Descripción: Protoporfiria ligada al X. Panel NGS
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Protoporfiria ligada al X. Sec Gen: ALAS2
Código: GEN_000643
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Protoporfirina Libre Sangre
Código: PROTOLIBRE
Técnica: Espectrometría de absorción molecular
Unidades: µg/dL
Plazo: 8 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL EDTA/Heparina Li. Proteger de la Luz.Refrigerado.
Valores de referencia: (Inf. 60)

Descripción: PROTOPORFIRINA ZINC SANGRE
Código: PROTOPORZN
Técnica: Espectrometría de fluorescencia molecular.
Unidades: µg/g HB
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 ml sangre total EDTA o heparina.
Proteger de la luz
Valores de referencia: (Inf. 20) Exposición
= 1.17-3.11 mcg/g hemoglob.

Descripción: PROTROMBINA AC. IGG SUERO
Código: PROTROMIGG
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo
(Sup. 1.00) Positivo

Descripción: PROTROMBINA AC. IGM SUERO
Código: PROTROMIGM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: PROTROMBINA AC. IGM SUERO
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo
(Sup. 1.00) Positivo

Descripción: PROTROMBINA CAPILAR
Código: INRC
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia: = 2-3

Código: PFLACT
Descripción: PRUEBA FUNCIONAL AC.LACTICO TRAS EJERCICIO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LACTICO		ACIDO LACTICO (LACTATO) PLASMA	mg/dL	(5.7 - 22)
Prueba	TPOEJERC		TIEMPO DE EJERCICIO	minutos	
Prueba	LACTICO1		ACIDO LACTICO TRAS 1 MINUTO DE EJERCICIO	mg/dL	
Prueba	LACTICO3		ACIDO LACTICO TRAS 3 MINUTOS DE EJERCICIO	mg/dL	
Prueba	LACTICO5		ACIDO LACTICO TRAS 5 MINUTOS DE EJERCICIO	mg/dL	

Descripción: Prueba No Treponémica (RPR)
Código: VDRLMICRO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PSA Complex en suero
Código: PSACOMPLEX
Técnica: Técnia ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Valores de referencia: (Inf. 3.6)

Descripción: PSA LIBRE SUERO
Código: PSALIBRE
Técnica: ICMA

Descripción: PSA LIBRE SUERO
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PSA SUERO (ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO)
Código: PSA
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 4) Hombre
(Inf. 0.05) Mujer

Descripción: PSA-LIBRE/PSA-TOTAL RATIO
Código: PSARATIO
Técnica: ICMA + Cálculo
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Pseudoacondroplasia. Sec Gen: COMP
Código: GEN_000645
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pseudohipoaldosteronismo. Panel NGS
Código: GEN_000646
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pseudohipoparatiroidismo primario: gen GNAS (NGS)
Código: GNAS_MUTS
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Pseudohipoparatiroidismo primario: gen GNAS (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Pseudoxantoma elástico. Panel NGS
Código: GEN_000647
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pseudoxantoma elástico: gen ABCC6 (NGS)
Código: ABCC6_MUTS
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Pterigion múltiple, Sd. Sec Gen: CHRNG
Código: GEN_000649
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pterigion múltiple. Panel NGS
Código: GEN_000650
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Púrpura trombocitopénica trombótica. Sec Gen: ADAMTS13
Código: GEN_000651
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: QT corto, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000652
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: QUANTIFERO
Descripción: QUANTIFERON TB GOLD PLUS
Técnica: Quimioluminiscencia
Comentario adicional:

QUANTIFERON TB-GOLD PLUS kit nuevo
4 Tubos para la recogida de sangre
(Nil, TB1 Antigen, TB2 Antigen, Mitogen).
Se llena cada tubo con sangre hasta la zona central de la MARCA NEGRA (1 mL).
Sacudir los tubos con energía durante 5 seg (10 veces).
Incubar 37°C durante 16-24 horas en posición vertical.
Centrifugar los tubos (2000-3000 g durante 15 min), asegurando la separación del plasma.
Enviar los tubos para su análisis en su envase original.

- SI ES ENVIADO DESDE MADRID: PUEDEN ENVIAR LOS TUBOS SIGUIENDO LA PREPARACIÓN REALIZANDO LOS PASOS HASTA JUSTO ANTES DE LA INCUBACIÓN. NECESARIO ENVIAR ANTES DE 6 H TRAS LA EXTRACCIÓN.ENVIAR DE LUNES A JUEVES.

- SI ES ENVIADO DESDE PROVINCIAS: ES NECESARIO QUE TENGAN ESTUFA Y HAGAN LA PREPARACIÓN HASTA EL FINAL.

la marca negra en la etiqueta de los tubos indica el rango válido de llenado de los mismos (0.8-1.2 ml).

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NULOQFT		Control Negativo del paciente	UI/mL	
Prueba	TB1QFT		TB1	UI/mL	
Prueba	TB2QFT		TB2	UI/mL	
Prueba	INTERPQFT		INTERPRETACION QFT		
Prueba	MITQFT		Control positivo MITOGEN QUANTIFERON-TB	UI/mL	
Prueba	NULO25#		Control negativo QUANTIFERON-TB (25%)		
Prueba	TB1QFT#		TB1-NULO	UI/mL	
Prueba	TB2QFT#		TB2-NULO	UI/mL	
Prueba	MITQFT#		MITQFT-NULOQFT	UI/mL	

Descripción: QUERATINA AC. IgG SUERO
Código: QUERAACG
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =<1:10 Negativo
=>1:10 Positivo

Descripción: Queratocono tipo 1. Sec Gen: VSX1
Código: GEN_000653
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Queratodermia palmoplantar epidermolítica. Sec Gen: KRT9
Código: GEN_000654
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Queratosis palmoplantar estriada. Panel NGS
Código: GEN_000655
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Querubinismo. Sec Gen: SH3BP2
Código: GEN_000656
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Quetiapina
Código: QUETIAPINA
Técnica: HPLC-Espectrometría de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (100 - 600)

Descripción: QUIMOTRIPSINA HECES
Código: QUIMIOTRIP
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/g
Plazo: 12 días

Descripción: QUIMOTRIPSINA HECES
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 1 g heces (REFRIGERADAS)
Valores de referencia: (3.00 - 6.00) Indeterminado
(Sup. 6.0) Normal

Descripción: QUINASA ESPECIFICA MUSCULAR (MuSK) AC. SUERO
Código: AC.MUSK
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.40)

Descripción: Quitotriosidasa (E. Gaucher), sangre seca
Código: QUITOTRIO
Técnica: Fluorimetría
Unidades: µmol/L x Hora
Plazo: 17 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Recoger gotas de sangre SIN ANTICOAGULANTE en 2 a 4 circulos de papel filtro (Solicitar a almacen). Dejar secar al aire libre durante 1 hora. Guardar en nevera en bolsa de plástico cerrada hasta el envio.
Enviar a temperatura ambiente.
INDISPENSABLE informe clínico y antecedentes familiares.
Valores de referencia: (14.0 - 186.0)

Descripción: QUITOTRIOSIDASA SUERO
Código: QUITOTRI
Técnica: Cinética
Unidades: nmol/h/mL
Plazo: 47 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 3 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Indicar fecha nacimiento e historia clínica.
Valores de referencia: (19 - 208)

Descripción: RABIA VIRUS AC. CONTROL VACUNACION SUERO
Código: RABIAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: kUI/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero refrigerado.
Valores de referencia: (Inf. 0.50)
(Sup. 0.50) Protección efectiva

Descripción: Raquitismo hereditario. Panel NGS
Código: GEN_000657
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Raquitismo hereditario. Panel NGS
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Raquitismo hipofosfatémico ligado cr. X. Sec Gen: PHEX
Código: GEN_000447
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Raquitismo hipofosfatémico. Panel NGS
Código: GEN_000658
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Raquitismo y alopecia, Sd. Sec Gen: VDR
Código: GEN_000659
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Rasopatías. Panel NGS
Código: GEN_000660
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: RAST_1
Descripción: RAST (IGE ESPECÍFICA) A MEDICAMENTOS
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	C234		RAST A MEDICAMENTOS PRILOCAINA	kU/L	

Componentes					
Prueba	Q01		RAST A MEDICAMENTOS ACIDO ACETILSALICILICO (ASPIRINA) SUERO	KU/L	
Prueba	Q02		RAST A MEDICAMENTOS CEFALOSPORINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q04		RAST A MEDICAMENTOS ARTICAINA (ULTRACAIN)	KU/L	
Prueba	Q05		RAST A MEDICAMENTOS CEFALEXINA SUERO (C309)	kU/L	
Prueba	Q06		RAST A MEDICAMENTOS DIPIRONA(METAMIZOL) SUERO	kU/L	
Prueba	Q07		RAST A MEDICAMENTOS ERITROMICINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q08		RAST A MEDICAMENTOS GENTAMICINA	kU/L	
Prueba	Q09		RAST A MEDICAMENTOS INDOMETACINA(C282)	kU/L	
Prueba	Q10		RAST A MEDICAMENTOS LIDOCAINA (XILOCAINA)	kU/L	
Prueba	Q11		RAST A MEDICAMENTOS MEPIVACAINA (SCANDICAIN)	kU/L	
Prueba	Q12		RAST A MEDICAMENTOS PARACETAMOL SUERO	kU/L	
Prueba	Q13		RAST A MEDICAMENTOS PROCAINA (NOVOCAINA)	kU/L	
Prueba	Q14		RAST A MEDICAMENTOS SULFAMETOXAZOL	kU/L	
Prueba	Q15		RAST A MEDICAMENTOS TETRACICLINA	kU/L	
Prueba	Q16		RAST A MEDICAMENTOS TRIMETOPRIM (C242)	kU/L	
Prueba	Q17		RAST A MEDICAMENTOS CLOXACILINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q19		RAST A MEDICAMENTOS ATROPINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q20		RAST A MEDICAMENTOS BUPIVACAINA (SVEDOCAIN)	kU/L	
Prueba	Q21		RAST A MEDICAMENTOS ACIDO CLAVULANICO SUERO	kU/L	
Prueba	Q22		RAST A MEDICAMENTOS CEFALOTINA	kU/L	
Prueba	Q23		RAST A MEDICAMENTOS NAPROXENO	kU/L	
Prueba	Q24		RAST A MEDICAMENTOS DICLOFENAC (VOLTAREN)	kU/L	
Prueba	Q25		RAST A MEDICAMENTOS CIPROFLOXACINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q26		RAST A MEDICAMENTOS ESTREPTOMICINA (C295)	kU/L	
Prueba	Q27		RAST A MEDICAMENTOS FENILBUTAZONA (BUTAZOLIDINA)	kU/L	
Prueba	Q28		RAST A MEDICAMENTOS NEOMICINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q29		RAST A MEDICAMENTOS FLUORESCEINA SODICA	kU/L	
Prueba	Q30		RAST A MEDICAMENTOS FOSFOMICINA	kU/L	
Prueba	Q31		RAST A MEDICAMENTOS LINCOMICINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q33		RAST A MEDICAMENTOS PIROXICAM	kU/L	
Prueba	Q34		RAST A MEDICAMENTOS RIFAMPICINA	kU/L	
Prueba	Q35		RAST A MEDICAMENTOS TETRACAINA	kU/L	
Prueba	Q37		RAST A MEDICAMENTOS TOBRAMICINA	kU/L	
Prueba	Q38		RAST A MEDICAMENTOS VITAMINA B1 SUERO	kU/L	
Prueba	Q39		RAST A MEDICAMENTOS VITAMINA B6 SUERO	kU/L	
Prueba	Q40		RAST A MEDICAMENTOS VITAMINA B12 SUERO	kU/L	
Prueba	Q41		RAST A MEDICAMENTOS PROPIFENAZONA (CIBALGINA)	kU/L	
Prueba	Q42		RAST A MEDICAMENTOS BROMHEXINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q43		RAST A MEDICAMENTOS DOXICICLINA (C216)	kU/L	
Prueba	Q44		RAST A MEDICAMENTOS CODEÍNA SUERO (C300)	kU/L	
Prueba	Q46		RAST A MEDICAMENTOS ESPIRAMICINA	kU/L	
Prueba	Q47		RAST A MEDICAMENTOS METRONIDAZOL	kU/L	

Componentes					
Prueba	Q49		RAST A MEDICAMENTOS LACTOSA SUERO	kU/L	
Prueba	Q50		RAST A MEDICAMENTOS TARTRAZINA	kU/L	
Prueba	Q53		RAST A MEDICAMENTOS DIAZEPAM (VALIUM)	kU/L	
Prueba	Q56		RAST A MEDICAMENTOS BENZOATO SODICO SUERO	kU/L	
Prueba	Q57		RAST A MEDICAMENTOS IBUPROFENO	kU/L	
Prueba	Q58		RAST A MEDICAMENTOS NORFLOXACINA	kU/L	
Prueba	Q59		RAST A MEDICAMENTOS CLINDAMICINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q60		RAST A MEDICAMENTOS CLORANFENICOL SUERO	kU/L	
Prueba	Q61		RAST A MEDICAMENTOS KETOPROFENO SUERO	kU/L	
Prueba	Q62		RAST A MEDICAMENTOS ACIDO MEFENÁMICO (COSLAN) SUERO	kU/L	
Prueba	Q63		RAST A MEDICAMENTOS MINOCICLINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q64		RAST A MEDICAMENTOS CLARITROMICINA	kU/L	
	Q65				
Prueba	Q66		RAST A MEDICAMENTOS EPINEFRINA	kU/L	
Prueba	Q67		RAST A MEDICAMENTOS ACETILCISTEINA	kU/L	
	Q69				
Prueba	Q71		RAST A MEDICAMENTOS AC ASCORBICO	kU/L	
Prueba	Q72		RAST A AMARILLO NARANJA	kU/L	
Prueba	Q74		RAST A MEDICAMENTOS DEXAMETASONA	kU/L	
Prueba	Q78		RAST A MEDICAMENTOS TEOFILINA	kU/L	
Prueba	Q80		RAST A CLORURO DE COBRE	kU/L	
	Q95				
Prueba	Q83		RAST A MEDICAMENTOS BENZOCAINA	kU/L	
Prueba	Q85		RAST A MEDICAMENTOS AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA	kU/L	
Prueba	Q86		RAST A MEDICAMENTOS AMIDOTRIZOATO DE SODIO	kU/L	
Prueba	Q88		RAST A MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA (C338)	kU/L	
Prueba	Q90		RAST A MEDICAMENTOS PREDNISOLONA	kU/L	
Prueba	Q92		RAST A MEDICAMENTOS VANCOMICINA	kU/L	
	Q93				
Prueba	Q94		RAST A MEDICAMENTOS AZITROMICINA (X04)	kU/L	
Prueba	X08		RAST A SULFITO SODICO	kU/L	
Prueba	X11		RAST A CLORURO DE COBALTO	kU/L	
Prueba	X09		RAST A CLORURO DE ALUMINIO	kU/L	
Prueba	X18		RAST A MEDICAMENTOS PREDNISONA	kU/L	
Prueba	X51		RAST A MEDICAMENTOS TETRAZEPAM	kU/L	
Prueba	X41		RAST A ASPARTAMO	kU/L	
Prueba	C260		RAST A MEDICAMENTOS MORFINA	KU/L	
Prueba	X53		RAST A MEDICAMENTOS LEVOFLOXACINO SUERO	kU/L	
Prueba	X56		RAST A MEDICAMENTOS NITROFURANTOÍNA	kU/L	
Prueba	X22		RAST A MEDICAMENTOS ALOPURINOL	kU/L	
	Q45				
Prueba	X24		RAST A MEDICAMENTOS CAPTOPRIL	kU/L	

Componentes					
Prueba	X47		RAST A ACIDO MOLIBDICO	kU/L	

Código: RAST
Descripción: RAST (IGE ESPECÍFICA)
Técnica: CAP-SYSTEM
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
	C03				
Prueba	C05		RAST A MEDICAMENTOS AMPICILINA SUERO	kU/L	
Prueba	C06		RAST A MEDICAMENTOS AMOXICILINA	kU/L	
Prueba	C08		RAST A MEDICAMENTOS CLORHEXIDINA	kU/L	
Prueba	C308		RAST A MEDICAMENTOS CEFUROXIMA	kU/L	
Prueba	C609		RAST A CROMO	kU/L	
Prueba	C71		RAST A MEDICAMENTOS INSULINA BOVINA	kU/L	
Prueba	C73		RAST A MEDICAMENTOS INSULINA HUMANA (DNA-RECOMBINANTE) SUERO	kU/L	
Prueba	C74		RAST A MEDICAMENTOS GELATINA	kU/L	
Prueba	E102		RAST RECOMBINANTE rCAn f 2 Perro	kU/L	
Prueba	E226		RAST RECOMBINANTE rCan f 5 Esterasa arginina perro	kU/L	
Prueba	D01		RAST A ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS SUERO	kU/L	
Prueba	D02		RAST A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE SUERO	kU/L	
Prueba	D03		RAST A ACAROS DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS SUERO	kU/L	
Prueba	D202		RAST RECOMBINANTE nDer p 1 Dermatophagoides Pteronyssimus	kU/L	
Prueba	D203		RAST RECOMBINANTE rDer p 2 Dermatophagoides Pteronyssimus	kU/L	
Prueba	D70		RAST A ACAROS ACARUS SIRO SUERO	kU/L	
Prueba	D71		RAST A ACAROS LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR SUERO	kU/L	
Prueba	D72		RAST A ACAROS TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE SUERO	kU/L	
Prueba	D73		RAST A ACAROS GLYCYPHAGUS DOMESTICUS SUERO	kU/L	
Prueba	D74		RAST A ACAROS EUROGLYPHUS MAYNEI SUERO	kU/L	
Prueba	E01		RAST A ANIMALES CASPA DE GATO	kU/L	
	E02				
Prueba	E03		RAST A ANIMALES CASPA DE CABALLO	kU/L	
Prueba	E04		RAST A ANIMALES CASPA DE VACA	kU/L	
Prueba	E05		RAST A ANIMALES CASPA DE PERRO	kU/L	
Prueba	E06		RAST A ANIMALES EPITELIO DE COBAYA	kU/L	
Prueba	E07		RAST A ANIMALES EXCREMENTO DE PALOMA	kU/L	
Prueba	E101		RAST RECOMBINANTE rCan f 1Canis familiaris Perro	kU/L	

Componentes					
Prueba	E197		RAST A ANIMALES EXCREMENTOS DE CACATUA (Nymphicus)	kU/L	
	E196				
Prueba	E200		RAST A ANIMALES EXCREMENTO DE CANARIO	kU/L	
	E205				
Prueba	E70		RAST A ANIMALES PLUMAS DE OCA SUERO	kU/L	
Prueba	E71		RAST A ANIMALES EPITELIO DE RATON SUERO	kU/L	
Prueba	E72		RAST A ANIMALES PROTEINAS DE ORINA DE RATON	kU/L	
Prueba	E73		RAST A ANIMALES EPITELIO DE RATA SUERO	kU/L	
Prueba	E74		RAST A ANIMALES PROTEINAS DE ORINA DE RATA SUERO	kU/L	
Prueba	E75		RAST A ANIMALES PROTEINAS SERICAS DE RATA	kU/L	
Prueba	E76		RAST A ANIMALES PROTEINAS SERICAS DE RATON SUERO	kU/L	
Prueba	E77		RAST A ANIMALES EXCREMENTOS DE PERIQUITO SUERO	kU/L	
Prueba	E78		RAST A ANIMALES PLUMAS DE PERIQUITO	kU/L	
Prueba	E80		RAST A ANIMALES EPITELIO DE CABRA SUERO	kU/L	
Prueba	E81		RAST A ANIMALES EPITELIO DE OVEJA (LANA) SUERO	kU/L	
Prueba	E82		RAST A ANIMALES EPITELIO DE CONEJO	kU/L	
Prueba	E83		RAST A ANIMALES EPITELIO DE CERDO SUERO	kU/L	
Prueba	E84		RAST A ANIMALES EPITELIO DE HAMSTER	kU/L	
Prueba	E85		RAST A ANIMALES PLUMAS DE POLLO SUERO	kU/L	
Prueba	E86		RAST A ANIMALES PLUMAS DE PATO SUERO	kU/L	
Prueba	E87		RAST A ANIMALES RATA	kU/L	
Prueba	E88		RAST A ANIMALES RATON SUERO	kU/L	
Prueba	E89		RAST A ANIMALES PLUMAS DE PAVO SUERO	kU/L	
Prueba	E94		RAST RECOMBINANTE rFel d1 Gato	kU/L	
Prueba	E227		RAST RECOMBINANTE Equ c 1 Caballo	kU/L	
Prueba	EX1		RAST A CASPA ANIMALES MEZCLA (e1, e2, e4, e5)	kU/L	
Prueba	EX2		RAST A ANIMALES EPITELIOS MEZCLA (e1, e5, e6, e87, e88)	kU/L	
	EX73				
Prueba	F01		RAST A ALIMENTOS CLARA DE HUEVO SUERO	kU/L	
Prueba	F02		RAST A ALIMENTOS LECHE DE VACA SUERO	kU/L	
Prueba	F03		RAST A ALIMENTOS BACALAO (PESCADO) SUERO	kU/L	
Prueba	F04		RAST A ALIMENTOS TRIGO	kU/L	
Prueba	F05		RAST A ALIMENTOS CENTENO SUERO	kU/L	
Prueba	F06		RAST A ALIMENTOS CEBADA SUERO	kU/L	
Prueba	F07		RAST A ALIMENTOS AVENA SUERO	kU/L	
Prueba	F08		RAST A ALIMENTOS MAIZ SUERO	kU/L	
Prueba	F09		RAST A ALIMENTOS ARROZ SUERO	kU/L	
Prueba	F10		RAST A ALIMENTOS SEMILLA DE SESAMO SUERO	kU/L	
Prueba	F11		RAST A ALIMENTOS TRIGO SARRACENO (ALFORFON)	kU/L	
Prueba	F12		RAST A ALIMENTOS GUISANTES SUERO	kU/L	
Prueba	F13		RAST A ALIMENTOS CACAHUETE SUERO	kU/L	
Prueba	F14		RAST A ALIMENTOS SOJA SUERO	kU/L	

Componentes					
Prueba	F15		RAST A ALIMENTOS JUDIA BLANCA SUERO	kU/L	
Prueba	F17		RAST A ALIMENTOS AVELLANA SUERO	kU/L	
Prueba	F18		RAST A ALIMENTOS NUEZ DE BRASIL SUERO	kU/L	
Prueba	F20		RAST A ALIMENTOS ALMENDRA SUERO	kU/L	
Prueba	F23		RAST A ALIMENTOS CANGREJO DE MAR SUERO	kU/L	
Prueba	F54		RAST A ALIMENTOS BONIATO	kU/L	
Prueba	F24		RAST A ALIMENTOS CAMARON (LANGOSTINO) SUERO	kU/L	
Prueba	F25		RAST A ALIMENTOS TOMATE SUERO	kU/L	
Prueba	F26		RAST A ALIMENTOS CARNE DE CERDO SUERO	kU/L	
Prueba	F267		RAST A ALIMENTOS CARDAMOMO	kU/L	
Prueba	F27		RAST A ALIMENTOS CARNE DE VACA (TERNERA) SUERO	kU/L	
Prueba	F272		RAST A ALIMENTOS ESTRAGON	kU/L	
Prueba	F277		RAST A ALIMENTOS ENELDO	kU/L	
Prueba	F288		RAST A ALIMENTOS ARANDANO AZUL SUERO	kU/L	
Prueba	F301		RAST A ALIMENTOS CAQUI SUERO	kU/L	
Prueba	F31		RAST A ALIMENTOS ZANAHORIA	kU/L	
Prueba	F316		RAST A ALIMENTOS SEMILLA DE COLZA SUERO	kU/L	
	F321				
Prueba	F322		RAST A ALIMENTOS GROSELLA	kU/L	
Prueba	F33		RAST A ALIMENTOS NARANJA SUERO	kU/L	
Prueba	F333		RAST A ALIMENTOS LINAZA SEMILLA DE LINO	kU/L	
Prueba	F35		RAST A ALIMENTOS PATATA SUERO	kU/L	
Prueba	F352		RAST RECOMBINANTE rAra h 8 PR-10 Cacahuete	kU/L	
Prueba	F36		RAST A ALIMENTOS COCO SUERO	kU/L	
Prueba	F353		RAST RECOMBINANTE rGly m 4 PR-10, Soja	kU/L	
Prueba	F37		RAST A ALIMENTOS MEJILLON SUERO	kU/L	
Prueba	F40		RAST A ALIMENTOS ATUN SUERO	kU/L	
Prueba	F41		RAST A ALIMENTOS SALMON SUERO	kU/L	
Prueba	F416		RAST RECOMBINANTE rTri a 19 Omega-5 Gliadina	kU/L	
Prueba	F420		RAST RECOMBINANTE rPru p3 (LTP) Melocoton	kU/L	
Prueba	F421		RAST RECOMBINANTE rPru p 4 profilina Melocoton	kU/L	
Prueba	F422		RAST RECOMBINANTE rAra h 1 Cacahuete	kU/L	
Prueba	F423		RAST RECOMBINANTE rAra h 2 Cacahuete	kU/L	
Prueba	F424		RAST RECOMBINANTE rAra h 3 Cacahuete	kU/L	
Prueba	F427		RAST RECOMBINANTE rAra h 9 (LTP) Cacahuete	kU/L	
Prueba	F430		RAST RECOMBINANTE rAct d8 PR-10 Kiwi	kU/L	
Prueba	F44		RAST A ALIMENTOS FRESA SUERO	kU/L	
Prueba	F45		RAST A ALIMENTOS SACCHAROMYCES CEREVISIAE (LEVADURA PAN) SUE	kU/L	
Prueba	F47		RAST A ALIMENTOS AJO SUERO	kU/L	
Prueba	F48		RAST A ALIMENTOS CEBOLLA SUERO	kU/L	
Prueba	F49		RAST A ALIMENTOS MANZANA SUERO	kU/L	
Prueba	F57		RAST A ALIMENTOS MIJO JAPONES	kU/L	

Componentes					
Prueba	F55		RAST A ALIMENTOS MIJO COMUN SUERO	kU/L	
Prueba	F58		RAST A ALIMENTOS CALAMAR DEL PACIFICO	kU/L	
Prueba	F59		RAST A ALIMENTOS PULPO SUERO	kU/L	
Prueba	F60		RAST A ALIMENTOS JUREL SUERO	kU/L	
Prueba	F75		RAST A ALIMENTOS YEMA DE HUEVO	kU/L	
Prueba	F76		RAST A ALIMENTOS ALFA-LACTOALBUMINA (LECHE DE VACA) SUERO	kU/L	
Prueba	F77		RAST A ALIMENTOS BETA-LACTOGLOBULINA (LECHE DE VACA) SUERO	kU/L	
Prueba	F78		RAST A ALIMENTOS CASEINA (LECHE DE VACA) SUERO	kU/L	
Prueba	F79		RAST A ALIMENTOS GLUTEN (TRIGO) SUERO	kU/L	
Prueba	F80		RAST A ALIMENTOS BOGAVANTE SUERO	kU/L	
Prueba	F81		RAST A ALIMENTOS QUESO (TIPO CHEDAR,MANCHEGO) SUERO	kU/L	
Prueba	F82		RAST A ALIMENTOS QUESO DE POSTRE (CAMB.BRIE.GORG.ROQF) SUERO	kU/L	
Prueba	F83		RAST A ALIMENTOS CARNE DE POLLO SUERO	kU/L	
Prueba	F84		RAST A ALIMENTOS KIWI SUERO	kU/L	
Prueba	F85		RAST A ALIMENTOS APIO SUERO	kU/L	
Prueba	F86		RAST A ALIMENTOS PEREJIL SUERO	kU/L	
Prueba	F87		RAST A ALIMENTOS MELON SUERO	kU/L	
Prueba	F88		RAST A ALIMENTOS CARNE DE CORDERO SUERO	kU/L	
Prueba	F89		RAST A ALIMENTOS MOSTAZA SUERO	kU/L	
Prueba	F90		RAST A ALIMENTOS MALTA SUERO	kU/L	
Prueba	F91		RAST A ALIMENTOS MANGO SUERO	kU/L	
Prueba	F92		RAST A ALIMENTOS PLATANO SUERO	kU/L	
Prueba	F93		RAST A ALIMENTOS CACAO SUERO	kU/L	
Prueba	F94		RAST A ALIMENTOS PERA SUERO	kU/L	
Prueba	F95		RAST A ALIMENTOS MELOCOTON SUERO	kU/L	
Prueba	F98		RAST A ALIMENTOS GLIADINA	kU/L	
Prueba	F426		RAST RECOMBINANTE rGad c 1; Parvalbumina Bacalao	kU/L	
Prueba	F433		RAST RECOMBINANTE rTri a 14 LTP Trigo	kU/L	
Prueba	F96		RAST A ALIMENTOS AGUACATE SUERO	kU/L	
Prueba	FX1		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f13, f17, f18, f20, f36)	kU/L	
Prueba	FX14		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f25, f214, f216, f218)	kU/L	
Prueba	FX15		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f33, f49, f92, f95)	kU/L	
Prueba	FX16		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f44, f94, f208, f210)	kU/L	
Prueba	FX2		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f40, f3, f24, f37, f41)	kU/L	
Prueba	FX21		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f210, f92, f84, f87, f95)	kU/L	
Prueba	FX3		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f4, f7, f8, f10, f11)	kU/L	
Prueba	FX5E		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f1, f2, f3, f4, f13, f14)	kU/L	
Prueba	FX70		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f272, f273, f274, f275)	kU/L	
Prueba	FX71		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f267, f268, f282)	kU/L	
Prueba	FX73		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (F83, F26, F27)	kU/L	

Componentes					
Prueba	FX72		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f271, f270, f269,f219)	kU/L	
Prueba	G01		RAST A POLENES DE GRAMINEAS ANTHOXANTHUM ODORATUM (GRAMA DE	kU/L	
Prueba	G02		RAST A POLENES DE GRAMINEAS CYNODON DACTYLON (GRAMA MAYOR)	kU/L	
Prueba	G03		RAST A POLENES DE GRAMINEAS DACTYLIS GLOMERATA (GRAMA)	kU/L	
Prueba	G04		RAST A POLENES DE GRAMINEAS FESTUCA ELATIOR (CAÑUELA) SUERO	kU/L	
Prueba	G05		RAST A POLENES DE GRAMINEAS LOLIUM PERENNE (BALLICO)	kU/L	
Prueba	G06		RAST A POLENES DE GRAMINEAS PHLEUM PRATENSE (HIERBA TIMOTEA)	kU/L	
Prueba	G07		RAST A POLENES DE GRAMINEAS PHRAGMITES COMMUNIS (CARRIZO)	kU/L	
Prueba	G08		RAST A POLENES DE GRAMINEAS POA PRATENSIS (ESPIGUILLA)	kU/L	
Prueba	G09		RAST A POLENES DE GRAMINEAS AGROSTIS STOLONIFERA (RASTRERAS)	kU/L	
Prueba	G10		RAST A POLENES DE GRAMINEAS SORGHUM HALEPENSE (SORGO, MILLAC	kU/L	
Prueba	G11		RAST A POLENES DE GRAMINEAS BROMUS INERMIS (TRESPE)	kU/L	
Prueba	G12		RAST A POLENES DE GRAMINEAS SECALE CEREALE (CENTENO)	kU/L	
Prueba	G13		RAST A POLENES DE GRAMINEAS HOLCUS LANATUS (HENO BLANCO)	kU/L	
Prueba	G14		RAST A POLENES DE GRAMINEAS AVENA SATIVA (POLEN DE AVENA)	kU/L	
Prueba	G15		RAST A POLENES DE GRAMINEAS TRITICUM SATIVUM (TRIGO)	kU/L	
Prueba	G16		RAST A POLENES DE GRAMINEAS ALOPECURUS PRATENSIS (COLA DE ZO	kU/L	
Prueba	G17		RAST A POLENES DE GRAMINEAS PASPALUM NOTATUM (HIERBA BAHIA)	kU/L	
Prueba	G70		RAST A POLENES DE GRAMINEAS ELYMUS TRITICOIDES (CENTENO SALV	kU/L	
Prueba	G71		RAST A PHALARIS ARUNDINACEA (ALPISTE)	kU/L	
Prueba	GX1		RAST A POLENES GRAMINEAS MEZCLA (g3, g4, g5, g6, g8)	kU/L	
Prueba	GX2		RAST A POLENES GRAMINEAS MEZCLA (g2, g5, g6, g8, g10, g17)	kU/L	
Prueba	GX4		RAST A POLENES GRAMINEAS MEZCLA (g1, g5, g7, g12, g13)	kU/L	
Prueba	H01		RAST A POLVOS DE CASA (GREER)	kU/L	
Prueba	H02		RAST A POLVOS DE CASA (HOLLISTER-STIER)	kU/L	
Prueba	HX2		RAST A POLVO DE CASA MEZCLA (h2, d1, d2, i6)	kU/L	
Prueba	I01		RAST A INSECTOS APIS MELLIFERA (VENENO DE ABEJA) SUERO	kU/L	
Prueba	I02		RAST A INSECTOS DOLICHOVESPULA MACULATA SUERO	kU/L	

Componentes					
Prueba	I03		RAST A INSECTOS VESPULA SPP. (VENENO DE AVISPA) SUERO	kU/L	
Prueba	I04		RAST A INSECTOS POLISTES SPP. (VENENO DE AVISPA) SUERO	kU/L	
Prueba	I05		RAST A INSECTOS DOLICHOVESPULA ARENARIA (AVISPON) SUERO	kU/L	
Prueba	I06		RAST A INSECTOS BLATELLA GERMANICA (CUCARACHA) SUERO	kU/L	
Prueba	I08		RAST A INSECTOS GUSANO/MARIPOSA DE SEDA	kU/L	
	I202				
Prueba	I208		RAST RECOMBINANTE rApi m 1 Fosfolipasa A2 Abeja	kU/L	
Prueba	I209		RAST RECOMBINANTE rVes v 5 Vespula Vulgaris (avispa)	kU/L	
Prueba	I214		RAST RECOMBINANTE rApi m 2 Abeja	KU/L	
Prueba	I217		RAST RECOMBINANTE rApi m 10 Abeja	kU/L	
Prueba	I210		RAST RECOMBINANTE rPol d 5 Polistes Dominulus (avispa papel)	kU/L	
Prueba	I70		RAST A INSECTOS SOLENOPSIS INVICTA (HORMIGA ROJA) SUERO	kU/L	
Prueba	I71		RAST A INSECTOS AEDES COMMUNIS (MOSQUITO) SUERO	kU/L	
	I72				
Prueba	I73		RAST A INSECTOS CHIRONOMUS THUMMI SUERO	kU/L	
Prueba	I75		RAST A INSECTOS AVISPÓN (VESPA CABRO)SUERO	kU/L	
Prueba	I76		RAST A INSECTOS TROGODERMA ANGUSTUM (ESCARABAJO) SUERO	kU/L	
Prueba	I77		RAST INSECTOS POLISTES DOMINULUS/ VENENO AVISPA	kU/L	
Prueba	IGEPENIG		RAST A MEDICAMENTOS PENICILINA G (PENICILOIL G)	kU/L	
Prueba	IGEPENIV		RAST A MEDICAMENTOS PENICILINA V (PENICILOIL V)	kU/L	
Prueba	K209		RAST A ANHIDRIDO HEXAHIDROFTALICO	kU/L	
Prueba	K210		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ANHIDRIDO MALEICO	kU/L	
	K211				
Prueba	K224		RAST RECOMBINANTE rHev b 11 Latex (Hevea brasiliensis)	kU/L	
Prueba	K70		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES GRANOS DE CAFE VERDE SUERO	kU/L	
	K71				
Prueba	K72		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ISPAGHULA SUERO	kU/L	
Prueba	K73		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES SEDA NATURAL (ANTHERAEA SPP)	kU/L	
Prueba	K74		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES SEDA CULTIVADA (BOMBYX MORI)	kU/L	
Prueba	K75		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO TDI SUERO	kU/L	
Prueba	K76		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO MDI SUERO	kU/L	
Prueba	K77		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO HDI SUERO	kU/L	

Componentes					
Prueba	K78		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES OXIDO DE ETILENO SUERO	kUA/L	
Prueba	K79		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ANHIDRIDO FTALICO SUERO	kU/L	
Prueba	K80		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES FORMALDEHIDO SUERO	kU/L	
Prueba	K81		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES FICUS SPP SUERO	kU/L	
Prueba	K82		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES LATEX SUERO	kU/L	
Prueba	K83		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES SEMILLA DE ALGODON SUERO	kU/L	
Prueba	K84		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES SEMILLA DE GIRASOL SUERO	kU/L	
Prueba	K85		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES CLORAMINA T SUERO	kU/L	
Prueba	K86		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES TMA (ANHIDRIDO TRIMETILICO) S	kU/L	
Prueba	K87		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES ALFA-AMILASA (ADITIVO HARINAS	kU/L	
Prueba	M01		RAST A MOHOS Y HONGOS PENICILLIUM NOTATUM SUERO	kU/L	
Prueba	M02		RAST A MOHOS Y HONGOS CLADOSPORIUM HERBARUM (HORMODENDRUM) S	kU/L	
Prueba	M03		RAST A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS	kU/L	
Prueba	M04		RAST A MOHOS Y HONGOS MUCOR RACEMOSUS SUERO	kU/L	
Prueba	M05		RAST A MOHOS Y HONGOS CANDIDA ALBICANS SUERO	kU/L	
Prueba	M06		RAST A MOHOS Y HONGOS ALTERNARIA ALTERNATA (A. TENUIS) SUERO	kU/L	
Prueba	M07		RAST A MOHOS Y HONGOS BOTRYTIS CINEREA SUERO	kU/L	
Prueba	M08		RAST A MOHOS Y HONGOS HELMINTHOSPORIUM HALODES SUERO	kU/L	
Prueba	M09		RAST A MOHOS Y HONGOS FUSARIUM MONILIFORME SUERO	kU/L	
Prueba	M10		RAST A MOHOS Y HONGOS STEMPHYLIUM BOTRYOSUM SUERO	kU/L	
Prueba	M11		RAST A MOHOS Y HONGOS RHIZOPUS NIGRICANS SUERO	kU/L	
Prueba	M12		RAST A MOHOS Y HONGOS AUREOBASIDIUM PULLULANS (PULULARIA) SU	kU/L	
Prueba	M13		RAST A MOHOS Y HONGOS PHOMA BETAE SUERO	kU/L	
Prueba	M14		RAST A MOHOS Y HONGOS EPICOCCUM PURPURASCENS SUERO	kU/L	
Prueba	M15		RAST A MOHOS Y HONGOS TRICHODERMA VIRIDE SUERO	kU/L	
Prueba	M16		RAST A MOHOS Y HONGOS CURVULARIA LUNATA SUERO	kU/L	
Prueba	M205		RAST A TRICHOPHYTON RUBRUM	kU/L	
Prueba	M229		RAST RECOMBINANTE rAlt a 1 Alternaria alternata	kU/L	
	M70				
Prueba	M80		RAST A MOHOS Y HONGOS STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN A	kU/L	

Componentes					
Prueba	M81		RAST A MOHOS Y HONGOS STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B	kU/L	
Prueba	MX1		RAST A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m6)	kU/L	
Prueba	MX2		RAST A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m5, m6)	kU/L	
Prueba	O70		RAST A FLUIDO SEMINAL SUERO	kU/L	
Prueba	P01		RAST A PARASITOS ASCARIS SUERO	kU/L	
Prueba	P04		RAST A PARASITOS ANISAKIS (EN PESCADO)	kU/L	
	PAX3				
Prueba	PHADIAT		SCREENING DE NEUMOALERGENOS	kU/L	
Prueba	PLATARAST		RAST A PLATA (c634)	kU/L	
Prueba	Q104		RAST A TITANIO	kU/L	
	Q45				
	R0202				
Prueba	RASTNIQUEL		RAST A NIQUEL	kU/L	
Prueba	RASTYODO		RAST A YODO	kU/L	
Prueba	RBETV1		RAST RECOMBINANTE rbet v1 Polen Abedul	kU/L	
Prueba	RBETV2		RAST RECOMBINANTE rbet v2 profilina Polen Abedul	kU/L	
Prueba	RC202		RAST A MEDICAMENTOS SUXAMETHOMIUM (SUCCINILCOLINA) SUERO	kU/L	
Prueba	RC208		RAST A TOXOIDE TETANICO	kU/L	
Prueba	RC7		RAST A MEDICAMENTOS CEFACLOR	kU/L	
Prueba	RD201		RAST A ACAROS BLOMIA TROPICALIS SUERO	kU/L	
Prueba	RE201		RAST A ANIMALES PLUMAS DE CANARIO	kU/L	
Prueba	RE204		RAST A ANIMALES BSA (SUERO DE ALBUMINA BOVINA)	kU/L	
Prueba	RE206		RAST A ANIMALES SUERO DE CONEJO SUERO	kU/L	
Prueba	RE208		RAST A ANIMALES EPITELIO DE CHINCHILLA	kU/L	
Prueba	RE209		RAST A ANIMALES GERBO	kU/L	
Prueba	RE211		RAST A PROTEINA ORINA DE CONEJO	kU/L	
Prueba	RE213		RAST A ANIMALES PLUMAS DE LORO	kU/L	
Prueba	RE215		RAST A ANIMALES PLUMAS DE PALOMA	kU/L	
Prueba	RE217		RAST A ANIMALES EPITELIO DE HURON	kU/L	
Prueba	RE218		RAST A ANIMALES EXCREMENTO DE POLLO	kU/L	
Prueba	RE219		RAST A PROTEINAS DE SUERO DE POLLO	kU/L	
Prueba	RE220		RAST RECOMBINANTE nFel d 2 Albúmina sérica gato	kU/L	
Prueba	RE221		RAST RECOMBINANTE nCan F3 ALBUMINA SERICA DE PERRO	kU/L	
Prueba	RE222		RAST A ANIMALES ALBUMINA SERICA PORCINA	kU/L	
Prueba	RF201		RAST A ALIMENTOS NUEZ LISA (PACANA) SUERO	kU/L	
Prueba	RF202		RAST A ALIMENTOS NUEZ DE ACAJU (ANACARDO) SUERO	kU/L	
Prueba	RF203		RAST A ALIMENTOS PISTACHO SUERO	kU/L	
Prueba	RF204		RAST A ALIMENTOS TRUCHA	kU/L	
Prueba	RF205		RAST A ALIMENTOS ARENQUE SUERO	kU/L	
Prueba	RF206		RAST A ALIMENTOS CABALLA	kU/L	

Componentes					
Prueba	RF207		RAST A ALIMENTOS ALMEJA SUERO	kU/L	
Prueba	RF208		RAST A ALIMENTOS LIMON SUERO	kU/L	
Prueba	RF209		RAST A ALIMENTOS POMELO SUERO	kU/L	
Prueba	RF210		RAST A ALIMENTOS PIÑA SUERO	kU/L	
Prueba	RF211		RAST A ALIMENTOS MORA SUERO	kU/L	
Prueba	RF212		RAST A ALIMENTOS CHAMPIÑON SUERO	kU/L	
Prueba	RF213		RAST A ALIMENTOS CARNE DE CONEJO SUERO	kU/L	
Prueba	RF214		RAST A ALIMENTOS ESPINACA SUERO	kU/L	
Prueba	RF215		RAST A ALIMENTOS LECHUGA SUERO	kU/L	
Prueba	RF216		RAST A ALIMENTOS COL (REPOLLO) SUERO	kU/L	
Prueba	RF217		RAST A ALIMENTOS COLES DE BRUSELAS SUERO	kU/L	
Prueba	RF218		RAST A ALIMENTOS PIMIENTA ROJA/PIMENTON/PIMIENTO	kU/L	
Prueba	RF220		RAST A ALIMENTOS CANELA SUERO	kU/L	
Prueba	RF221		RAST A ALIMENTOS CAFE SUERO	kU/L	
	RF222				
Prueba	RF225		RAST A ALIMENTOS CALABAZA SUERO	kU/L	
Prueba	RF226		RAST A ALIMENTOS SEMILLA DE CALABAZA SUERO	kU/L	
Prueba	RF227		RAST A ALIMENTOS SEMILLA DE REMOLACHA (F319) SUERO		
Prueba	RF231		RAST A ALIMENTOS LECHE HERVIDA SUERO	kU/L	
Prueba	RF232		RAST RECOMBINANTE nGal d 2, Ovoalbumina huevo de Gallina	kU/L	
Prueba	RF233		RAST RECOMBINANTE nGal d1, Ovomucoide huevo de Gallina	kU/L	
Prueba	RF234		RAST A ALIMENTOS VAINILLA	kU/L	
Prueba	RF235		RAST A ALIMENTOS LENTEJAS SUERO	kU/L	
Prueba	RF236		RAST A ALIMENTOS SUERO DE LA LECHE SUERO	kU/L	
Prueba	RF237		RAST A ALIMENTOS ALBARICOQUE SUERO	kU/L	
Prueba	RF242		RAST A ALIMENTOS CEREZA SUERO	kU/L	
Prueba	RF244		RAST A ALIMENTOS PEPINO SUERO	kU/L	
Prueba	RF245		RAST A ALIMENTOS HUEVO ENTERO SUERO	kU/L	
Prueba	RF246		RAST A ALIMENTOS GUAR (CYAMOPSIS TETRAGONOLOBUS) SUERO	kU/L	
Prueba	RF247		RAST A ALIMENTOS MIEL SUERO	kU/L	
Prueba	RF253		RAST A ALIMENTOS PIÑONES (PONUS EDULES) SUERO	kU/L	
Prueba	RF255		RAST A ALIMENTOS CIRUELA SUERO	kU/L	
Prueba	RF256		RAST A ALIMENTOS NUEZ DE NOGAL SUERO	kU/L	
Prueba	RF258		RAST A ALIMENTOS CALAMAR SUERO	kU/L	
Prueba	RF259		RAST A ALIMENTOS UVA	kU/L	
Prueba	RF260		RAST A ALIMENTOS BRECOL SUERO	kU/L	
Prueba	RF261		RAST A ALIMENTOS ESPARRAGO SUERO	kU/L	
Prueba	RF262		RAST A ALIMENTOS BERENJENA SUERO	kU/L	
Prueba	RF263		RAST A ALIMENTOS PIMIENTA VERDE	kU/L	
	RF264				

Componentes					
Prueba	RF268		RAST A ALIMENTOS CLAVO	kU/L	
Prueba	RF269		RAST A ALIMENTOS ALBAHACA SUERO	kU/L	
Prueba	RF270		RAST A ALIMENTOS JENGIBRE SUERO	kU/L	
Prueba	RF271		RAST A ALIMENTOS ANIS (SEMILLAS DE PIPINELLA ANISUM) SUERO	kU/L	
Prueba	RF273		RAST A ALIMENTOS TOMILLO	kU/L	
Prueba	RF276		RAST A ALIMENTOS HINOJO FRESCO SUERO	kU/L	
Prueba	RF278		RAST A ALIMENTOS HOJA DE LAUREL SUERO	kU/L	
Prueba	RF279		RAST A ALIMENTOS PIMIENTA DE CHILE SUERO	kU/L	
Prueba	RF280		RAST A ALIMENTOS PIMIENTA NEGRA SUERO	kU/L	
Prueba	RF281		RAST A ALIMENTOS CURRY (SANTA MARIA) SUERO	kU/L	
Prueba	RF282		RAST A ALIMENTOS NUEZ MOSCADA SUERO	kU/L	
Prueba	RF283		RAST A ALIMENTOS OREGANO SUERO	kU/L	
Prueba	RF284		RAST A ALIMENTOS CARNE DE PAVO	kU/L	
Prueba	RF286		RAST A ALIMENTOS LECHE DE YEGUA SUERO	kU/L	
Prueba	RF287		RAST A ALIMENTOS JUDIA PINTA	kU/L	
Prueba	RF289		RAST A ALIMENTOS DATIL SUERO	kU/L	
Prueba	RF290		RAST A ALIMENTOS OSTRA SUERO	kU/L	
Prueba	RF291		RAST A ALIMENTOS COLIFLOR SUERO	kU/L	
	RF292				
Prueba	RF293		RAST A ALIMENTOS PAPAYA SUERO	kU/L	
Prueba	RF294		RAST A ALIMENTOS MARACUYA SUERO	kU/L	
Prueba	RF296		RAST A ALIMENTOS ALGARROBA SUERO (E 410)	kU/L	
Prueba	RF297		RAST A ALIMENTOS GOMA ARABIGA (E 414)	kU/L	
Prueba	RF298		RAST A ALIMENTOS TRAGACANTO (E 413)	kU/L	
Prueba	RF299		RAST A ALIMENTOS CASTAÑA SUERO	kU/L	
Prueba	RF300		RAST A ALIMENTOS LECHE DE CABRA SUERO	kU/L	
	RF301				
Prueba	RF302		RAST A ALIMENTOS MANDARINA SUERO	kU/L	
Prueba	RF303		RAST A ALIMENTOS HALIBUT/ FLETAN SUERO	kU/L	
Prueba	RF304		RAST A ALIMENTOS LANGOSTA SUERO	kU/L	
Prueba	RF306		RAST A ALIMENTOS LIMA SUERO	kU/L	
Prueba	RF307		RAST A ALIMENTOS MERLUZA SUERO	kU/L	
Prueba	RF308		RAST A ALIMENTOS SARDINA SUERO	kU/L	
Prueba	RF309		RAST A ALIMENTOS GARBANZO SUERO	kU/L	
	RF310				
Prueba	RF311		RAST A ALIMENTOS GALLO (PESCADO) SUERO	kU/L	
Prueba	RF312		RAST A ALIMENTOS EMPERADOR (PEZ ESPADA) SUERO	kU/L	
Prueba	RF313		RAST A ALIMENTOS ANCHOA (BOQUERON) SUERO	kU/L	
Prueba	RF314		RAST A ALIMENTOS CARACOL SUERO	kU/L	
Prueba	RF315		RAST A ALIMENTOS JUDIA VERDE SUERO	kU/L	
Prueba	RF317		RAST A ALIMENTOS CILANTRO SUERO	kU/L	
Prueba	RF319		RAST A ALIMENTOS REMOLACHA SUERO	kU/L	

Componentes					
Prueba	RF320		RAST A ALIMENTOS CANGREJO DE RIO SUERO	kU/L	
Prueba	RF323		RAST RECOMBINANTE ngal d3; Conalbumina huevo de gallina	kU/L	
Prueba	RF324		RAST A ALIMENTOS LUPULO SUERO	kU/L	
Prueba	RF325		RAST A ALIMENTOS LECHE DE OVEJA SUERO	kU/L	
Prueba	RF326		RAST A SUERO DE LECHE DE OVEJA	kU/L	
Prueba	RF328		RAST A ALIMENTOS HIGO SUERO	kU/L	
Prueba	RF329		RAST A ALIMENTOS SANDIA SUERO	kU/L	
	RF331				
Prueba	RF332		RAST A ALIMENTOS MENTA	kU/L	
	RF334				
Prueba	RF335		RAST A ALIMENTOS ALTRAMUZ SUERO	kU/L	
Prueba	RF338		RAST A ALIMENTOS VIEIRA	kU/L	
Prueba	RF340		RAST A ALIMENTOS EXTRACTO DE COCHINILLA (E 120)	kU/L	
Prueba	RF342		RAST A ALIMENTOS OLIVA (ACEITUNA)	kU/L	
Prueba	RF343		RAST A ALIMENTOS FRAMBUESA SUERO	kU/L	
	RF344				
Prueba	RF345		RAST A ALIMENTOS NUEZ DE MACADAMIA	kU/L	
Prueba	RF351		RAST RECOMBINANTE rPen a 1 Tropomiosina Camarón (Marisco)	kU/L	
Prueba	RG201		RAST A POLENES DE GRAMINEAS HORDEUM VULGARE (CEBADA)	kU/L	
Prueba	RG202		RAST A POLENES DE GRAMINEAS ZEA MAYS (MAIZ)	kU/L	
Prueba	RG205		RAST RECOMBINANTE rPhl p 1 Polen Hierba Timotea	kU/L	
Prueba	RG206		RAST RECOMBINANTE nPhl p2 Polen Hierba Timotea	kU/L	
Prueba	RG210		RAST RECOMBINANTE rPhl p 7 Polen Hierba Timotea	kU/L	
Prueba	RG212		RAST RECOMBINANTE rphl P 12 profilin Hierba Timotea	kU/L	
Prueba	RG213		RAST RECOMBINANTE rPhl p1+rPhl p5b Hierba Timotea	kU/L	
Prueba	RG214		RAST RECOMBINANTE rPhl p7+rPhl p12 Hierba Timotea	kU/L	
Prueba	RG215		RAST RECOMBINANTE rPhl p5b Polen Hierba Timotea	kU/L	
Prueba	RI203		RAST A INSECTOS MARIPOSA DE LA HARINA	kU/L	
Prueba	RI204		RAST A INSECTOS TABANO	kU/L	
Prueba	RI205		RAST A INSECTOS ABEJORRO	kU/L	
Prueba	RI206		RAST A INSECTOS PERIPLANETA AMERICANA (CUCARACHA AMERICANA)	kU/L	
	RI207				
Prueba	RK201		RAST A ENZIMAS PAPAINA SUERO	kU/L	
	RK202				
Prueba	RK208		RAST RECOMBINANTE nGal d 4; Lisozima huevo de gallina	kU/L	
	RK211				
	RK212				
	RK213				
	RK215				
	RK217				

Componentes					
Prueba	RK218		RAST RECOMBINANTE rHev b 5 Latex (Hevea brasiliensis)	kU/L	
	RK219				
Prueba	RK220		RAST RECOMBINANTE rhev b 6.02 Latex (Hevea brasiliensis)	kU/L	
Prueba	RK221		RAST RECOMBINANTE rhev b 8 Profilina Latex (H. brasiliensis)	kU/L	
	RK222				
	RK224				
Prueba	RM201		RAST A MOHOS Y HONGOS USTILAGO NUDA SUERO	kU/L	
	RM205				
Prueba	RM207		RAST A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS NIGER SUERO	kU/L	
Prueba	RM208		RAST A MOHOS Y HONGOS CHAETOMIUM GLOBOSUM	kU/L	
Prueba	RM209		RAST A MOHOS Y HONGOS PENICILLIUM FREQUENTANS	kU/L	
Prueba	RM218		RAST RECOMBINANTE rAsp f 1 Aspergillus fumigatus	kU/L	
Prueba	RM219		RAST RECOMBINANTE rAsp f 2 Aspergillus fumigatus	kU/L	
Prueba	RM220		RAST RECOMBINANTE rAsp f 3 Aspergillus fumigatus	kU/L	
Prueba	RM221		RAST RECOMBINANTE rAsp f 4 Aspergillus fumigatus	kU/L	
Prueba	RM222		RAST RECOMBINANTE rAsp f 6 Aspergillus fumigatus	kU/L	
Prueba	RM223		RAST A MOHOS Y HONGOS STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN C	kU/L	
Prueba	RM226		RAST A ENTEROTOXINA TSST STAPHYLOC. SUERO	kU/L	
Prueba	RO201		RAST A HOJA DE TABACO SUERO	kU/L	
Prueba	RO203		RAST A TETRAMIN (COMIDA PECES)	kU/L	
Prueba	RO207		RAST A DAPHNIA (COMIDA PARA PECES)	kU/L	
	RO209				
Prueba	RO213		RAST RECOMBINANTE MALTOSA-BINDING PROTEIN	kU/L	
Prueba	RS201		RAST A NYLON	kU/L	
Prueba	RS204		RAST A ALGODON (TRATADO) SUERO	kU/L	
Prueba	RS205		RAST A VARIOS LANA TRATADA (K20)	kU/L	
Prueba	RS210		RAST A MOHOS Y HONGOS NEUROSPORA SITOPHILA SUERO	kU/L	
Prueba	RS211		RAST A ANIMALES SUERO DE PALOMA	kU/L	
Prueba	RS215		RAST A POLVO DE MADERA DE PINO BLANCO (K36)	kU/L	
Prueba	RS221		RAST A ALIMENTOS RAPE (PESCADO) SUERO	kU/L	
	RS222				
	RS223				
Prueba	RS225		RAST A POLENES ARBOLES SYRINGA VULGARIS (POLEN LILA) (T250)	kU/L	
Prueba	RS226		RAST A TERYLENE	kU/L	
Prueba	RS227		RAST A STAPHYLOCOCCUS AUREUS	kU/L	
	RS229				
Prueba	RS231		RAST A INSECTOS CULEX PIPIENS (MOSQUITO)	kU/L	
Prueba	RS233		RAST A ANIMALES MOSCA DOMESTICA	kU/L	
Prueba	RS236		RAST A ALIMENTOS GRANADA SUERO	kU/L	
Prueba	RS237		RAST A ALIMENTOS ALCACHOFA SUERO (F358)	kU/L	

Componentes					
Prueba	RS238		RAST A ALIMENTOS COMINO	kU/L	
Prueba	RS239		RAST A ALIMENTOS CHOCOLATE SUERO	kU/L	
Prueba	RS240		RAST A NECTARINA	kU/L	
Prueba	RS241		RAST A ALIMENTOS PUERRO SUERO	kU/L	
Prueba	RS242		RAST A ALIMENTOS ACELGA SUERO	kU/L	
Prueba	RS243		RAST A ALIMENTOS HABA SUERO	kU/L	
Prueba	RS244		RAST A ALIMENTOS LUBINA SUERO	kU/L	
	RS245				
Prueba	RS246		RAST A ALIMENTOS CALABACIN	kU/L	
Prueba	RS247		RAST A ALIMENTOS BESUGO (PESCADO) SUERO	kU/L	
Prueba	RS249		RAST A ALIMENTOS PIMIENTA BLANCA	kU/L	
Prueba	RT201		RAST A POLENES DE ARBOLES PICEA EXCELSA (ABETO)	kU/L	
Prueba	RT203		RAST A POLENES DE ARBOLES AESCULUS HIPPOCASTANUM (CASTAÑO IN	kU/L	
Prueba	RT205		RAST A POLENES DE ARBOLES SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)	kU/L	
Prueba	RT206		RAST A POLENES DE ARBOLES CASTANEA SATIVA (CASTAÑO) SUERO	kU/L	
Prueba	RT208		RAST A POLENES DE ARBOLES TILIA CORDATA (TILO)	kU/L	
Prueba	RT209		RAST A POLENES DE ARBOLES CARPINUS BETULUS (CARPE) SUERO	kU/L	
Prueba	RT210		RAST A POLENES DE ARBOLES LIGUSTRUM VULGARE (LIGUSTRO)	kU/L	
Prueba	RT212		RAST A POLENES DE ARBOLES CEDRO (LIBOCEDRUS DECURRENS)	kU/L	
Prueba	RT213		RAST A PINUS RADIATA	kU/L	
Prueba	RW204		RAST A POLENES DE HERBACEAS HELIANTHUS ANNUUS (GIRASOL)	kU/L	
	RW206				
Prueba	T01		RAST A POLENES DE ARBOLES ACER NEGUNDO (ARCE, SICOMORO) SUER	kU/L	
Prueba	T02		RAST A POLENES DE ARBOLES ALNUS INCANA (ALISO GRIS) SUERO	kU/L	
Prueba	T03		RAST A POLENES DE ARBOLES BETULA VERRUCOSA (ABEDUL) SUERO	kU/L	
Prueba	T04		RAST A POLENES DE ARBOLES CORYLUS AVELLANA (AVELLANO) SUERO	kU/L	
Prueba	T05		RAST A POLENES DE ARBOLES FAGUS GRANDIFOLIA (HAYA)	kU/L	
Prueba	T06		RAST A POLENES DE ARBOLES JUNIPERUS SABINOIDES (SABINA)	kU/L	
Prueba	T07		RAST A POLENES DE ARBOLES QUERCUS ALBA (ROBLE, ENCINA)	kU/L	
Prueba	T08		RAST A POLENES DE ARBOLES ULMUS AMERICANA (OLMO)	kU/L	
Prueba	T09		RAST A POLENES DE ARBOLES OLEA EUROPAEA (OLIVO)	kU/L	

Componentes					
Prueba	T10		RAST A POLENES DE ARBOLES JUGLANS CALIFORNICA (NOGAL) SUERO	kU/L	
Prueba	T11		RAST A POLENES DE ARBOLES PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO)	kU/L	
Prueba	T12		RAST A POLENES DE ARBOLES SALIX CAPREA (SAUCE)	kU/L	
Prueba	T14		RAST A POLENES DE ARBOLES POPULUS DELTOIDES (ALGODONERO) SUE	kU/L	
Prueba	T15		RAST A POLENES DE ARBOLES FRAXINUS AMERICANA (FRESNO AMERIC)	kU/L	
Prueba	T16		RAST A POLENES DE ARBOLES PINUS STROBUS (PINO)	kU/L	
Prueba	T17		RAST A POLENES DE ARBOLES CRYPTOMERIA JAPONICA (CEDRO JAPON)	kU/L	
Prueba	T18		RAST A POLENES DE ARBOLES EUCALYPTUS SPP (EUCALIPTUS)	kU/L	
Prueba	T19		RAST A POLENES DE ARBOLES ACACIA LONGIFOLIA (ACACIA) SUERO	kU/L	
Prueba	T20		RAST A POLENES DE ARBOLES PROSOPIS JULIFLORA (MEZQUITE) SUER	kU/L	
Prueba	T21		RAST A POLENES DE ARBOLES MELALEUCA LEUCADENDRON (CAYEPUT)	kU/L	
Prueba	T211		RAST POLENES DE ARBOLES AMBAR Liquidambar Styraciflua.	kU/L	
Prueba	T22		RAST A POLENES DE ARBOLES CARYA PECAN (NOGAL AMERICANO)	kU/L	
Prueba	T220		RAST RECOMBINANTE rBet v4 Polcalcina Abedul (Betula verrucos	kU/L	
Prueba	T223		RAST A POLENES DE ARBOLES ELAIS GUINEENSIS PALMERA	kU/L	
Prueba	T241		RAST RECOMBINANTE rPla a 1 Platanus	kU/L	
Prueba	T224		RAST RECOMBINANTE rOle e 1Polen Olivo	kU/L	
Prueba	T226		RAST RECOMBINANTE nCup a 1 Cipres	kU/L	
Prueba	T23		RAST A POLENES DE ARBOLES CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRES)	kU/L	
Prueba	T70		RAST A POLENES DE ARBOLES MORUS ALBA (MORERA)	kU/L	
Prueba	T72		RAST A POLENES DE ARBOLES ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (PALMERA	kU/L	
	TX2				
	TX3				
Prueba	TX5		RAST A POLENES ARBOLES MEZCLA (t2, t4, t8, t12, t14)	kU/L	
Prueba	TX7		RAST A POLENES ARBOLES MEZCLA (t9, t12, t16, t18, t19, t21)	kU/L	
Prueba	W01		RAST A POLENES DE HERBACEAS AMBROSIA ELATIOR (RAGWEED COMUN)	kU/L	
Prueba	W02		RAST A POLENES DE HERBACEAS AMBROSIA PSILOSTACHYA (RAGWEED)	kU/L	
Prueba	W03		RAST A POLENES DE HERBACEAS AMBROSIA TRIFIDA (RAGWEED GIGANT	kU/L	

Componentes					
Prueba	W04		RAST A POLENES DE HERBACEAS FRANSERIA ACANTHICARPA (RAGWEED	kU/L	
Prueba	W05		RAST A POLENES DE HERBACEAS ARTEMISIA ABSINTHIUM (AJENJO)	kU/L	
Prueba	W06		RAST A POLENES DE HERBACEAS ARTEMISIA VULGARIS (ARTEMISA)	kU/L	
Prueba	W07		RAST A POLENES DE HERBACEAS CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM (MARG	kU/L	
Prueba	W08		RAST A POLENES DE HERBACEAS TARAXACUM VULGARE (DIENTE DE LEO	kU/L	
Prueba	W09		RAST A POLENES DE HERBACEAS PLANTAGO LANCEOLATA (LLANTEN)	kU/L	
Prueba	W10		RAST A POLENES DE HERBACEAS CHENOPODIUM ALBUM (CEÑIGO)	kU/L	
Prueba	W11		RAST A POLENES DE HERBACEAS SALSOLA KALI (PESTIFER, SALSOLA)	kU/L	
Prueba	W12		RAST A POLENES DE HERBACEAS SOLIDAGO VIRGAUREA (RUDA DORADA)	kU/L	
Prueba	W14		RAST A POLENES DE HERBACEAS AMARANTHUS RETROFLEXUS (AMARANTO	kU/L	
Prueba	W15		RAST A POLENES DE HERBACEAS ATRIPLEX LENTIFORMIS (ATRIPLICE)	kU/L	
Prueba	W207		RAST A POLENES HERBACEAS LUPINO(LUPINUS SPP)	kU/L	
Prueba	W16		RAST A POLENES DE HERBACEAS IVA CILIATA (GILDE)	kU/L	
Prueba	W17		RAST A POLENES DE HERBACEAS KOCHIA SCOPARIA	kU/L	
Prueba	W18		RAST A POLENES DE HERBACEAS RUMEX ACETOSELLA (ACEDERA, BARDA	kU/L	
Prueba	W19		RAST A POLENES DE HERBACEAS PARIETARIA OFFICINALIS (PARIETAR	kU/L	
Prueba	W20		RAST A POLENES DE HERBACEAS URTICA DIOICA (ORTIGA)	kU/L	
Prueba	W206		RAST A MATRICARIA CHAMOMILLA (MANZANILLA)	kU/L	
Prueba	W21		RAST A POLENES DE HERBACEAS PARIETARIA JUDAICA	kU/L	
Prueba	W211		RAST RECOMBINANTE rPar j 2 LTP Parietaria judaica	kU/L	
Prueba	W232		RAST RECOMBINANTE nSal k 1 Salsola	kU/L	
Prueba	W233		RAST RECOMBINANTE nArt v 3 (LTP) Artemisia	kU/L	
Prueba	WX1		RAST A POLENES HERBACEAS MEZCLA (w1, w6, w9, w10, w11)	kU/L	
Prueba	WX2		RAST A POLENES HERBACEAS MEZCLA (w2, w6, w9, w10, w15)	kU/L	
Prueba	WX5		RAST A POLENES HERBACEAS MEZCLA (w1, w6, w7, w8, w12)	kU/L	
Prueba	F61		RAST A ALIMENTOS SARDINA JAPONESA SUERO	kU/L	
Prueba	F431		RAST RECOMBINANTE ngly m 5 (Betaconglicinina) Soja	kU/L	
Prueba	F354		RAST RECOMBINANTE rBer e 1 Nuez de Brasil	kU/L	
	K208				
Prueba	W234		RAST RECOMBINANTE rPla l 1 Plantago lanceolata (llanten)	kU/L	

Componentes					
	U953				
	RS202				
Prueba	RS259		RAST A INSECTOS THAUMETOPOEA PITYOCAMPA(PROCESIONARIA)	KU/L	
	X17				
Prueba	RK214		RAST A ALERGENOS OCUPACIONALES BUGANVILLA	kU/L	
Prueba	D209		RAST RECOMBINANTE rDer p 23 Dermatophagoides Pteronyssinus	kU/L	
Prueba	F447		RAST RECOMBINANTE rAra h 6 CACAHUETE	kU/L	
Prueba	F443		RAST RECOMBINANTE rAra o 3 Anacardo	kU/L	
	T54				
Prueba	O211		RAST A INSECTOS GUSANO DE LA HARINA	kU/L	

Descripción: RAST A MEDICAMENTOS ACIDO CLAVULANICO SUERO
Código: Q21
Técnica:
Unidades: kU/L
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RAST A MEDICAMENTOS IBUPROFENO
Código: Q57
Técnica:
Unidades: kU/L
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RAST A MEDICAMENTOS INSULINA PORCINA
Código: C70
Técnica:
Unidades: kU/L
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RAST A MEDICAMENTOS OFLOXACINO SUERO
Código: X38
Técnica: TECNICA RADIOALERGOSORBENTE(RAST)
Unidades: kU/L
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: RAST A MEDICAMENTOS OFLOXACINO SUERO
Comentario adicional: 1 ML DE SUERO
Valores de referencia:

Código: RAST_2
Descripción: RAST A MEZCLAS DE ALERGENOS
Técnica: CAP-SYSTEM
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EX72		RAST A PLUMAS ANIMALES MEZCLA (e201, e213, e214, e78)		
	FX10				
Prueba	FX13		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f12 - f15 - f31 - f35)	kU/L	
Prueba	FX17		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f49, f92, f94, f95)	KU/L	
Prueba	FX20		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f4, f5, f6, f9)	kU/L	
Prueba	FX74		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f3, rf205, rf206, rf254)	kU/L	
Prueba	TX1		RAST A POLENES ARBOLES MEZCLA (t1, t3, t7, t8, t10)	kU/L	
Prueba	WX3		RAST A POLENES HERBACEAS MEZCLA (w6, w9, w10, w12, w20)	kU/L	
Prueba	WX7		RAST A POLENES HERBACEAS MEZCLA (w7, w8, w9, w10, w12)	KU/L	
Prueba	FX25		RAST A ALIMENTOS MEZCLA (f10, f45, f47, f85)	kU/L	

Descripción: RAST A PALADIO
Código: X46
Técnica: RAST
Unidades: kU/L
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RAST RECOMBINANTE rMal d 1 PR-10 MANZANA
Código: F434
Técnica:
Unidades: KU/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: REABSORCION TUBULAR DE FOSFATOS
Código: REABFOS
Técnica: Fórmula
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: Se requiere orina de 24 horas y suero

Descripción: REABSORCION TUBULAR DE FOSFATOS
Valores de referencia: (82 - 95)

Descripción: REACCION EOSINOFILICA EN ESPECIMEN
Código: EOSINESP
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RECEPTOR ACETILCOLINA AC. SUERO
Código: RECEPACEAC
Técnica: ELISA
Unidades: nmol/L
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.45) Negativo

Descripción: Receptor hormona de crecimiento: gen GH (NGS)
Código: GHRECEPTOR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: RECEPTOR SOLUBLE TRANSFERRINA SUERO
Código: RECSOLTRAN
Técnica: Inmunoturbidimetría
Unidades: mg/L
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero.
Valores de referencia: (2.20 - 5.00) Hombre
(1.90 - 4.40) Mujer

Descripción: RECEPTORES DE TSH ANTICUERPOS (TSI)
Código: LATS
Técnica: Electroquimioluminiscencia
Unidades: UI/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia:

Descripción: RECEPTORES INSULINA AC. SUERO
Código: RECINSUAC
Técnica: Radioinmunoprecipitación
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero (CONGELADO)
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: RECUENTO CELULAR ASPIRADO BRONQUIAL
Código: RCASPBRONQ
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RECUENTO DE AEROBIOS MESÓFILOS EN SUPERFICIE
Código: AEROBIOSSU
Técnica: MÉTODO BASADO EN LA ISO 18593
Unidades: ufc/cm ^2
Plazo: 6 días
Tubo:
Comentario adicional: 1 PLACA ESPECIAL PARA AEROBIOS
Valores de referencia: (Inf. 0) Ausencia de crecimiento(calificación:excelente)
(Inf. 1) Contaminación leve(Calificación : Buena)
(1 - 10) Contaminación moderada(Calificación:moderada)
(Sup. 10) Contaminación fuerte(Calificación deficiente)

Descripción: RECUENTO DE EOSINOFILOS
Código: EOSINOFIRE
Técnica: tinción frotis
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Citología
Comentario adicional: Torunda
Valores de referencia:

Descripción: RECUENTO DE EOSINOFILOS
Código: EOSINOREC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RECUENTO DE EOSINOFILOS EN EXUDADO CONJUNTIVAL
Código: EOSCONJ

Descripción: RECUENTO DE EOSINOFILOS EN EXUDADO CONJUNTIVAL
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RECUENTO DE RETICULOCITOS
Código: RETI
Técnica: Citometría de flujo
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: EDTA
Valores de referencia: (0.5 - 2)

Descripción: REDUCTORES EN ORINA
Código: REDUCTO2
Técnica: Colorimétrica
Unidades: g/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL Orina
Valores de referencia: (Inf. 0.25) Negativo
(0.25 - 0.50) Indeterminado
(Sup. 0.50) Positivo

Descripción: Refsum, enfermedad de. Panel NGS
Código: GEN_000661
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: REM (RECUPERACIÓN DE ESPERMATOZOIDES MÓVILES)
Código: REM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Semen
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Renina Actividad en Plasma
Código: RENINA
Técnica: RIA
Unidades: ng/mL/h

Descripción: Renina Actividad en Plasma
Plazo: 7 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 2 ml de plasma de EDTA. Congelar y enviar congelado., NO refrigerar. No muestras con plasma heparina ni plasma citrato
Valores de referencia: (Inf. 2.0) P.supina
(Inf. 5.0) P.ortostática
= 1 mes - 3 meses 2-6 veces superior a los valores de referencia de los adultos
= 3 meses - 12 meses 1-3 veces superior a los valores de referencia de los adultos

---

Descripción: RENINA DIRECTA PLASMA
Código: DIRERENINA
Técnica: CLIA
Unidades: mcUI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Plasma EDTA Pruebas Especiales
Comentario adicional: 1 mL Plasma EDTA. NO refrigerar ni la jeringa ni al centrifugar. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
CONDICIONES RECOLECCION DE LA MUESTRA:
Recolectar la sangre a media mañana, después de que el paciente se haya levantado (sentado, de pie o caminando) durante al menos 2 horas y después haya estado sentado durante 5-15 min. Recoja la sangre con cuidado, evitando la estasis y la hemólisis
Valores de referencia: (2.8 - 39.9) P. supina
(4.4 - 46.1) P. ortostática

Descripción: RENINA VENA SUPRARRENAL IZQUIERDA
Código: RENINVSI
Técnica: RIA
Unidades:
Plazo:
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Reordenamiento cadena beta del receptor TCR
Código: TCRBETA
Técnica: PCR y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:

Descripción: Reordenamiento cadena gamma del receptor TCR
Código: TCRGAMMA
Técnica: PCR y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

Descripción: Reordenamiento cadena gamma del receptor TCR
Valores de referencia:

Descripción: Reordenamiento de gen FUS (16p11).
Código: MDFISHFUS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
min 2 ml médula ósea.
Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Resistencia a estrógenos. Sec Gen: ESR1
Código: GEN_000662
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Resistencia a la hormona tiroidea. Sec Gen: THRB
Código: GEN_000663
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Resistencia a la insulina. Sec Gen: INSR
Código: GEN_000664
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA
Código: RESACTPC
Técnica: Coagulación
Unidades: segundos
Plazo: 6 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 5 mL de Plasma Citrato
Valores de referencia: (120 - 300)

Descripción: RESISTENCIA GLOBULAR OSMOTICA
Código: RESIOSMO
Técnica: Lisis osmótica
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 ml sangre total EDTA. Rogamos envio inmediato, evitar extracción viernes.
Valores de referencia:

Descripción: Respuesta a tratamiento con Metformina. Gen IRS1
Código: IRS1_METFO
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RETICULINA AC. IGA SUERO
Código: RETICUACA
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: = Negativo <1/10
= Positivo >1/10

Descripción: RETICULINA AC. IGG SUERO
Código: RETICUACG
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: = Negativo <1/10
= Positivo >1/10

Descripción: Retinitis punctata albescens. Panel NGS
Código: GEN_000665
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinoblastoma. Sec Gen: RB1
Código: GEN_000666
Técnica:

Descripción: Retinoblastoma. Sec Gen: RB1
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: RETINOL PROTEINA FIJADORA SUERO
Código: RETINOLPF
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Las muestras con presencia de fibrina deben centrifugarse.
Valores de referencia: (1.5 - 6.7)

Descripción: Retinosis pigmentaria 2, ligado al X. Sec Gen: RP2
Código: GEN_000667
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis pigmentaria 3: gen RPGR (NGS)
Código: RPGR_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis pigmentaria tipo 4, AD/AR. Sec Gen: RHO
Código: GEN_000668
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis pigmentaria: >10 genes (NGS)
Código: RETIN_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Retinosis pigmentaria: >10 genes (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis pigmentaria: gen RP1 (NGS)
Código: RP1_RETPIG
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis punctata albescens. Sec Gen: RDH5
Código: GEN_000669
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosquisis, ligada al cromosoma X. Sec Gen: RS1
Código: GEN_000670
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retraso en el desarrollo. Panel NGS
Código: GEN_000672
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retraso mental ligado al X. Sec Gen: SOX3
Código: GEN_000671
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Retraso mental ligado al X. Sec Gen: SOX3
Valores de referencia:

Descripción: Rett atípico, Sd. Sec Gen: CDKL5
Código: GEN_000674
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Rett, Sd. Sec Gen: FOXG1
Código: GEN_000673
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: RHINOVIRUS PCR
Código: RHINOVIPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 14 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Aspirado nasofaríngeo
Envio inmediato a 4ºC
Valores de referencia:

Descripción: Ri (ANNA-2) AC. LCR
Código: ACRILCR
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR
Valores de referencia:

Descripción: RIBONUCLEOPROTEINA AC. SUERO
Código: RNPAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero.
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: RIBOSOMAL P AC. SUERO
Código: AC.RIBOSOM

Descripción:	RIBOSOMAL P AC. SUERO
Técnica:	IFI
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	RICKETTSIA AC. SUERO (WEIL-FELIX SEROAGLUTINACION)
Código:	WEILFELIAC
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	=NEGATIVO

Descripción:	RICKETTSIA CONORII AC. IGG SUERO (FIEBRE BOTONOSA)
Código:	RICCONOACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero/Plasma
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	RICKETTSIA CONORII AC. IGM SUERO (FIEBRE BOTONOSA)
Código:	RICCONOACM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	Rickettsia conorii DNA PCR
Código:	RICKCONPCR
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:	

Descripción:	RICKETTSIA RICKETSII AC. IGG SUERO
Código:	RICRICKACG

Descripción: RICKETTSIA RICKETSII AC. IGG SUERO
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =<1:64 Título <1/64 Negativo
=>1:64 Título > o = 1/64 Positivo

Descripción: RICKETTSIA RICKETSII AC.IGM SUERO
Código: RICRICKACM
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =<1:64 Título < 1/64 Negativo
=>1:64 Titulo > o = 1/64 Positivo

Descripción: RICKETTSIA TYPHI AC. IGG (MOOSERI)
Código: RICMOOACG
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Refrigerar.
Valores de referencia: = Negativo<1/40
= Positivo >o=1/40

Descripción: RICKETTSIA TYPHI AC. IGM (MOOSERI)
Código: RICMOOACM
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Refrigerar
Valores de referencia: = Negativo<1/40
= Positivo >o= 1/40

Código: RISPER
Descripción: RISPERIDONA MAS 9-HIDROXIRISPERIDONA
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional: 2 mL

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	RISP		Perfil RISPERIDONA	ng/mL	
Prueba	HIDROXIRIS		9- HIDROXIRIS	ng/mL	

Componentes					
Prueba	RISHIDROX		Perfil RISPERIDONA+HIDROXRISPERIDONA	ng/mL	(20 - 60)

Descripción:	RNA POLIMERASA AC. SUERO
Código:	RNAPOLI
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 20) Negativo (21 - 39) Positivo débil (40 - 80) Positivo moderado (Sup. 81) Positivo fuerte

Descripción:	RNA VIRUS HEPATITIS A (PCR)
Código:	VHAPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero separado lo antes posible del coágulo. Evitar hemólisis. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. Alternativas: Plasma y Heces (congeladas)
Valores de referencia:	

Descripción:	Roberts, Sd. Sec Gen: ESCO2
Código:	GEN_000675
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Robinow, Sd. Gen: ROR2. MLPA
Código:	GEN_000676
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ROSA DE BENGALA
Código:	ROSABEN
Técnica:	Aglutinación de Ac anti Brucella (Ag Rosa de Bengala)
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: ROSA DE BENGALA
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: ROTAVIRUS HECES
Código: ROTAVI
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Heces Microbiología
Comentario adicional: 2 dias a 8ªC
Valores de referencia:

Descripción: ROTAVIRUS IGG EN SUERO
Código: ROTAVSUE
Técnica: Fijación de complemento
Unidades: Indice
Plazo: 25 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 1) :Negativo
(Sup. 1) :Positivo

Descripción: ROTAVIRUS RNA PCR
Código: ROTAVIRPCR
Técnica: Hibridación Molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Muestra: LCR, HECES, otras muestras biológicas. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:

Descripción: Rothmund-Thomson, Sd. Sec Gen: RECQL4
Código: GEN_000677
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: RUBEOLA AC. IGG
Código: RUBEACG
Técnica: CMIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (Sup. 10) Inmunidad adquirida

Descripción:	RUBEOLA AC. IGM
Código:	RUBEACM
Técnica:	CMIA
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1.20) Negativo (1.21 - 1.59) Indeterminado

Descripción:	RUBEOLA AVIDEZ IGG
Código:	AVIDEZRUBE
Técnica:	EIA
Unidades:	%
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero o plasma (citrato, heparina) positiva para CMV IgG
Valores de referencia:	(Inf. 45) Baja Avidez.Compatible con primoinfeccion adquirida en los últimos 2 meses. (45 - 55) Moderada Avidez. No permite distinguir infección reciente de antigua. (Sup. 55) Alta Avidez. Compatible con infección o reinfección pasada.

Descripción:	Rubeola RNA PCR Cualitativa
Código:	RUBEOLAPCR
Técnica:	HIBRIDACIÓN MOLECULAR PCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Líquido amniótico, LCR y otro tipo de muestras.
Valores de referencia:	

Descripción:	Rubinstein-Taybi, Sd. Sec Gen: CREBBP
Código:	GEN_000678
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	RUFINAMIDA SUERO
Código:	RUFINAMIDA
Técnica:	CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA/TÁNDEM MASAS (LC-MS/MS)
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(5 - 45)

Descripción: S de Noonan: >10 genes (NGS)
Código: NOONAN
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: S. de hiperinmunoglob. y fiebre periódica: gen MVK (NGS)
Código: HIDS
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: S. Hemolítico urémico atípico: >10 genes (NGS)
Código: SHUA_COMPL
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: S. Hiper IgE autosómico dominante: gen STAT3 (NGS)
Código: STAT3
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM.
Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: S. QT corto: genes KCNH2, KCNQ1 y KCNJ2 (NGS)
Código: QT_CORTO
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: S. QT Largo: >10 genes (NGS)
Código: QT_LARGO
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: SACCHAROMYCES CEREVISIAE AC. IGG
Código: ASCAG
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
(7 - 10) Indeterminado

Descripción: SACHAROMYCES CEREVISIAE AC. IGA
Código: ASCA
Técnica: Técnica ELISA
Unidades: U/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativo plasma de EDTA o plasma de Citrato
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
(7 - 10) Indeterminado

Descripción: SAE1 AC SUERO
Código: SAE1
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: Saethre-Chotzen, Sd. Sec Gen: TWIST1
Código: GEN_000679
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SALMONELLA PARATIFICA B AGLUTINACIONES
Código: PARATIFI_B

Descripción: SALMONELLA PARATIFICA B AGLUTINACIONES
Técnica: Aglutinación
Unidades: Titulo
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: SALMONELLA PARATIFICA A AGLUTINACIONES
Código: PARATIFI_A
Técnica: Aglutinación
Unidades: Titulo
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia:

Descripción: SALMONELLA TIPHY H AGLUTINACIONES
Código: TIFICA_H
Técnica: Aglutinación
Unidades: Titulo
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: SALMONELLA TIPHY O AGLUTINACIONES
Código: TIFICA_O
Técnica: Aglutinación
Unidades: Titulo
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: Sandhoff, enfermedad de. Sec Gen: HEXB
Código: GEN_000680
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SANGRE EN ORINA
Código: SANGRE
Técnica:
Unidades: /µL
Plazo: 3 días
Tubo: Orina basal

Descripción: SANGRE EN ORINA
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: SARAMPION AC. IgG EN L.C.R
Código: SARAMGLC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: SARAMPION AC. IGG SUERO
Código: SARAMACG
Técnica: CLIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
En el ensayo puede emplearse suero o plasma humanos. Las pruebas realizadas confirman que es posible utilizar EDTA potásico y heparina sódica como anticoagulantes.
Valores de referencia: (Inf. 13.5) Negativo
(13.6 - 16.4) Indeterminado
(Sup. 16.5) Positivo

Descripción: SARAMPION AC. IgM EN L.C.R
Código: SARAMMLC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquido Bioquímica
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: SARAMPION AC. IGM SUERO
Código: SARAMACM
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero
Las pruebas realizadas confirman que es posible utilizar EDTA potásico,heparina, citrato sódico como anticoagulantes.
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: Sarcoidosis de aparición temprana. Sec Gen: NOD2
Código: GEN_000681
Técnica:

Descripción: Sarcoidosis de aparición temprana. Sec Gen: NOD2
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SARCOMA DE EWING'S. Mutaciones y fusiones
Código: NGS_EWINS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: SARCOMAS. Somáticos. Mutaciones
Código: NGS_SARCS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: SCC EN LIQUIDO PLEURAL (AG. CARCINOMA DE CEL. ESCAMOSAS)
Código: SCCLIQPL
Técnica: Inmunoluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL de Líquido Pleural
Valores de referencia: (Inf. 2.5)

Descripción: SCC (ANTÍGENO ASOCIADO AL CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS)
Código: SCC
Técnica: Inmunoluminiscencia (hasta 2011 Enzimoinmunoanálisis)
Unidades: ng/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (Inf. 2.5)

Descripción: SCHISTOSOMA (BILHARZIOSIS) EN ORINA
Código: SCHISTORIN
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo:

Descripción: SCHISTOSOMA (BILHARZIOSIS) EN ORINA
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: SCHISTOSOMA , DNA PCR
Código: SCHISTOPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA), (haematobium orina), (mansoni heces refrigeradas).También puede hacerse con muestra parafinada (bloc o al menos de 10 a 15 cortes). En LCR sospecha clínica esquistosomiasis espinal.
Valores de referencia:

Descripción: SCHISTOSOMA SP. AC. (BILHARZIOSIS)
Código: SCHISTOSOM
Técnica: Hemaglutinación indirecta
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: =< 1/80 Negativo < 1/80
=> 1/80 Positivo > ó = 1/80

Descripción: Scl-70 AC. SUERO (TOPOISOMERASA I)
Código: SCL70AC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: Screening adicional a PGT embrion 1
Código: PGTSRAD1EM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: MPX
Descripción: SCREENING HIV, VHC Y VHB POR RT-PCR
Técnica:
Comentario adicional: CONDICIONES DEL ENVIO DE LA MUESTRA:
2 TUBOS DE EDTA IDENTIFICADOS COMO "MPX"
EL ENVIO DEBERÁ REALIZARSE (FUERA DE MADRID) LUNES, MARTES O MIERCOLES.
METER LOS TUBOS EN UN SOBRE A LA ATENCION DE ENVIOS EXTERNOS
NOTIFICAR A ENVIOSEXTERNOS@MEGALAB.ES DEL DIA DEL ENVIO DE DICHA MUESTRA.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HIVMPX		HIV EN MPX TEST		
Prueba	HVBMPX		HVB EN MPX TEST		
Prueba	HVCMPX		HVC EN MPX TEST		

Descripción: SCREENING NEUMOALERGENOS INFANTIL
Código: PHADIAINFA
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: kU/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia:

Descripción: Sd hiperornitinemia-hiperamonemia-homocitrulinuria. SLC25A15
Código: GEN_000701
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. ectrodactilia-Aplasia Tibial. Sec Gen: BHLHA9
Código: GEN_000695
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. espasmo infantil ligado al cr. X. Sec Gen: ARX
Código: GEN_000697
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. espasmo infantil ligado al cr. X. Sec Gen: CDKL5
Código: GEN_000696
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Sd. espasmo infantil ligado al cr. X. Sec Gen: CDKL5
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. espasmo infantil ligado al X. Panel NGS
Código: GEN_000698
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. Hiper-IgM ligado al X. Sec Gen: CD40LG
Código: GEN_000700
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. hipoplasia y aplasia pelvis focomegalia Schinzel. WNT7A
Código: GEN_000702
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. insensibilidad a andrógenos. Sec Gen: AR.
Código: GEN_000704
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. Malformac. capilar-arteriovenosa. Sec Gen: RASA1
Código: GEN_000709
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. nodo enfermo. Panel NGS
Código: GEN_000716
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. prematuridad e ictiosis. Sec Gen: SLC27A4
Código: GEN_000710
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. radio ausente y trombocitopenia. Sec Gen: RBM8A
Código: GEN_000711
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.cardiofaciocutáneo. Panel NGS
Código: GEN_000690
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.cardiofaciocutáneo. Sec Gen: BRAF
Código: GEN_000691
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.cuerno occipital. Sec Gen: ATP7A
Código: GEN_000715
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Sd.cuerno occipital. Sec Gen: ATP7A
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.hemolítico urémico atípico. Panel NGS
Código: GEN_000717
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.l carcinoma basocelular nevoide. Sec Gen: PTCH1
Código: GEN_000714
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.LIG4. Sec Gen: LIG4
Código: GEN_000719
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.mano-pie-genital. Sec Gen: HOXA13
Código: GEN_000722
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.miasténico congénito. Panel NGS
Código: GEN_000723
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.nefrótico congénito tipo finlandés. Sec Gen: NPHS1
Código: GEN_000724
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.oral-facio-digital tipo 1. Sec Gen: OFD1
Código: GEN_000726
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.oto-facio-cervical. Sec Gen: PAX1
Código: GEN_000728
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.oto-palato-digital. Gen: FLNA. MLPA
Código: GEN_000727
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.papilo-renal. Sec Gen: PAX2
Código: GEN_000729
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.periódicos asocia. a la criopirina. Sec Gen: NLRP3
Código: GEN_000732
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Sd.periódicos asocia. a la criopirina. Sec Gen: NLRP3
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.por déficit de creatina. Panel NGS
Código: GEN_000733
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.tricorrinofalángico. Sec Gen: TRPS1
Código: GEN_000730
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.Uña-rótula. Sec Gen: LMX1B
Código: GEN_000705
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sec. gen ERBB2 (HER2) (PCR exones 8, 17, 19, 20, 21)
Código: ERBB2_SOMA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: tejido parafiando. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Sec. gen H3 (NGS). Somático
Código: H3_SOMAT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Sec. gen NOTCH1 (NGS). Somático
Código: NOTCH1_SOM
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tejido tumoral en cortes de parafina (se analizarán extensiones de la muestra para seleccionar el bloque adecuado).
Sangre EDTA para confirmar la existencia de mutaciones en línea germinal.

ST_TT: Sangre total + tejido tumoral
Informe médico imprescindible
Valores de referencia:

Descripción: Sec. gen POLE (NGS). Somático
Código: POLE_SOMAT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Sec. gen SF3B1 (NGS)
Código: GEN_SF3B1
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO,.
IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA
Valores de referencia:

Descripción: Sec. gen TERT (NGS). Somático
Código: TERT_SOMAT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado.Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Sec. gen: RET (NGS). Somático
Código: RET_SOMAT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 1 amplicón
Código: AMPLICON1
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 2 amplicones
Código: AMPLICON2
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación gen CRC1 (NGS)
Código: CRC1_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación gen GLMN (NGS)
Código: GLMN_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación Sanger a partir de oligos
Código: OLI_SANGER
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Nos mandan producto de PCR con los primers para confirmar mutaciones de NGS
Valores de referencia:

Descripción: SELENIO EN ORINA
Código: SE2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L

Descripción:	SELENIO EN ORINA
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 ml de orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 40) Individuos no expuestos

Descripción:	Selenio en suero
Código:	SE
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Utilizar contenedor libre de metales
Valores de referencia:	(63.2 - 158) > 15 años (55.3 - 134.3) 4 años - 15 años (39.5 - 102.7) 2 años - 4 años (15.8 - 71.1) < 2 años

Descripción:	Senior-Loken, Sd. Panel NGS
Código:	GEN_000682
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Sensibildad a los ultravioleta. Sec Gen: ERCC4
Código:	GEN_000683
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SENSIBILIDAD A 132 ALIMENTOS
Código:	SENSI132
Técnica:	Microarray
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	SENSIBILIDAD A 155 ALIMENTOS OVO-LACTO-VEGETARIANA
Código:	SENSI150
Técnica:	Microarray
Unidades:	
Plazo:	10 días

Descripción: SENSIBILIDAD A 155 ALIMENTOS OVO-LACTO-VEGETARIANA
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: SENSIBILIDAD A 204 ALIMENTOS
Código: SENSI200
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 tubo de suero
Valores de referencia:

Descripción: SENSIBILIDAD ALIMENTARIA A ADITIVOS
Código: SENADITIVO
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: SENSIBILIDAD ALIMENTOS BÁSICO 88 ALIMENTOS
Código: SEN.ALIMEN
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Serotonina (5-hidroxitriptamina) en suero
Código: SEROTO
Técnica: HPLC-Detección Electroquímica
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 mL suero, separar y enviar congelado. Es estable 48 h refrigerada.
Valores de referencia: (50.00 - 200.00)

Descripción: SEROTONINA EN PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Código: SEROTOPLAQ
Técnica:
Unidades: ng/10^9 plaq
Plazo: 5 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: EDTA (SE PUEDE CENTRIFUGAR EN EL LABORATORIO DE DESTINO)

2 mL de plasma de EDTA.(centrifugar la sangre anticoagulada con EDTA durante 10 minutos a 275g o 10 minutos a 1875 rpm) . EVITAR CONGELACION DE LA MUESTRA

Descripción:	SEROTONINA EN PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Valores de referencia:	(500 - 950)

Descripción:	SEROTONINA ORINA (5-HIDROXITRIPTAMINA)
Código:	SEROTO2
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	mcg/24 h
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL de orina de 24h con 0.1 ml de ác. clorhídrico conc. Indicar volumen total.
Valores de referencia:	(50 - 250)

Descripción:	SERTRALINA SUERO
Código:	SERTRALI
Técnica:	HPLC
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL suero.
Valores de referencia:	(10 - 150)

Descripción:	SHBG (Sex hormone binding globulin)
Código:	SHBG
Técnica:	CMIA
Unidades:	nmol/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero/alternativo Heparina NO UTILIZAR PLASMA EDTA
Valores de referencia:	(13.5 - 71.14) Hombre > 14 años (19.8 - 155.2) Mujer > 14 años (26.4 - 118) Mujer > 50 años Postmenopausia

Descripción:	Sialidosis. Sec Gen: NEU1
Código:	GEN_000684
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SIALOTRANSFERRINA ISOFORMAS EN SUERO
Código:	SIALOTRF
Técnica:	Electroforesis capilar
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Evitar muestra de plasma
Valores de referencia:	

Descripción: Sialuria. Sec Gen: GNE
Código: GEN_000685
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Silicio, plasma
Código: SILICIO
Técnica: ICP-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Plasma EDTA Refrigerado
Comentario adicional: 1mL de plasma de EDTA refrigerado.
Valores de referencia: (200 - 500)

Descripción: Simpson-Golabi-Behmel, Sd. Sec Gen: GPC3
Código: GEN_000686
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SINAPTOFISINA AC.
Código: SINAPTOFIS
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 33 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: = Se consideran niveles significativos a partir de título 1:10

Descripción: Sindactilia tipo 2. Sec Gen: FBLN1
Código: GEN_000687
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndr, mieloprol.: gen MPL mutación W515L/K (PCR-HRM)
Código: MPL_W515LK
Técnica: PCR y Secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Síndr, mieloprol.: gen MPL mutación W515L/K (PCR-HRM)
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:

Descripción: Síndr. Blefarofimosis, Ptosis, y Epicantus: gen FOXL2 (NGS)
Código: FOXL2_MUT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndr. feocromocitoma paragang. heredit.: >10 genes (NGS)
Código: SDH_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndr. feocromocitoma paraganglioma heredit.: gen SDHB (NGS)
Código: SDHB_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndr. feocromocitoma paraganglioma heredit.: gen SDHD (NGS)
Código: SDHD_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndr. mieloprol.: gen JAK2 mutación V617F (qPCR)
Código: JAK2_V617F
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días

Descripción: Síndr. mieloprol.: gen JAK2 mutación V617F (qPCR)
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Sindr. Rubinstein-Taybi: genes CREBBP y EP300 (NGS)
Código: RUBI_TAYBI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Alport: gen COL4A5 (NGS)
Código: ALPORT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Alström: gen ALMS1 (NGS)
Código: ALMS1_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Angelman: test de metilación y MLPA gen SNRPN
Código: ANGELMAN
Técnica: PCR y MLPA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Apert: gen FGFR2 (NGS)
Código: APERT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:

Descripción: Síndrome de Apert: gen FGFR2 (NGS)
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Bartter 3: gen CLCNKB (NGS)
Código: BARTTER_3
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Bartter 4A: gen BSND (NGS)
Código: BARTTER_4A
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Beals: gen FBN2 (NGS)
Código: BEALS_FBN2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Beckwith-Wiedemann: región 11p15 por MLPA
Código: BECKWITH_W
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Birt-Hogg-Dube: gen FLCN (NGS)
Código: BIRTHOGGDU
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:

Descripción: Síndrome de Birt-Hogg-Dube: gen FLCN (NGS)
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Brugada: >10 genes (NGS)
Código: S_BRUGADA
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Candle: gen PSMB8 (NGS)
Código: PSMB8_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Charge: gen CHD7 (NGS)
Código: CHARGE_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Cowden: gen PTEN (NGS)
Código: PTEN_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Gitelman: gen SLC12A3 (NGS)
Código: S_GITELMAN
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:

Descripción: Síndrome de Gitelman: gen SLC12A3 (NGS)
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Gorlin: genes PTCH1, PTCH2 y SUFU (NGS)
Código: GORLIN_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Hajdu-Cheney (acro-osteloisis): gen NOTCH2 (NGS)
Código: HAJDU_CHEN
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Kallmann: > 10 genes (NGS)
Código: KALLMANN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Legius: gen SPRED1 (NGS)
Código: SPRED1_MUT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Leigh: <10 genes (NGS)
Código: SIND_LEIGH
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Síndrome de Leigh: <10 genes (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Loeys-Dietz: sec. <10 genes (NGS)
Código: LOEYSDIETZ
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Marfan: gen FBN1 (NGS)
Código: MARFAN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Morquio: gen GALNS (NGS)
Código: MORQUIO
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM.
Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Noonan: gen PTPN11 (NGS)
Código: PTPN11_MUT
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Peutz-Jeghers: gen STK11 (NGS)
Código: PEUTZ_JEGH
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Síndrome de Peutz-Jeghers: gen STK11 (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Prader-Willi: test metilación y MLPA gen SNRPN
Código: PRADER.W
Técnica: PCR y MLPA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Rett: gen MECP2 (NGS)
Código: RETT_PCR
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Shwachman-Diamond: gen SBDS (NGS)
Código: SBDS_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Silver-Russell: análisis MS-MLPA
Código: SILVER_RUS
Técnica: PCR y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Sotos: gen NSD1 (NGS)
Código: SOTOS_NSD1
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Síndrome de Sotos: gen NSD1 (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Stickler: <10 genes (NGS)
Código: STICKLER
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Usher: >10 genes (NGS)
Código: SIND_USHER
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Waardenburg: <10 genes (NGS)
Código: WAARDENBUR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sindrome de Williams: micodeleción región WBSCR por MLPA
Código: WILLIAMS
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Sindrome Hipoventilacion Central: gen PHOX2B (NGS)
Código: PHOX2B
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Sindrome Hipoventilacion Central: gen PHOX2B (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome nefrótico 2: gen NPHS2 (NGS)
Código: NPFS2_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome Opitz Gbb: <10 genes (NGS)
Código: OPITZ_GBB
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome X Fragil
Código: XFRAGPCR
Técnica: PCR, BSFT-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas:Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndromes autoinflamatorios. Panel NGS
Código: GEN_000731
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndromes de deleción 22q11.2 (MLPA)
Código: DEL_22Q11
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Síndromes de deleción 22q11.2 (MLPA)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndromes de miastenia congénita: >10 genes (NGS)
Código: MIASTENIA
Técnica: NGS TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM.
Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sindromes febriles recurrentes hereditarios: >10 genes (NGS)
Código: F_RECURREN
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: 2 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubos primarios sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulados con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Sinfalangismo proximal. Sec Gen: NOG
Código: GEN_000734
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SIROLIMUS EN SANGRE
Código: SIROLIMUS
Técnica: Cromatografía líquida/ Tándem masas
Unidades: ng/mL
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia: (4 - 20)

Descripción: Sitosterolemia. Panel NGS
Código: GEN_000735
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sjogren-Larsson, Sd. Sec Gen: ALDH3A2
Código: GEN_000736
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SMIT AC. SUERO (ANTI-SM)
Código: SMITAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: Smith-Lemli-Opitz. Def. 7-deshidrocolesterol reductas. DHCR7
Código: GEN_000737
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sobrecrecimiento. Panel NGS
Código: GEN_000738
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SODIO
Código: NA
Técnica:
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (135 - 147)

Descripción: SODIO ORINA
Código: NA2
Técnica: Potenciometría directa
Unidades: mmol/24h
Plazo: 3 días

Descripción:	SODIO ORINA
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL de orina de 24 horas
Valores de referencia:	(80 - 260)

Descripción:	SOMATOSTATINA
Código:	SOMATOST
Técnica:	RIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	2 mL plasma-EDTA congelado
Valores de referencia:	(17 - 81)

Descripción:	Sordera con aplasia de laberinto, microtia microdoncia. FGF3
Código:	GEN_000739
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SRP (SIGNAL RECOGNITION PARTICLE) AC. SUERO
Código:	SRPAC
Técnica:	Técnica Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	= Negativo

Descripción:	SS-A AC. SUERO (RO)
Código:	SSAAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	= Negativo

Descripción:	SSA-52 AC. SUERO (RO52)
Código:	RO52
Técnica:	INMUNOBLOT
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	=NEGATIVO

Descripción:	SS-B AC. SUERO (LA)
Código:	SSBAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	= Negativo

Descripción:	SS-DNA AC. SUERO CADENA SENCILLA
Código:	SSDNAAC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 15) Negativo (15.00 - 21.00) Indeterminado (Sup. 21) Positivo

Descripción:	Stargardt tipo 4, enfermedad de. Sec Gen: PROM1
Código:	GEN_000741
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Stargardt, enfermedad de. Panel NGS
Código:	GEN_000742
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	STHAPYLOCOCUS AUREUS METICILIN-RESISTENTE
Código:	METICIRES
Técnica:	Cultivo
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	STIL/TAL1 gen de fusión: detección y cuantificación (EMR)
Código:	STIL_TAL1
Técnica:	

Descripción: STIL/TAL1 gen de fusión: detección y cuantificación (EMR)
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Streptococcus pneumoniae DNA PCR en LCR
Código: STNELCRPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 2 ml LCR
Valores de referencia:

Descripción: Streptococcus pneumoniae DNA PCR en Sangre
Código: STREPNEPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 2 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: STREPTOCOCO A ANTÍGENO (TEST DIRECTO)
Código: STREP.A.AG
Técnica: Inmunocromatográfica
Unidades:
Plazo: 1 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: STREPTOCOCO PNEUMONIAE AC.IGG POLISACÁRIDO CAPSULAR EN SUERO
Código: PNEUMOAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: STRONGYLOIDES STERCOLARIS ANTICUERPOS
Código: STRONGYLOI
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Indice
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: STRONGYLOIDES STERCOLARIS ANTICUERPOS

Comentario adicional: 1 mL suero.
Alternativa: palsma citrato o heparina

Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado
(Sup. 11) Positivo

Código: IGA1Y2

Descripción: SUBCLASE 1 Y 2 DE LA INMUNOGLOBULINA A

Técnica: Turbidimetría

Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	IGA1		IGA SUBCLASE 1 SUERO	mg/dL	(76.08 - 328.20)
Prueba	IGA2		IGA SUBCLASE 2 SUERO	mg/dL	(6.89 - 114.25)

Código: IGGSUB

Descripción: SUBCLASES DE IGG (téc. Turbidimetría)

Técnica: Turbidimetría

Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	IGG1		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 1 SUERO	mg/dL	(194 - 842) < 2 años (315 - 945) 2 años - 4 años (306 - 945) 4 años - 6 años (288 - 918) 6 años - 8 años (432 - 1020) 8 años - 10 años (423 - 1060) 10 años - 12 años (342 - 1150) 12 años - 14 años (315 - 855) 14 años - 18 años (382.4 - 928.6) > 18 años
Prueba	IGG2		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 2 SUERO	mg/dL	(22.5 - 300) < 2 años (36 - 225) 2 años - 4 años (60.5 - 345) 4 años - 6 años (44 - 375) 6 años - 8 años (72 - 430) 8 años - 10 años (76 - 355) 10 años - 12 años (100 - 455) 12 años - 14 años (64 - 495) 14 años - 18 años (241.8 - 700.3) > 18 años
Prueba	IGG3		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 3 SUERO	mg/dL	(18.6 - 85.3) < 2 años (17.3 - 67.6) 2 años - 4 años (9.9 - 122.1) 4 años - 6 años (15.5 - 85.3) 6 años - 8 años (12.7 - 85.3) 8 años - 10 años (17.3 - 173) 10 años - 12 años (28.3 - 125) 12 años - 14 años (23 - 196) 14 años - 18 años (21.8 - 176.6) > 18 años

Componentes					
Prueba	IGG4		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 4 SUERO	mg/dL	(0.5 - 78.4) < 2 años (1 - 53.7) 2 años - 4 años (1.8 - 112.5) 4 años - 6 años (0.4 - 99.2) 6 años - 8 años (1.9 - 93.2) 8 años - 10 años (1.6 - 115) 10 años - 12 años (3.7 - 136.0) 12 años - 14 años (11 - 157) 14 años - 18 años (3.92 - 86.4) > 18 años

Descripción: Substancia P en plasma (Sustancia)
Código: SUBSTANP
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 25 días
Tubo: Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional: Tubos especiales 2 ml plasma-EDTA con aprotinina (TRASYLOL).

Recoger 5 mL de sangre total en un tubo vacutainer frío de EDTA K3 con 250 KIU de Trasylol (Aprotinina).
Enfriar el tubo con la sangre recien extraída en un baño de hielo durante 10 minutos.
Separar el plasma por centrifugación a 4ºC.
El plasma debe congelarse en un plazo máximo de 1 hora y conservarse congelado hasta que sea analizado.

Valores de referencia: (799 - 4764)

Descripción: SUBUNIDAD ÁCIDA LÁBIL (ALS)
Código: ALS
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: mcg/mL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Alternativa plasma (EDTA/HEPARINA)
Valores de referencia:
(0.3 - 9.3) < 2 años
(1.9 - 10.5) 2 años - 6 años
(2.3 - 13.0) 6 años - 10 años
(4.2 - 14.0) 10 años - 14 años
(5.6 - 14.5) 14 años - 16 años
(7.7 - 20.4) > 16 años

Descripción: SUBUNIDAD ALFA LIBRE SUERO
Código: SUBALFALI
Técnica: RIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero CONGELADO
Valores de referencia:
(0.11 - 0.34) Hombre
(0.11 - 0.34) Mujer Premenopausia
(0.22 - 0.97) Mujer Menopausia

Descripción: SUCCINILACETONA
Código: SUCCINACE
Técnica: GC-MS

Descripción:	SUCCINILACETONA
Unidades:	mg/L
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	3 ml suero, congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(Inf. 0.05)

Descripción:	SUCCINIL-ACETONA EN ORINA
Código:	SUCCINACE2
Técnica:	Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	10 mL de orina (micción aislada). Congelar y enviar congelada.
Valores de referencia:	(Inf. 1.40)

Descripción:	SULPIRIDE SUERO
Código:	SULPIRIDE
Técnica:	Cromatografía líquda/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	(50 - 750)

Descripción:	Sultiam en suero
Código:	SULTIAM
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/l
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL de suero. Alt. 1 mL Plasma EDTA Tripotásico (Refrigerado)
Valores de referencia:	(0.5 - 12.5) Rango Terapéutico.

Descripción:	Superactividad fosforribosilpirofosfato sintetasa. PRPS1
Código:	GEN_000743
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Superoxido Dismutasa
Código:	SOD
Técnica:	Espectrofotometría de absorción molecular
Unidades:	U/mg prot.
Plazo:	33 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia

Descripción: Superoxido Dismutasa
Comentario adicional: 3 mL sangre total EDTA
Alt. 3 mL sangre total Heparina litio
Valores de referencia: (6.83 - 7.67) 1 año - 15 años
(6.10 - 7.44) 15 años - 31 años
(5.38 - 6.40) 31 años - 60 años
(4.11 - 5.35) > 60 años

Descripción: T. genetico nutricion y metabolismo
Código: NUTRIGEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Se envia el EDTABM junto con la hoja de solicitud
Valores de referencia:

Descripción: T. genetico origen ancestros
Código: ANCESTROS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Se envia el EDTABM jnto con la hoja de solicitud
Valores de referencia:

Descripción: T. genetico predisposicion rendimiento deportivo
Código: DEPORGEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Se envia el EDTABM junto con la hoja de solicitud
Valores de referencia:

Descripción: T. genetico tratamiento facial y cosmetico
Código: DERMAGEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Se envia el EDTABM junto con la hoja de solicitud
Valores de referencia:

Descripción: T3
Código: T3
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: T3
Comentario adicional: Suero. alternativa plasma de EDTA y plasma de hepatina sodio, y litio
Valores de referencia: (0.35 - 1.93)

Descripción: T3 (TRIYODOTIRONINA) AC. SUERO
Código: AC.TRIYODO
Técnica: Radioisotópica
Unidades: % p.f.
Plazo: 22 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(Sup. 10) Positivo

Descripción: T3 CAPTACION SUERO (INDICE TBC)
Código: T3U
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.81 - 1.19) Índice THBR
(24 - 35) % Captación

Descripción: T3 LIBRE SUERO (TRIYODOTIRONINA LIBRE)
Código: FT3
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Alternativa: heparina de sodio, heparina de litio y Edta potásico.
Valores de referencia: (1.58 - 3.91)

Descripción: T3 reverse (RT3) en suero
Código: RT3
Técnica: Téc. RIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (1.09 - 1.93) S. de cordón
(1 - 1.7) Recién nacidos
(0.1 - 0.35) Adultos

Descripción: T4
Código: T4
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: µg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: T4
Comentario adicional:
Valores de referencia: (4.87 - 11.72)

Descripción: T4 (TIROXINA) AC. SUERO
Código: AC.TIROXIN
Técnica: Radioisotópica
Unidades: % p.f.
Plazo: 21 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(Sup. 10) Positivo

Descripción: T4 LIBRE (TIROXINA LIBRE)
Código: FT4.
Técnica:
Unidades: ng/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.70 - 1.48)

Descripción: T4/TBG indice en suero
Código: T4_TBG
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: Indice
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: (4.00 - 8.00) Hombre
(3.90 - 6.30) Mujer

Descripción: TACROLIMUS
Código: TACROLIMUS
Técnica: Enzimoinmunoanálisis de micropartículas
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (5 - 20)

Descripción: TAENIA SOLIUM AC .IGG SUERO (CISTICERCOSIS)
Código: CISTICERAC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero refrigerado.
Alternativa: plasma de citrato o heparina

Descripción: TAENIA SOLIUM AC .IGG SUERO (CISTICERCOSIS)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado

Descripción: TAENIA SOLIUM CONFIRMACION E IDENTIFICACION AC.CISTICERCOSIS
Código: CISTICCONF
Técnica: Immunoblot
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: =Negativo

Descripción: TAENIA SOLIUM POR PCR
Código: TAENIAPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 2 mL sangre total EDTA, LCR, heces.
Valores de referencia:

Descripción: Talasemia beta: gen HBB (sec. Sanger)
Código: BTALA_SEC
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Talasemia beta-delta: sec y MLPA HBB, HBG1 y HBG2
Código: BDTALA_SEC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Talasemina alfa: deleciones en HBA1 y HBA2 gen alfa-globina
Código: ATALA_PCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Descripción: Talasemina alfa: deleciones en HBA1 y HBA2 gen alfa-globina
Valores de referencia:

Descripción: Talasemina alfa: gen alfa-globina HBA1 y HBA2 (sec. Sanger)
Código: ATALA_SEC
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: TALIO EN ORINA
Código: TALIO2
Técnica: Espectrometía de Masas-Plasma acoplado Inductivamente
Unidades: mcg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aisla)
Valores de referencia:

Descripción: TALIO SANGRE TOTAL
Código: TALIOSAN
Técnica: ICP-MS
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 mL sangre total-EDTA
Valores de referencia:

Descripción: Talla baja. Panel NGS
Código: GEN_000744
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TANIA SOLIUM AC.IGG EN LCR (CISTICERCOSIS)
Código: CISTICELCR
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1mL LCR
Valores de referencia: (Sup. 1) Positivo

Descripción: Taquicardia ventricular catecol.: <10 genes (NGS)
Código: TAQ_VENTRI

Descripción: Taquicardia ventricular catecol.: <10 genes (NGS)
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica. CASQ2
Código: GEN_000745
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TAU FOSFORILADA LCR
Código: TAUFOSFO
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 13 días
Tubo: Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional: 1mL de LCR en tubo de polipropileno congelado. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia: (21.5 - 59.0)

Descripción: TBARS (SUSTANCIAS REACCIONAN AC. TIOBARBITURICO) EN PLASMA
Código: TBAR
Técnica:
Unidades: mcmol/L
Plazo: 18 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL Plasma EDTA Congelar la muestra inmediatamente.Enivar congelado
Valores de referencia: (Inf. 2.41)

Descripción: TBG SUERO (THYROXINE BINDING GLOBULIN)
Código: TBG
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: mcg/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (14 - 31)

Descripción: TCF3/PBX1 (E2A/PBX1) gen de fusión: detección y QT (EMR)
Código: TCF3_PBX1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días

Descripción: TCF3/PBX1 (E2A/PBX1) gen de fusión: detección y QT (EMR)
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: TEICOPLANINA
Código: TEICOPLANI
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades: mcg/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL
Valores de referencia: = 5.0-60.0 mcg/mL

Descripción: TELOPEPTIDO AMINOTERMINALES (N-TERMINAL, NTX) DE COLAGENO I
Código: TELOPEPI
Técnica: ICMA
Unidades: nmol/mmol Creat
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina. 2º micción matutina.
Valores de referencia: (21 - 83) Hombre
(17 - 94) Mujer Premenopáusicas
(26 - 124) Mujer Postmenopáusicas

Descripción: Temblor esencial hereditario tipo 4. Sec Gen: FUS
Código: GEN_000746
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TEOFILINA
Código: TEOFI
Técnica: Inmunoensayo
Unidades: µg/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (8.0 - 20) Asma
(6.0 - 11) Apnea neonatal

Descripción: TEOFILINA SALIVA (AMINOFILINA)
Código: TEOFISALIV
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: mcg/mL
Plazo: 5 días

Descripción: TEOFILINA SALIVA (AMINOFILINA)
Tubo: Saliva
Comentario adicional: 1 mL saliva
Valores de referencia: (6 - 12)

Descripción: Test de Aire Espirado SIBO LACTULOSA/LACTITOL
Código: H2SOBREBAC
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: TEST HIDROGENO Y METANO ESPIRADO SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO LACTULOSA/LACTITOL
Muestras de aire espirado a los tiempos establecidos
Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado, Valoracion del TRÁNSITO INTESTINAL
Código: H2TRANSITO
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos
Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Sobrecrecimiento Bacteriano GLUCOSA
Código: H2SOBREGLU
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Muestras de aire espirado a los tiempos establecidos
Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Intolerancia a la LACTOSA
Código: H2LACTOSA
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos
Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Intolerancia a la MALTOSA
Código: H2MALTOSA
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Kit especial. TEST DE AIRE ESPIRADO PARA INTOLERANCIA A MALTOSA.
Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos.

Descripción: Test de Aire Espirado: Intolerancia a la MALTOSA
Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Intolerancia a la SACAROSA
Código: H2SACAROSA
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Kit especial. TEST DE AIRE ESPIRADO PARA INTOLERANCIA A SACAROSA. Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos.
Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Intolerancia a la SORBITOL
Código: H2SORBITOL
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Kit especial. TEST DE AIRE ESPIRADO PARA INTOLERANCIA A SORBITOL. Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos.
Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Intolerancia a la XILOSA
Código: H2XILOSA
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Kit especial. TEST DE AIRE ESPIRADO PARA INTOLERANCIA A XILOSA. Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos.
Valores de referencia:

Descripción: TEST DE COOMBS DIRECTO
Código: COOMBSD
Técnica: Columna gel
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: TEST DE COOMBS INDIRECTO
Código: COOMBSI
Técnica: Columna gel
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción:	TEST DE DESGRANULACION DE BASOFILOS
Código:	TDBH
Técnica:	Observación Microscópica
Unidades:	% cel. desgr.
Plazo:	4 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	10 mL sangre total EDTA. Extracción tres semanas después de reacción alérgica. Aportar comprimido del fármaco a estudio.
Valores de referencia:	(Sup. 29) Positivo (Inf. 30) Negativo

Descripción:	TEST DE EMBARAZO ORINA
Código:	GRAVINDEX
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina Test embarazo
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	TEST DE GRAHAM
Código:	GRAHAM
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Cinta adhesiva transparente segun hoja de instrucciones
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de Hidrogeno y Metano Espirado: INTOLERANCIA AZUCARES
Código:	H2AZUCARES
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de inestabilidad de microsatélites
Código:	INEST_MICR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido tumoral y EDTA ROTULAR:ONCO Tejido parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	TEST DE PERMEABILIDAD INTESTINAL
Código:	PERMEABIL

Descripción: TEST DE PERMEABILIDAD INTESTINAL
Técnica:
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: PEDIR INSTRUCCIONES Y MATERIAL A ALMACEN
Valores de referencia:

Descripción: TEST DE SACAROSA
Código: SACAROSA
Técnica: Lisis celular
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 3 mL suero. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: =NEGATIVO

Descripción: TEST DE SAICAR (ADENILSUCCINATO LIASA)
Código: SAICAR.CAN
Técnica: Espectrometría de absorción molecular
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL de orina CONGELADA. puede usarse aislada o de 24 horas IMPRESCINDIBLE INFORME CLINICO
Valores de referencia:

Descripción: TEST DE SUDOR (CLORO)
Código: SUDOR
Técnica: Potenciometría
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: Sudor
Valores de referencia: (Inf. 40) Negativo

Descripción: Test myNewBorn: 397 enfermedades en neonato
Código: MYNEWBORN
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: TEST OWLIVER: DETECCION ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHOLICA
Código: OWLIVER
Técnica: LC-MS
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: TEST OWLIVER: DETECCION ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHOLICA
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: HARMONY
Descripción: TEST PRENATAL HARMONY
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HARMONSEXO		HARMONY TEST PRENATAL CON SEXO FETAL		
Prueba	HARMONMONX		HARMONY TEST PRENATAL CON MONOSOMÍA X		
Prueba	HARMONANEU		HARMONY TEST PRENATAL CON ANEUPLIODIAS SEXUALES		
Prueba	HARMOBASIC		HARMONY TEST PRENATAL (T21, T18, T13)		
Prueba	EDADGSEMAN		EDAD GESTACIONAL: SEMANAS (HARMONY)		
Prueba	EDADGDIAS		EDAD GESTACIONAL: DIAS (HARMONY)		
Prueba	FECUNHMY		TIPO DE FECUNDACIÓN (HARMONY)		
Prueba	EDADOVULOS		EDAD ÓVULOS: PROPIOS O DONANTE (HARMONY)		
Prueba	NFETOSHMY		NUMERO DE FETOS (HARMONY)		

Código: TRCOVIDAC
Descripción: TEST RÁPIDO COVID-19 ANTICUERPOS
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TRCOVIGG		COVID19 IGG (TEST RÁPIDO)		
Prueba	TRCOVIGM		COVID19 IGM (TEST RÁPIDO)		

Descripción: TEST RAPIDO DE MALARIA
Código: MALARIATES
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: TEST RÁPIDO PARA CRYPTOSPORIDIUM
Código: CRYPTOSAG
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:

Descripción: TEST RÁPIDO PARA CRYPTOSPORIDIUM
Plazo: 3 días
Tubo: Heces Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: TESTOSTERONA EN ORINA
Código: TESTOS2
Técnica: INMUNOLUMINISCENCIA
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 12 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 mL. Indicar volumen 24h. Se recomienda efectuar esta determinación en suero
Valores de referencia: (25 - 125) Hombre
(5 - 35) Mujer

Descripción: TESTOSTERONA LIBRE
Código: TESTOSLI
Técnica: CLIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (4.5 - 42) Hombre
(Inf. 9) Mujer

Descripción: TESTOSTERONA TOTAL
Código: TESTOS
Técnica: Inmunoquimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.47 - 9.80) Hombre 18 años - 50 años
(1.27 - 10.20) Hombre > 50 años
(Inf. 0.30) Hombre 7 años - 18 años Tanner I
(Inf. 2.82) Hombre 7 años - 18 años Tanner II
(0.086 - 6.81) Hombre 7 años - 18 años Tanner III
(0.18 - 7.85) Hombre 7 años - 18 años Tanner IV
(0.13 - 9.06) Hombre 7 años - 18 años Tanner V
(0.07 - 0.79) Mujer 18 años - 50 años
(0.08 - 0.37) Mujer > 50 años
(0.058 - 0.33) Mujer 7 años - 18 años Tanner I
(0.043 - 0.23) Mujer 7 años - 18 años Tanner II
(0.069 - 0.43) Mujer 7 años - 18 años Tanner III
(0.15 - 0.53) Mujer 7 años - 18 años Tanner IV
(0.15 - 1.02) Mujer 7 años - 18 años Tanner V

Descripción: Tetra-Amelia, Sd. Sec Gen: WNT3
Código: GEN_000747
Técnica:
Unidades:

Descripción: Tetra-Amelia, Sd. Sec Gen: WNT3
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Tetracloroetileno (Percloroetileno) en sangre
Código: PERCLOETIL
Técnica: Cromatografía de Gases-captura de electrones
Unidades: mg/L
Plazo: 11 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 3 ml de sangre total al principio de la última jornada de la semana laboral
Valores de referencia: (Inf. 0.4) Principio de última jornada de semana

---

Descripción: TETRAHIDROFURANO EN ORINA
Código: TETRAHFUR
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mg/L
Plazo: 11 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral.
Valores de referencia: (Inf. 2.0) Personas expuestas (Tetrahidrofurano); Final de la jornada

---

Descripción: TGF-BETA 1 PLASMA
Código: TGFBETA1
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 50 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL Plasma EDTA Tripotásico congelado
Valores de referencia: (1.40 - 8.20)

Descripción: TH/TO AC. SUERO
Código: TH.TOAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo
= Positivo

Descripción: TIAPRIDA SUERO
Código: TIAPRIDA
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades: µg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero

Descripción: TIAPRIDA SUERO
Valores de referencia: (1.0 - 2.0)

Código: PFA100
Descripción: TIEMPO DE OBTURACION
Técnica: Adhesión plaquetaria en flujo
Comentario adicional: ¡CITAR PRUEBA EN EL LABORATORIO!

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PFA100EPI		TIEMPO DE OBTURACION-EPINEFRINA	segundos	(84 - 160)
Prueba	PFA100ADP		TIEMPO DE OBTURACION-ADP	segundos	(68 - 121)

Descripción: TIEMPO DE PROTOMBINA CAPILAR
Código: TP.C
Técnica: Coagulación
Unidades: segundos
Plazo: 1 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: TREPTIL
Descripción: TIEMPO DE REPTILASE / INDICE
Técnica:
Comentario adicional: 1 ml plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.)Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TREPTIS		TIEMPO DE REPTILASE	sg	
Prueba	TREPTII		TIEMPO DE REPTILASE (INDICE)		(0.8 - 1.2)

Código: TROMBINA
Descripción: TIEMPO DE TROMBINA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TROMBHALLA		TIEMPO DE TROMBINA	segundos	(Inf. 21)
Prueba	TROMCONTRO		TIEMPO DE TROMBINA: TIEMPO CONTROL	segundos	

Descripción: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA
Código: TTP
Técnica:

Descripción: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA
Unidades: segundos
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (20 - 39)

Código: TTP.
Descripción: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA Y RATIO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TTP		TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA	segundos	(20 - 39)
Prueba	RATIO.TTP		RATIO TTP		(0.8 - 1.2)

Descripción: Timidin Quinasa en suero
Código: TIMIDINQUI
Técnica: Radioinmunoanálisis
Unidades: U/L
Plazo: 18 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Refrigerado.
Valores de referencia: (2.0 - 7.5)

Descripción: Timothy, Sd. Sec Gen: CACNA1C
Código: GEN_000748
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TINCION DE GRAM
Código: GRAM
Técnica: Observación microscópica
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Tinción Gram veterinaria
Código: GRAMVET
Técnica: Microscopía óptica
Unidades: _

Descripción: Tinción Gram veterinaria
Plazo: 3 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Tinción Ziehl-Neelsen veterinaria
Código: ZIEHLVET
Técnica: Microscopía óptica
Unidades: _
Plazo: 3 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: TIOCIANATO (METABOLITO DE ACETO-ACRILONITRILO)
Código: TIOCIANATO
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/L
Plazo: 12 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 20 mL orina micción aislada.
Valores de referencia: (Inf. 5.0) Personas no expuestas (no fumadores)
(Inf. 20) VLB exposición a ACETONITRILO
(Inf. 10) VLB exposición a ACRILONITRILO

Descripción: TIOLES TOTALES, SUERO
Código: TIOLES
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: µmol/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Alt: Plasma
Valores de referencia: (430 - 660)

Descripción: TIOPENTAL SUERO
Código: TIOPENTAL
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades: mcg/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero
Valores de referencia: (1 - 5) Hipnosia
(30 - 100) Coma terapéutico
(7 - 130) Anestesia

Descripción: TIOPURINA METIL-TRANSFERASA (Azatioprina)
Código: TPMT
Técnica: HPLC
Unidades: U/mL RBC

Descripción:	TIOPURINA METIL-TRANSFERASA (Azatioprina)
Plazo:	7 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	10 mL Sangre Total Heparina Litio. Alternativa: 10 mL Sangre Total EDTA Tripotásico. Evitar recogida vísperas de festivo.
Valores de referencia:	(Inf. 5.0) No administrar (5.1 - 13.7) 0.5 mg/kg/d de Azatioprina (13.8 - 18) 1.5 mg/kg/d de Azatioprina (18.1 - 26) 2.5 mg/kg/d de Azatioprina (26.1 - 40) 3 mg/kg/d de Azatioprina

Descripción:	TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA
Código:	TIPAJEC
Técnica:	Citometría de flujo
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	10 mL de sangre total EDTA
Valores de referencia:	

Descripción:	TIROGLOBULINA
Código:	TG
Técnica:	Téc. ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa plasma de EDTA K2 y EDTA Na2, Heparina de litio.
Valores de referencia:	(Inf. 2) Personas tiroidectomizadas

Descripción:	TIROGLOBULINA AC. SUERO
Código:	TIROGLOAC
Técnica:	Técnica CMIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 4.11)

Descripción:	TIROSINCINASA-1 SOLUBLE TIPO FMS (sFlt-1)
Código:	SFLT1
Técnica:	Técnica ECLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero refrigerado 48h, sino suero congelado

Descripción: TIROSINCINASA-1 SOLUBLE TIPO FMS (sFlt-1)

Valores de referencia:
(652 - 2501) Mujer 10-14 sem.gestación
(708 - 2807) Mujer 15-19 sem.gestación
(572 - 2997) Mujer 20-23 sem.gestación
(618 - 3205) Mujer 24-28 sem.gestación
(773 - 5165) Mujer 29-33 sem.gestación
(992 - 7363) Mujer 34-36 sem.gestación
(1533 - 9184) Mujer 37 sem.gestación-parto

Descripción: Tirosinemia. Panel NGS

Código: GEN_000749

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: TITANIO SUERO

Código: TITANIO

Técnica: Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente

Unidades: mcg/L

Plazo: 9 días

Tubo: Tubo Especial

Comentario adicional: Extraer sangre directamente en tubo de alícuota, separar el suero lo antes posible, y trasvasar suero sobre otro tubo de alícuota. No usar activador de la coagulación, ni tapones de goma

Valores de referencia: (Inf. 7.5)

Descripción: TOBRAMICINA

Código: TOBRA

Técnica: Inmunoanálisis

Unidades: mcg/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:
(5 - 10) Pico
(Sup. 10) Pico - TOXICIDAD
(1 - 2) Valle
(Sup. 2) Valle - TOXICIDAD

Descripción: TOLUENO EN SANGRE

Código: TOLUENO

Técnica: Téc. cromatografía de gases

Unidades: mg/L

Plazo: 9 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional: 2 mL sangre total EDTA, al principio de la última jornada laboral

Valores de referencia: (Inf. 0.05) VLB principio última jornada semanal

---

Descripción: TOPIRAMATO EN SUERO

Código: TOPIRAMATO

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: mg/L

Descripción: TOPIRAMATO EN SUERO
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 3 mL de suero CONGELADO
Valores de referencia: (2 - 8)

Descripción: Tortuosidad arterial, Sd. Sec Gen: SLC2A10
Código: GEN_000750
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Townes-Brocks, Sd. Sec Gen: SALL1
Código: GEN_000751
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TOXINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN HECES
Código: TOXICLOS
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heces Microbiología
Comentario adicional: 5 mL de haces, congelado
Valores de referencia:

Descripción: TOXINA TETANICA AC. IGG SUERO
Código: TETANOSACG
Técnica: Técnica EIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (0.01 - 0.1) Protección insegura
(0.1 - 0.5) Protección segura. Corto plazo
(0.5 - 5.0) Protección segura. Largo plazo

Descripción: TOXOCARA CANIS AC. IGG SUERO
Código: TOXOCIGG
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: TOXOCARA CANIS AC. IGG SUERO
Comentario adicional: 1 ml suero. Alternativo 1 ml de plasma de citrato sódico, y de heparina Litio.
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IgA
Código: TOXOACA
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Alternativo 1mL plasma EDTA
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGG
Código: TOXOACG
Técnica: CLIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.59) Negativo
(1.6 - 2.99) Indeterminado

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGG CONFIRMACION SUERO
Código: TOXOACGCON
Técnica: IMMUNOBLOT
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia:

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGG EN LCR
Código: TOXOGLC
Técnica: FLUOROENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: UI/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Se recomienda realizar análisis simultáneo en suero y LCR.
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGM
Código: TOXOACM
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGM
Valores de referencia: (Inf. 0.50) Negativo
(0.51 - 0.59) Indeterminado

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGM CONFIRMACION SUERO
Código: TOXOACMCON
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGM EN LCR
Código: TOXOMLC
Técnica: Fluoroenzimoinmunoanálisis (ELFA)
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 0.5 mL LCR.
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AVIDEZ AC. IGG
Código: AVIDEZTOXO
Técnica: Técnica CLIA (Enzimoinmunoanalisis quimioluminiscente)
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 50) Baja Avidez.Valorar en el contexto clinico y con resto de marcadores serológicos
(50 - 59.9) Avidez indeterminada
(Sup. 60) Alta Avidez. Compatible con infección pasada por Toxoplasma gondii, adquirida hace más de 4 meses

---

Descripción: TOXOPLASMA GONDII DNA MUESTRA BIOLÓGICA
Código: TOXOPCR
Técnica: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo de EDTA, liquido amniotico (5-8 mL), LCR. Refrigerar muestra durante el transporte.
Valores de referencia:

Descripción: TPA SUERO (ANTIGENO POLIPEPTIDICO TISULAR)
Código: TPA
Técnica: Quimioluminiscencia
Unidades: U/L
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL de suero sin hemólisis

Descripción: TPA SUERO (ANTIGENO POLIPEPTIDICO TISULAR)
Valores de referencia: (Inf. 75)

Descripción: TPHA LCR (TREPONEMA PALLIDUM AC HEMAGLUTINACION)
Código: TPHALCR
Técnica: Hemaglutinación Indirecta
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: = <1/80Negativo
= >1/80Positivo

Descripción: TPHA SUERO (TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS HEMAGLUTINACION)
Código: TPHA
Técnica: Hemaglutinación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = <1/80 Negativo
= >1/80 Positivo

Descripción: TPS (Antigeno Tisular Polipeptido Especifico)
Código: TPS
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia: (Inf. 80)

Descripción: Tr ANTICUERPOS LCR
Código: TRACLCR
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Tr. almacen ac siálico. Enf. Salla. Sec Gen: SLC17A5
Código: GEN_000754
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Tr.otopalatodigitales con FLNA. Sec Gen: FLNA
Código: GEN_000756
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TRAMADOL
Código: TRAMADOL
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL.
Valores de referencia: (100 - 800)

Descripción: TRANSAMINASA GOT (AST)
Código: GOT
Técnica:
Unidades: U/L a 37 ºC
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(8 - 50) Mujer 1 año - 14 años
(8 - 43) Mujer > 14 años
(8 - 60) Hombre 1 año - 14 años
(8 - 48) Hombre > 14 años

Descripción: TRANSAMINASA GPT (ALT)
Código: GPT
Técnica:
Unidades: U/L a 37 ºC
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(7 - 55) Hombre
(7 - 45) Mujer

Descripción: TRANSCORTINA EN SUERO
Código: TRANSCORT
Técnica: RIA
Unidades: µg/mL
Plazo: 22 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1mL SUERO. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:
(22.00 - 55.00) Hombre
(40.00 - 154.00) Mujer

Descripción:	TRANSFERRINA
Código:	TRANSF
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(206 - 381)

Descripción:	TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS
Código:	TRANSFDEF
Técnica:	Electroforésis capilar
Unidades:	%
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero refrigerado
Valores de referencia:	(Inf. 1.7) Normal (1.7 - 2.0) Indeterminado

Descripción:	TRANSGLUTAMINASA AC. IGA
Código:	TRANACIGA
Técnica:	CAP SYSTEM
Unidades:	U/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 6.9) Negativo (7 - 9.9) Indeterminado

Descripción:	TRANSGLUTAMINASA AC. IGG
Código:	TRANSGLIGG
Técnica:	CAP SYSTEM
Unidades:	U/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 6.9) Negativo (7 - 9.9) Indeterminado

Descripción:	Translocación t(14;16)(q32;q23). Gen de fusión IGH/MAF
Código:	MDFISH1416
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	5-20 ml sangre periférica. min 2 ml médula ósea. Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:	

Descripción: TRANSPORTADOR DE ZINC 8 ANTICUERPOS (ZNT8)
Código: TRANSZN8
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 16 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero, Refrigerado (no mandar tubo de 10mL)
Valores de referencia: (Inf. 15) Ausencia de Ac. anti-ZNT8

Código: TRANSKETOL
Descripción: TRANSQUETOLASA ERITROCITARIA
Técnica: Espectrofotometría.
Comentario adicional: 5 ml de sangre total (heparina). ENVIO INMEDIATO. EVITAR FIN DE SEMANA. Adjuntar asimismo recuento reticulocitos y/o 5ml de sangre (EDTA)
ENVIAR DE LUNES A MARTES.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TRANSKET		PERFIL TRANSQUETOLASA: TRANSQUETOLASA	UI/gHb	(0.3 - 0.8)
Prueba	TRANSKETPP		PERFIL TRANSQUETOLASA: TRANSQUETOLASA + TPP	UI/gHb	(0.3 - 0.9)
Prueba	EFECTOTPP		PERFIL TRANSQUETOLASA: EFECTO TPP	%	(3.7 - 19.1)

Descripción: Transtornos del ciclo de la urea. Panel NGS
Código: GEN_000752
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trastornos asociados a POLG: genes POLG1 y POLG2 (NGS)
Código: POLG
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trastornos de la coagulación. Panel NGS
Código: GEN_000753
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Trastornos de la coagulación. Panel NGS
Valores de referencia:

Descripción: Trastornos del desarrollo sexual. Panel NGS
Código: GEN_000755
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TRAZODONA EN SUERO
Código: TRAZODONA
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades: ng/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 ml suero
Valores de referencia: (800 - 1600)

Descripción: Treacher Collins, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000757
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGA SUERO
Código: TREPOACA
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: = <1:10 Negativo
= > o = 1:10 Positivo

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGG LCR
Código: TREPOACGLC
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS.
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL. Refrigerar durante el transporte.
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGG SUERO
Código: TREPOACG

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGG SUERO
Técnica: EIA
Unidades: Indice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.1) Indeterminado

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGM LCR
Código: TREPOACMLC
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR. Refrigerar durante el transporte.
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGM SUERO
Código: TREPOACM
Técnica: EIA
Unidades: Indice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.1) Indeterminado

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM IGM INMUNOBLOT
Código: TREPBLOTIM
Técnica: Inmunoblott.
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: TREPONEME PALLIDUM IGG IMMUNOBLOT SUERO
Código: TREPBLOTIG
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo:
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: THROMBOINC
Descripción: TRHOMBOINCODE
Técnica: Array
Comentario adicional: tubos en EDTA con el formulario y c.i.

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	THROMBPMF		THROMBOINCODE POLIMORFISMOS		
Prueba	THROMBRIES		THROMBOINCODE RIESGO		

Descripción: TRICHINELLA SPIRALIS AC. IGG SUERO (TRIQUINOSIS)
Código: TRIQUINAAC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero. Alternativo 1 ml de plasma de citrato sódico, y de heparina Litio.
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo

Descripción: TRICHOMONA
Código: TRICHOMONA
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo:
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Trichomonas DNA PCR
Código: TRICOMOPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 2 mL muestra genital(Torunda con medio de transporte, solicitar en Almacen)
Orina refrigerada.
Resto de muestras biologicas sin medio de transporte.
Valores de referencia:

Descripción: TRICLOROCOMPUESTOS TOTALES EN ORINA
Código: TRICLORCOM
Técnica: Cromatografía de gases-head space
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 12 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Tricloroetano en sangre
Código: TRICLOETAN
Técnica: Cromatografía gases- ionización de llama
Unidades: mcg/mL
Plazo: 11 días

Descripción: Tricloroetano en sangre
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL sangre total EDTA, al principio de la última jornada laboral
Valores de referencia: (Inf. 0.55) VLB principio última jornada semanal

---

Descripción: TRICLOROETANOL LIBRE SANGRE TOTAL
Código: TRIETANOLL
Técnica: Cromatografía de Gases/Head Space
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA) final de la semana laboral.
Valores de referencia: (Inf. 0.5) Exposición a Tricloroetileno, al final de la semana laboral.

Descripción: TRICLOROETANOL TOTAL EN ORINA
Código: TRICLOETA
Técnica: téc. cromatografía de gases/head space
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: TRICLOROETANOL TOTAL EN SANGRE
Código: TRIETANOL
Técnica: Cromatografia de gases head space
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL de sangre total (EDTA).En personas expuestas al final de la semana laboral
Valores de referencia:

Descripción: TricotioDistr. 4 no fotosensible. Sec Gen: C7ORF11
Código: GEN_000758
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Tricotiodistrofia. Sec Gen: GTF2H5
Código: GEN_000759
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TRIGLICERIDOS
Código: TRI
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 150) Tras ayuno de 8 - 10 horas
(Inf. 175) Sin ayuno de 8 - 10 horas

Descripción: Trigonocefalia. Sec Gen: FGFR1
Código: GEN_000760
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trimetilaminuria: gen FMO3 (NGS)
Código: FMO3
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Triple A, síndrome. Sec Gen: AAAS
Código: GEN_000761
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Tripsina en suero
Código: TRIPSINA
Técnica: Radioinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 500 µL
Valores de referencia: (160 - 600)

Descripción: TRIPTASA EN SUERO
Código: TRIPTASA
Técnica: Téc. FEIA

Descripción: TRIPTASA EN SUERO
Unidades: mcg/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Alt. plasma EDTA
Valores de referencia: (Inf. 11.40)

Descripción: TRIPTASA MUESTRA
Código: TRIPTASAMU
Técnica: FLUOROINMUNOANÁLISIS (CAP-SYSTEM)
Unidades: µg/L
Plazo: 6 días
Tubo:
Comentario adicional: Antes de realizar la prueba, solicitar información sobre el tipo de muestras que se aceptan.
Valores de referencia:

Descripción: Tromb. esencial y mielofib.: gen CALR exón 9 (sec. Sanger)
Código: CALR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:

Descripción: Trombifilia: gen APOB mutación R3500Q (sec. Sanger)
Código: R3500Q
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Trombocitopenia ligada al X. Sec Gen: WAS
Código: GEN_000762
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia. Déficit Antitrombina 3. Sec Gen: SERPINC1
Código: GEN_000171
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Trombofilia. Déficit Antitrombina 3. Sec Gen: SERPINC1
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia. Sec Gen: ACE. Polimorfismo I/D
Código: GEN_000393
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia. Sec Gen: SERPINA1
Código: GEN_000764
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia. Sec Gen: SERPINA1. mutaciones E264V, E342K
Código: GEN_000763
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen F13B Factor XIII mutación V34L
Código: FXIII_V34L
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen F7 Factor VII (NGS)
Código: FAC7_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.

Descripción: Trombofilia: gen F7 Factor VII (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen FGB mutación 455G>A (sec. Sanger)
Código: FGB_455GA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen PAI1 secuencia 4G/5G en el promotor
Código: PAI1_PROM
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen ZPI mutación G1277A
Código: PZI_G1277A
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo de esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación C46T gen F12 Factor XII
Código: FACXIIMUT
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación G1691A gen F5 Factor V Leiden
Código: FACV_LEI
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Trombofilia: mutación G1691A gen F5 Factor V Leiden

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II

Código: FACIIMUT

Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación p.Agr306Thr gen F5 Factor V Cambridge

Código: FACV_CAM

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación p.Arg306Gly gen F5 Factor V Hong Kong

Código: FACV_HONG

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación p.His1299Arg gen F5 Factor V R2

Código: FACV_R2

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR

Código: MTHFRMUT

Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)

Descripción: Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Tropheryma whippelii DNA PCR Cualitativa
Código: T.WHIPPLEI
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Muestra: biopsia intestino, heces, LCR, etc
Valores de referencia:

Descripción: TROPONINA I ALTA SENSIBILIDAD ABBOTT
Código: TROPOIHSA
Técnica: CMIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.9) <ó= 1.9 Negativo
(2.0 - 34.2) Hombre Repetir a las 3 horas
(2.0 - 15.6) Mujer Repetir a las 3 horas

Descripción: TROPONINA I EN SUERO
Código: TROPONINA
Técnica: Técnica ELFA
Unidades: mcg/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: alternativo plasma Heparina Litio y plasma de EDTA
Valores de referencia: (Inf. 0.034)

Descripción: Troyer, Sd. Sec Gen: SPG20
Código: GEN_000765
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TRYPANOSOMA BRUCEI AC. IGG
Código: TRYPABRACG

Descripción: TRYPANOSOMA BRUCEI AC. IGG
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: TRYPANOSOMA BRUCEI AC. IGM
Código: TRYPABRACM
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: TRYPANOSOMA CRUZI AC. IGM
Código: TRYPACIGM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo <1/32

Descripción: TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS
Código: TRYPANOSOM
Técnica: Quimioluminiscencia
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: IgG+ IgM
Valores de referencia: (Sup. 1.1) Positivo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Inf. 0.9) Negativo

Descripción: Trypanosoma cruzi DNA PCR Cualitativa en sangre
Código: TRYPANOPCR
Técnica: Reacción en Cadena de la Polimerasa
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 mL EDTA tripotásico. No remitir muestras heparinizadas, inhiben la polimerasa de la PCR
Valores de referencia:

Descripción: TSH
Código: TSH
Técnica:
Unidades: µUI/mL

Descripción: TSH
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(0.35 - 4.94) > 14 años
(0.1 - 2.5) Mujer 14 años - 50 años En embarazadas 1º trimestre
(0.2 - 3.0) Mujer 14 años - 50 años En embarazadas 2º trimestre
(0.3 - 3.0) Mujer 14 años - 50 años En embarazadas 3º trimestre

---

Descripción: UGT1A1*28 (irinotecan)
Código: UGT1A1_28
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Valores de referencia:

Descripción: Unverricht-Lundborg, enfermedad de. Sec Gen: CSTB
Código: GEN_000766
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: UREA ORINA
Código: UREA2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: g/24h
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (20 - 40)

Descripción: UREA.
Código: UREA
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(15 - 43) 1 año - 17 años
(17 - 51) Hombre > 17 años
(13 - 45) Mujer > 17 años

Descripción: Ureaplasma parvum DNA PCR
Código: UREAPAPCR
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:

Descripción: Ureaplasma parvum DNA PCR
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Escobillón seco o de medio de transporte, orina, LCR,etc
Valores de referencia:

Descripción: UREAPLASMA sp
Código: UREAPLAS
Técnica: Cultivo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: UREAPLASMA UREALYTICUM AC. IGG
Código: UREAPAC
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Alternativa: plasma con anticoagulante
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado

Descripción: UREAPLASMA UREALYTICUM AC. IGM
Código: UREAPACM
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Alternativa: plasma con anticoagulante
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado

Descripción: Ureaplasma urealyticum DNA PCR cualitativa
Código: UREAPLPCR
Técnica: Hibridación molecular
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Escobillón seco o medio de transporte, orina, LCR....
Valores de referencia:

Descripción: UROBILIGEN. EN ORINA
Código: UROBILIGEN
Técnica:
Unidades: mg/dL

Descripción: UROBILIGEN. EN ORINA
Plazo: 3 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: UROPORFIRINA ISOMEROS (I-III) ORINA
Código: UROISOME
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades: mcg/24h
Plazo: 9 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 mL orina 24 h. Indicar volumen 24 h.
Valores de referencia: (Inf. 46) UROPORFIRINA I
(Inf. 46) UROPORFIRINA III

Descripción: Usher tipo 1D / F, digénico. Panel NGS
Código: GEN_000767
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Usher tipo 2C, digénico. Panel NGS
Código: GEN_000768
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Van der Woude, Sd. Sec Gen: IRF6
Código: GEN_000769
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: VANADIO EN ORINA
Código: VANADOR
Técnica: Plasma acoplado inductivamente con detector de masas
Unidades: mcg/g creatin.
Plazo: 6 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 mL orina al final de la semana laboral

Descripción: VANADIO EN ORINA
Valores de referencia: (Inf. 50) VLB-INSHT final semana (Pentóxido de Vanadio)
(Inf. 1) Personas no expuestas

Descripción: VANADIO EN SUERO
Código: VANADIO
Técnica: ICP-MS
Unidades: mcg/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 1.2)

Descripción: VANCOMICINA
Código: VANCOMI
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: mcg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (20 - 40) Pico
(Sup. 80) Tóxico - Pico
(5 - 10) Valle
(Sup. 10) Tóxico - Valle

Descripción: VARICELA ZOSTER AC. IgG EN L.C.R
Código: VARICGLC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: VARICELA ZOSTER AC. IGG SUERO (HERPES ZOSTER)
Código: VARICEACG
Técnica: CLIA
Unidades: mUI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa: plasma (EDTA, citrato y heparina)
Valores de referencia: (Inf. 135) Negativo
(136 - 164) Indeterminado
(Sup. 165) Positivo

Descripción: VARICELA ZOSTER AC. IgM EN LCR
Código: VARICMLC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días

Descripción: VARICELA ZOSTER AC. IgM EN LCR
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: VARICELA ZOSTER AC. IGM SUERO (HERPES ZOSTER)
Código: VARICEACM
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa: plasma (EDTA, citrato y heparina)
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: Varicela-zoster DNA PCR Cualitativa
Código: DNAVARIC
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Muestras: suero, plasma, sangre, LCR, orina, torunda seca, etc.
Valores de referencia:

Descripción: VASOPRESINA (ADH)
Código: ADH
Técnica: RIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 2 mL plasma EDTA. Separar plasma y congelar.
No utilizar heparina como anticoagulante.
Paciente:Evitar el estrés el día de la recogida.
Se recomienda que el paciente esté en reposo al menos una hora antes de la extracción.
Valores de referencia: (Inf. 14.03)

Descripción: VDRL LCR
Código: VDRLLCR
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: =NEGATIVO

Código: VENLAFAXIN
Descripción: VENLAFAXINA SUERO
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas

Código: VENLAFAXIN
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	VENLAFTOT		Perfil Venlafaxina Total	ng/mL	(195 - 400)
Prueba	VENLAF1		Perfil Venlafaxina	ng/mL	
Prueba	VENLAF2		Perfil Desmetilvenlafaxina	ng/mL	

Descripción: Ventrículo izquierdo no compactado / LVNC. Panel NGS
Código: GEN_000770
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Vigabatrina en suero
Código: VIGABATRIN
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectroscopía de masas
Unidades: mg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero. Refrigerado. Alternativa 1 mL Plasma EDTA Tripotásico.
Valores de referencia: (1 - 36) Rango Terapéutico

Descripción: VIH 1+2 AC. Y ANTIGENO P24 LCR
Código: VIHLCR
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 500 uL LCR (Refrigerado)
Se recomienda realizar análisis simultáneo en suero y LCR.
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo

Descripción: VIH AC. INMUNOBLOT SUERO
Código: WESTERNAC
Técnica: INMUNOBLOT
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero.
Valores de referencia:

Descripción: VIH AC. Y ANTÍGENO P24
Código: VIHAC

Descripción: VIH AC. Y ANTÍGENO P24
Técnica: Técnica ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 0.99) Negativo

Descripción: VIH1 DNA Proviral PCR Cualitativa
Código: VIH1DNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia: =NEGATIVO Negativo

Descripción: VIH1 DNA Proviral Semen PCR Cualitativa
Código: VIH1SDNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Semen fresco y lavado o solo fresco
Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales.
Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia:

Descripción: VIH1 DNA Semen Urgente
Código: VIH1SDNAUR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo:
Tubo: Semen
Comentario adicional: Semen fresco y lavado o solo fresco
Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales.
Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia:

Descripción: VIH1 mutaciones y genotipo de la Proteasa y la RT
Código: VIH1MUT
Técnica: RT-PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: VIH1 RNA RT-PCR Cualitativa
Código: VIH1RNA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia: =POSITIVO Negativo

Descripción: VIH1 RNA RT-PCR Cualitativa Urgente
Código: VIH1RNAUR
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 2 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: VIH1 RNA RT-PCR Cuantitativa
Código: VIH1CUAN
Técnica: RT--PCR cuantitativa
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: VIH1 RNA Semen RT-PCR Cualitativa
Código: VIH1SRNA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Semen fresco y lavado o solo fresco
Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales.
Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia:

Descripción: VIH2 RNA PLASMA
Código: VIH2RNA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 2 mL Plasma de EDTA. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:

Descripción: VIMENTINA CTRULINADA ANTICUERPOS
Código: VIMENTINAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis

Descripción: VIMENTINA CTRULINADA ANTICUERPOS
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Virus de la Influenza B, PCR
Código: VINFLUBPCR
Técnica: Hibridación Molecular con Amplificación (PCR)
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Aspirado nasofaríngeo, otras muestras. Envío inmediato a 4ºC
Valores de referencia:

Descripción: VIRUS INFLUENZA A+B EN MUESTRA
Código: INFLUENZAG
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: VIRUS LINFOTROPICO T AC en LCR
Código: HTLVLCR
Técnica: Inmunoanalisis
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: VIRUS OESTE DEL NILO (WEST NILE VIRUS), PCR
Código: NILOOEPCR
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma(EDTA), suero,CONGELADO
LCR
Valores de referencia:

Descripción: VIRUS PAROTIDITIS (PAPERAS) POR PCR ORINA
Código: PAROPCRORI
Técnica: Hibridación molecular con Amplificación (PCR)
Unidades:
Plazo: 17 días

Descripción: VIRUS PAROTIDITIS (PAPERAS) POR PCR ORINA
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Virus Parotiditis (Paperas) Saliva PCR Cualitativa
Código: PAROPCR
Técnica: RT- PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Torunda nasofaringea con medio para virus, solicitar a Almacen Saliva
Valores de referencia:

Descripción: VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL AC. IGG SUERO
Código: VRSACG
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Dudoso
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL AC. IGM SUERO
Código: VRSACM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Alternativa: Plasma (Citrato, Heparina)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado
(Sup. 11) Positivo

Descripción: VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL ANTIGENO EN MUESTRA
Código: VRSAG
Técnica: INMUNOCROMATOGRAFÍA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Muestra de aspirado NASOFARINGEO.
Valores de referencia: = Negativo

Descripción: Virus Respiratorio Sincitial(VRS) PCR
Código: VRSINCPCR
Técnica: PCR a Tiempo Real
Unidades:

Descripción: Virus Respiratorio Sincitial(VRS) PCR
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Aspirado nasofaríngeo, lavado broncoalveolar. Refrigerado
Las muestras tomadas con hisopo tiene que ir en medio de transporte para virus, solicitar en Almacen.
Resto de las muestras biologicas sin medio de transporte.
Valores de referencia:

Descripción: Virus Zika, RT-PCR, Suero
Código: ZIKAVIRUS
Técnica: Q-PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL Suero,
Alternativo: Plasma EDTA, Orina, LCR, esperma, Saliva.
Valores de referencia:

Descripción: VISCOSIDAD EN PLASMA
Código: VISCO
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional: Suero, alternativo
1 mL sangre total Heparina
Alt. sangre total EDTA
Valores de referencia: (1.4 - 1.5)

Descripción: VITAMINA A SUERO (RETINOL)
Código: VITAA
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades: mg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Alternativamente se puede usar tanto plasma de EDTA como plasma de Heparina.
Valores de referencia: (0.3 - 1.00)

Descripción: VITAMINA B1 (TIAMINA) SANGRE TOTAL EDTA CONGELADA
Código: VITAB1
Técnica: HPLC
Unidades: mcg/dL
Plazo: 10 días
Tubo: Sangre Total EDTA Congelado
Comentario adicional: 3mL de sangre total EDTA congelada. Proteger de la luz.
Valores de referencia: (3.5 - 10.40)

Descripción: VITAMINA B12
Código: VITAB12
Técnica: ICMA

Descripción:	VITAMINA B12
Unidades:	pg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(187 - 883)

Descripción:	VITAMINA B2 EN SANGRE TOTAL (EDTA)
Código:	VITAB2
Técnica:	HPLC
Unidades:	µg/L
Plazo:	14 días
Tubo:	Sangre Total EDTA Congelado
Comentario adicional:	1ml de sangre total EDTA congelada. Proteger de la luz. Alicuota exclusiva.
Valores de referencia:	(137 - 370)

Descripción:	Vitamina B3 (Nicotinamida) en suero
Código:	VITAMINAB3
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	3 mL Suero. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(10.00 - 100.00)

Descripción:	Vitamina B5 (Acido Pantoténico) en suero
Código:	PANTOTENIC
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades:	mcg/L
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 mL suero. Congelar inmediatamente y enviar congelado. Proteger de la luz.
Valores de referencia:	(20 - 88)

Descripción:	VITAMINA B6 (PIRIDOXAL FOSFATO) SANGRE TOTAL CONGELADA
Código:	VITAB6
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades:	nmol/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Sangre Total EDTA Congelado
Comentario adicional:	3ml de sangre total EDTA congelada. Proteger de la luz.
Valores de referencia:	(42 - 145)

Descripción:	VITAMINA C PLASMA HEPARINA (ACIDO ASCORBICO)
Código:	VITAC
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/dL
Plazo:	6 días
Tubo:	Heparina HPLC

Descripción: VITAMINA C PLASMA HEPARINA (ACIDO ASCORBICO)

Comentario adicional: Plasma de heparina debe ser centrifugado antes de 2 horas después de la extracción (antes de 30 minutos preferiblemente). Proteger muestra de la luz.Una vez centrifugado, separar plasma y congelar inmediatamente. Enviar muestra congelada.

NO VALEN MUESTRAS DE PLASMA EDTA

Valores de referencia: (0.46 - 1.49)

Descripción: VITAMINA D 1,25 DIHIDROXI SUERO

Código: VITD1.25

Técnica: CLIA

Unidades: ng/L

Plazo: 9 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero refrigerado

Valores de referencia: (20 - 80)

Descripción: VITAMINA D 25 HIDROXI SUERO

Código: VITAD25

Técnica: Técnica CMIA

Unidades: ng/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (30 - 96) Valores recomendados

Descripción: VITAMINA E SUERO (ALFA-TOCOFEROL)

Código: VITAE

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV

Unidades: µg/mL

Plazo: 6 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Suero.
Alternativamente se puede usar tanto plasma de EDTA como plasma de Heparina.

Valores de referencia: (5.0 - 20.0) Adultos
(3.0 - 15.0) Niños

Descripción: Vitamina K1 en suero

Código: VITAK1

Técnica: HPLC.Fluorimetria.

Unidades: mcg/L

Plazo: 13 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1.5 mL. Alternativamente 1.5 mL Plasma EDTA Tripotásico. Proteger de la luz.
CONGELAR MUESTRA

Valores de referencia: (0.10 - 2.10)

Descripción: Vitreorretinopatía de Wagner. Sec Gen: VCAN

Código: GEN_000771

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Vitreorretinopatía de Wagner. Sec Gen: VCAN
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Vitroretinopatía exudativa familiar. Panel NGS
Código: GEN_000772
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: VLDL-COLESTEROL
Código: VLDL
Técnica: Fórmula
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: .
Valores de referencia: (Inf. 40)

Descripción: VORICONAZOL
Código: VORICONAZO
Técnica: Cromatografia liquida/Tandem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mcg/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 ml de suero congelado
Valores de referencia: (Sup. 0.5) Profilaxis antimicótica
(Sup. 2.0) Terapia antimicótica
(Sup. 6.0) Toxicidad

Descripción: VORTIOXETINA
Código: VORTIOXETI
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (5.4 - 7.4) Dosis 5 mg/dia
(13.0 - 25.0) Dosis 20 mg/dia

Código: VSG
Descripción: VSG SANGRE (VELOCIDAD DE SEDIM
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes					
Prueba	V1HORA		VELOCIDAD DE SEDIMENTACION A 1 HORA	mm	(Inf. 10)
Prueba	V2HORA		VELOCIDAD DE SEDIMENTACION A 2 HORAS	mm	(Inf. 30)
Prueba	KATZ		INDICE DE KATZ		

Descripción: Waardenburg y albinismo digénico. Panel NGS
Código: GEN_000773
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wagner, Sd. Sec Gen: VCAN
Código: GEN_000774
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Walker-Warburg, Sd. Sec Gen: POMT1
Código: GEN_000775
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Warburg Micro, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000712
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Weill-Marchesani, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000776
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Weill-Marchesani, Sd. Panel NGS
Valores de referencia:

Descripción: Werner, Sd. Sec Gen: WRN
Código: GEN_000777
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: West, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000713
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wolcott-Rallison (WRS), Sd. Sec Gen: EIF2AK3
Código: GEN_000778
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wolff-Parkinson-White (WPW), Sd. Sec Gen: PRKAG2
Código: GEN_000779
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wolfram tipo 2, Sd. Sec Gen: CISD2
Código: GEN_000780
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wolfram, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000781

Descripción: Wolfram, Sd. Panel NGS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wolfram, Sd. Sec Gen: WFS1
Código: GEN_000782
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: WUCHERERIA BANCROFTI ANTIGENO SUERO
Código: WUCHEAG
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Xantomatosis cerebrotendinosa. Sec Gen: CYP27A1
Código: GEN_000783
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Xeroderma pigmentoso. Panel NGS
Código: GEN_000784
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: XILOSA ORINA
Código: XILO2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: g
Plazo: 5 días

Descripción: XILOSA ORINA
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: Estímulo: 0.5 g de XILOSA/kg de peso (máximo 25 g) en solución acuosa al 10%
Muestras a obtener: Vaciar la vejiga antes de la ingesta de la D-Xilosa
Adultos: Recoger todas las orinas emitidas durante las cinco horas siguientes a la ingestión de la D-Xilosa. Extraer muestra de sangre a las 2 horas tras la ingesta.

Niños: Extraer muestra de sangre después de 1 hora tras ingesta. Si el médico lo solicita, se recogerán las orinas emitidas durante las cinco horas siguientes tras la ingesta.

Valores de referencia: (5 - 8) (20 -32% de dosis ingerida)

Descripción: XILOSA SUERO
Código: XILO
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Sup. 25) 1-2 h tras toma

Descripción: YERSINA PSEUDOTUBERCULOSIS AC.
Código: YERTUBER
Técnica: Téc. Aglutinación
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: = Negativo <1/200

Descripción: YERSINIA ENTEROCOLITICA AC.IGG SUERO
Código: YERSIAC
Técnica: ELISA
Unidades: U/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero o plasma (EDTA, citrato, heparina.
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(10 - 15) Indeterminado

Descripción: YODUROS EN ORINA (IODU)
Código: IODO
Técnica: Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamentee (ICP-MS)
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 10 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina 24 h. Indicar volumen.
Valores de referencia: (25 - 450)

Descripción: YODUROS SUERO
Código: YODURO
Técnica: Espectrometría de Emisión Atómica
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días

Descripción: YODUROS SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Alt. plasma EDTA o Heparina
Valores de referencia: (40 - 80)

Descripción: ZIKA AC. IGG
Código: ZIKAIGG
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción: ZIKA AC. IGM
Código: ZIKAIGM
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: ZINC EN ORINA AISLADA
Código: ZN2MG
Técnica: Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente
Unidades: µg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 mL orina (micción aislada). Evitar el contacto de la muestra con tapones de goma.
Valores de referencia: (180 - 850)

Descripción: ZINC ERITROCITARIO
Código: ZNW
Técnica: Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente
Unidades: µg/dL
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia: (440 - 1050)

Descripción: ZINC ORINA DE 24 HORAS
Código: ZN2
Técnica: Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente
Unidades: µg/24h
Plazo: 7 días
Tubo: Orina 24 Horas

Descripción: ZINC ORINA DE 24 HORAS
Comentario adicional: 5 mL orina 24 horas. Indicar volumen 24 h. Evitar el contacto de la muestra con tapones de goma.
Valores de referencia: (150 - 1200) Normal
= Nivel Tóxico >1200 µg/24h

Descripción: ZINC SEMEN
Código: ZNSEMEN
Técnica: ESPECTROFOTOMETRÍA
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Semen
Comentario adicional:
Valores de referencia: (50 - 500)

Descripción: ZINC SUERO
Código: ZN
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: µg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero tubo especial Zinc
Comentario adicional: 1 mL suero en tubo libre de metales (tapón azul)

Realizar extracción en tubo libre de metales (tapón azul), pudiéndose utilizar el sistema vacutainer. Es necesario esperar a retracción del coágulo, centrifugar y trasvasar el suero con pipeta de plástico desechable a un tubo de alícuota. Marcar el tu

Antes de realizar una extracción solicitar los tubos especiales y el protocolo a seguir.

Valores de referencia: (60 - 125)

Descripción: ZIRCONIO EN PLASMA (CIRCONIO)
Código: ZIRCONIO
Técnica: Espectrometría de Masas-Plasma acoplado inductivamente
Unidades: ng/L
Plazo: 9 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 275) Valores de referencia orientativos: Población normal sin prótesis de Zr

---

Descripción: ZOLPIDEM SUERO
Código: ZOLPIDEM
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (20 - 150)

Descripción: Zonisamida
Código: ZONISA
Técnica: CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA/TÁNDEM MASAS (LC-MS/MS)
Unidades: mg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal

Descripción:	Zonisamida
Comentario adicional:	1 ml de suero. Alternativo 1 mL plasma de EDTA
Valores de referencia:	(10.0 - 38.0)