

TEST DEL ALIENTO PARA DETECTAR HELICOBACTER PYLORI (ESPIKUR 50)

PARA OBTENER UN RESULTADO FIABLE LE ROGAMOS SIGA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

CONSIDERACIONES PREVIAS

- El comprimido contenido en este kit no debe administrarse a niños menores de 18 años debido a la falta de datos. Para menores de 18 años puede realizarse el test del antígeno en heces para la detección de Helicobacter Pylori.
- No haber consumido ningún antibiótico, durante los 30 días previos a la realización de la prueba.
- No haber consumido inhibidores de la bomba de protones (omeprazol y similares) ni antiácidos (ranitidina, cimetidina y similares) durante los 15 días previos a la realización del test.
- No fumar, ni consumir alimentos durante las 8 horas previas a la realización de la prueba (se puede lavar la boca con agua). No lavarse los dientes con dentífrico desde la noche anterior. El día de la toma de la muestra bastará con enjuagarse la boca con agua.
- No hacer ejercicio físico al menos durante los 30 minutos previos a la realización del test.
- Informe a su médico si:
 - Ha sufrido extirpación parcial de su estómago (gastrectomía)
 - Está embarazada o en periodo de lactancia

DURANTE LA PRUEBA

- No consumir chicle, comer, beber ni fumar y permanecer en reposo durante todo el proceso.

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 10 minutos.

Observaciones: *Si vomita durante la prueba debe comunicarlo al personal del laboratorio ya que sería necesario repetirla (se necesitará nuevo volante de prescripción).*